

الآلى البهيه
فى الهندتہ الوصفيه

بسم الرحمن الرحيم

جدك يا من عرف بكمال الوصفيه بوتره عن التشبيه والجسميه اكل واجب
قام بحقه اللسان واحسن حليه يتحلى بها الانسان واجل ممدود من افواه
المخابر واحسن مرسوم فى صدور الدفاتر وشكر يا ذا النعمة والعطاء
مجلبة لزيادة الالاء فسبحانك يا بصور اشكال المخلوقات ومزين مساقط
الغيب بانواع النبات وحافظ الطير فى الفراغ من السقوط وممسك السماء
بلاعد عن الهبوط ارسيت الجبال على مستوى الغبراء وزينت بالانجم
الزهر محيط الجرباء نسألك يا ذا العزة الباهره والقدرة التامة القاهره
ان تصلى على مركز دائرة الكمال نبيك المبعوث فى خير آل محمد القاطع
بالبر الخداد رؤس اهل الشرك والعناد صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم
وعظم وعلى آله الذين اقاموا عمود الدين بمسقيم الحجج والبراهين

ما استبان الضياء ودرجت الظباء وتلونت الحرباء في هاجرة البیداء (وبعد)
 فالرياضة غذاء الارواح ومناط جل مصالح الاشباح بها كمال النفوس
 البشرية واصلاح كل خلل مملوكى ورزية فهي عند العقلاء اجل صناعه
 يرجح سعيه من اتخذها بضاعه بل بها تزداد القوة العاقلة وتقوى في ميدان
 المناضلة لكونها غير ظنية الدلائل فلا يؤثر فيها سهم المناضل بل هي
 قطعية البراهين مؤسسة على المشاهدة واليقين ولا يبعد ان تكون سببا
 للنجاح ومجلبة لرضا الفتاح لان بها صلاح العباد وزوال ما يعترضهم
 من ضرر العناد وبالجملة فهي بكل ثناء حريه لاسم الهندسة الوصفية
 التي هي لغة المهندس ولسانه من عرفها جل عند العقلاء مكانه ومن
 لم يعرفها لم يعرف رسما ومن كان في هذه اعمى فهو في الآخرة اعمى فلا
 يمكنه وصف مشاهد سواء تقارب منه او تباعد هذا ومن جملة ما انتظم
 في سلك التعريب وتداولته ايدى التصحيح والتهذيب كتاب في هذا الفن
 جديد الاعمال حسن الترتيب ليس له مثال ترجمه الماهر اليب والعاقل
 الارب صاحب الاخلاق الحسان ابراهيم اسدي رمضان ولما اكل
 تعريبه وتدريسه في مدرسة الهندسة النفيسة المهندس سحانة الخديوية
 معدن النفائس الرياضية تداولته ايدى التصحيح وتتمته غاية التنقيح فقابله
 على اصالة القرناوى من هو للمهارة حاوى صاحبي الذي اثنى به ودليلي
 حسن افندي المصحح الجليل فاطلق عنان قلمه فيه وصححه وامعن نظره في
 ترجمته واصلمه ثم وصل الى يد راجي غفر الاوزار ابراهيم الدسوقي عبد الغفار
 فهدب عباراته ومبانيه وحرر بعد السؤال معانيه وبذل فيه غاية
 الجهود ونظمه نظم الآلى في العقود مع مقابله الثاني و مترجمه الاول
 ليكون بذلك اتقن واكمل ولا يلزم على تحسين مبناه الاخلال بشئ
 من معناه كان ذلك بامر من يجيبه السعد بليك سعادة امير اللواء ادهم
 بك لازال محفوقا بالالطاف الخفية مشمولا بالاسعافات الداورية
 وفاء بواجب خدمة صاحب السيادة والعطايا المورثة للسعادة من ملك

بجوده رقاب العباد وعم كرمه منهم الحاضر والباد رب الفطنة القوية
والرأى العلى ولى نعمتنا الحاج محمد باشا على ايد الله بيمينه وكرمه دولته
وسدد بقهره وقوته صولته ولازال مسعود الاوقات دائم الحظوظ والمسرات
مجاب المنادى مكبوت المعادى بجاه من ركب البراق وارتقى
السبع الطباق ولما تهيأ للتمام ولبس وشاح الختام وسمته باللاكى البهية
فى الهندسة الوصفية وقد آن ان نشرع فى المقصود فنقول بعون الله
الملك المعبود

(الجزء الاول)

(في النقطة والمستقيم والمستوى)

(الباب الاول)

(تفہيمات اولية)

(١)

الهندسة العادية تین تبیناتاما الوضع النسبی لاجزاء شکل ما کائن کله
فی مستو واحد لكنها غير كافية فی بیان العمليات اللازم اجراؤها فی الفراغ
کما یظهر ذلك بامثلة سهلة جدا

ومن المعلوم ان بعد نقطة عن مستوى یقدر بالعمود النازل من هذه النقطة
على هذا المستوى لكن كيفية تبیین اتجاه هذا العمود وكيفية تعیین نقطة تقابله
بالمستوى لا تخلان بالهندسة العادية لان طرقها الرسمية غير كافية فی ذلك
فلذا لزم استعمال طرق خصوصية تتعلق معرفتها بالهندسة الوصفية فعلى
هذا تعریف الهندسة الوصفية بان الغرض منها معرفة رسم ذی الثلاثة
ابعاد على فرخ من ورق ذی بعدین فقط غير صواب لان هذا الغرض ليس الاجزاء
واھيا منها فانها زیادة عن ذلك تین طرق بحث یصح تطبیقها مع الفائدة
التامة على جمیع المسائل العملية للوضع النسبی وبالتحلیلات الجبرية یمکن حل
مسائل النسب المیترية وبالجملة فیمجموع هذین الفرعین الریاضیین یمکن
حل ای مسئله كانت

وقد قال المهندس منیج فی الهندسة الوصفية انما لغة المهندس فلا بد له حیث
من معرفة قراءة لغته وکتابتها

ثم ان جمیع اشغال المهندس لا تخرج عن مسألتین

الاولی الوصف اعنی رسم صورة جسم او عدة اجسام على فرخ ورق بحیث

* (٣) *

يمكن تكونها فيما يراد تكونها فيه من المحال
الثانية التصور ان بعد تخيل جسم او عدة اجسام يعمل رسمها بحيث يمكن
ابرازها خارجا بالضبط بواسطة هذا الرسم

* (٢) *

متى تحرك مستو او اى سطح كان لا يغيره تغيره في جزء من اجزائه ولا في اوضاع
النقط بالنسبة الى بعضها ولا في اوضاع خطوطه في وقت تامن اوقات الحركة
ولا في مقادير الزوايا الحادثة بين خطوطه ولا في طول خطوطه المحدودة ومتى
دور مستو حول خط تقاطعه بمستو آخر حتى اتحد معه يقال لذلك انطباق
المستوى الاول على الثانى وهذه العملية تتكرر كثيرا في الهندسة الوصفية
لتحويل بعض تراكييب على فرخ من ورق لم تكن فيه ويتحصل ذلك ايضا
باعتبارات اخرى كثيرة القائده

* (في بيان النقطة) *

* (٣) *

متى امكن ايجاد جميع نقط اى جسم او سطح او خط بواسطة معالم علم الجسم
او السطح او الخط فيجب حينئذ تقبل كل شئ معرفة ثبوت وضع اى نقطة
في الفراغ * ويستعمل لذلك عدة طرق نشرحها فيما بعد اسمها هو اعتبار
مستويين يتقاطعان في زوايا قائمة كما في (شكل ١) بفرض احدهما
ق ق افقيا والآخر ر ر رأسيا وخط تقاطعهما خ ض يسمى بخط
الارض وكل من هذين المستويين اللان تصورهما ممتدين الى غير نهاية يقطع
الآخر الى جزئين او جهتين يسمى الجزء خ ض ق من المستوى الافقى
الكائن امام الرأسى بالجزء المقدم والجزء خ ض ق الكائن خلف المستوى
الرأسى يسمى بالجزء المؤخر والجزء خ ض ر من المستوى الرأسى الكائن
فوق المستوى الافقى يسمى بالجزء الاعلى والجزء خ ض ر الموجود اسفله
يسمى بالجزء الاسفل ويتكون ايضا من هذين المستويين اربع زوايا زوجية

تميز باسماء الاجزاء المكونة هي منها

فالزاوية ق خ ض ر تسمى الزاوية المقدمة العليا ويرمز لها بالرمز $\overline{م ع}$
 والزاوية ق خ ض ر تسمى الزاوية المؤخرة العليا ويرمز لها بالرمز $\overline{خ ع}$
 والزاوية ق خ ض ر تسمى الزاوية المؤخرة السفلى ويرمز لها $\overline{خ س}$
 والزاوية ق خ ض ر تسمى الزاوية المقدمة السفلى ويرمز لها $\overline{م س}$

* (٤) *

اذا تقرر ذلك يقال اذا انزلنا من النقطة الفراغية م عمودا م د على
 المستوى الافقي ق ق تسمى النقطة د التي هي اثر هذا الخط بمسقط
 النقطة م الافقي والعمود م د بالخط المسقط اقبيا للنقطة م وكذلك
 اذا انزلنا م ع على ر ر يكون الاثر ع لهذا المستقيم مسقط النقطة
 م الرأسى ويكون خط ع م الخط المسقط رأسيا للنقطة م

* (٥) *

اذا امر مستو من م د و م ع يكون الشكل م د و ع الكائن
 في هذا المستوى بالضرورة مستطيلا ويكون المستوى زيادة عن ذلك عمودا على
 ق ق وعلى ر ر فيكون بالضرورة عمودا على خ ض فينتج اولاً ان
 البعد م د اى من النقطة م الى المستوى الافقى يساوى البعد ع و
 اى من مسقطها الرأسى الى خط الارض
 وثانياً ان البعد م ع اى من النقطة م الى المستوى الرأسى يساوى
 البعد د و اى بعد المسقط الافقى عن خط الارض
 وثالثاً اذا انزلنا من مسقطى نقطة واحدة عمودين على خط الارض فانهما
 يقطعانه فى نقطة واحدة

* (٦) *

المسقطان د و ع للنقطة م يعينان موضعها فى الفراغ وذلك ان

()*

النقطة توجد على عمود المستوى ق ق القائم من المسقط الافقي د على بعد يساوي و ع فينشد اذا اخذ بعد د م = و ع تكون النقطة م هي النقطة المطلوبة وتحصل ايضا بأخذ ع م = و د على عمود قائم من النقطة ع على المستوى الرأسى ر ر وبالجمله فالعمودان القائمان من النقطتين د و ع على المستويين ق ق و ر ر يكونان في مستوا واحد فينشد يتقاطعان في النقطة م التي مسقطاها د و ع

(٧)

وتعين النقطة اذا كانت على مستقيمين او على مستقيم ومستو وبهذه الكيفية تعين النقطة دائما لان معنى تعين مسقطى نقطة ما كون النقطة على مستقيمين عمودين على مستويي المسقط ومازتين من المسقطين المعلومين

(٨)

وقد اعتبرنا فيما ذكر مستويين فلتحويل التراكيب على فرخ الرسم يفرض ان المستوى الرأسى ر ر يدور حول خط الارض خ خ كباب يدور على عقبه حتى يتطبق على المستوى الافقى بحيث يتطبق الجزء الاعلى خ خ ر على الجزء المؤخر خ خ ق والجزء الاسفل خ خ ر على الجزء المقدم خ خ ق

وبهذه الحركة يتحرك المسقط الرأسى ع وكذلك خط و ع فينتطبق في و ك على امتداد د و بحيث انه بعد انطباق المستوى الرأسى على المستوى الافقى يكون المسقطان د و ك لنقطة واحدة فراغية على عمود واحد على خط الارض فن ذلك ينتج ان كل نقطتين منتخبتين اختيارا لا بد لان على مسقطى نقطة واحدة فراغية الا ان كاتما على عمود واحد على خط الارض

(٩)

ولزم من الآن فصاعدا الى اى نقطة فراغية بحرف صغير من حروف الهجاء
ومسقطها بعين هذا الحرف موضوعا فوقه حرف **و** ان كان المسقط اقصيا
و ان كان المسقط رأسيا

فالنقطة **م** الفراغية مثلا يرمز لمسقطها الافقى بالرمز **م** والراسى **م**
انظر (الشكل ٢) وتعين اى نقطة فى الهندسة الوصفية بمسقطيها والنقطة
المعلومة هى النقطة المعلوم **كل** من مسقطيها الافقى والراسى ومتى طلب
ايجاد نقطة فراغية فالمراد ايجاد مسقطيها

ومتى وصف اى شكل فراغى وجب رسمه حالا على فرخ الرسم وبالعكس اى انه
متى وجد رسم اى شكل لزم تصويره فى الفراغ ومن ثم متى علمت مساقط اى نقطة
وجب ان يتصوره موضعها الفراغى وبالعكس اى متى علم موضعها الفراغى وجب
ان يستنتج منه حالا وضعها مسقطيها

* (فى بيان اوضاع النقطة) *

* (١٠) *

النقطة يمكن ان تشغل عدة محال فراغية يدل عليها باوضاع مسقطيها بالنسبة
لخط الارض كما يدل على الاوضاع المذكورة فى الهندسة التحليلية بعلامات
وقادير الخطوط الاحداثية ولنذكر الاوضاع فنقول

(اولا) اذا كانت النقطة فى احدى الزوايا الاربع الزوجية الحادثة من مستويي
المسقط يسهل مشاهدة وجود مسقطيها على الجزئين المكونين لهذه
الزوايا من المستويين وتتضح اوضاعها الاربع التى تشغلها فى هذه الحالة من
الشكل (٣)

(ثانيا) اذا كانت النقطة على احد مستويي المسقط فلا مسقط لها على هذا
المستوى الا نفسها وامام مسقطها الاخر فيكون بالضرورة على خط الارض
ولذلك اربع حالات تظهر لك من الشكل (٤) المبين فيه انه لا علامة فوق رمز
النقطة ليبدل ذلك على ان النقطة هى التى على المستوى لا احد مسقطيها

(ثالثا) اذا كانت النقطة على خط الارض فلا منسقط لها الا هي واذا لم يكتب بجوارها الاحرف م فقط كما هو مبين في (الشكل ٥)
 (رابعا) اذا كانت النقطة في احدى الزوايا الاربع الزوجية امكن ان تكون على بعد واحد من مستوي المسقط اي انه يمكن ان يكون $وم = وم$ انظر (الشكل ٢) و (بند ٥) ومتى كان المسقطان في جهة واحدة من جهتي خط الارض انطبعا على بعضهما ولذلك حالتان مبينتان في (الشكل ٦) ومن هنا ينتج

اولا ان جميع النقط المتمازاة المساقط والمتساوية البعد عن خط الارض توجد على المستوى القاسم للزاويتين $مع$ و $خس$ الى قسمين متساويين وثانيا ان كل نقطة اتحد مسقطاها توجد على المستوى القاسم للزاويتين $مع$ و $مس$ الى قسمين متساويين

(في بيان المستقيم)

(١١)

اذا انزلنا من جميع نقط مستقيم اعمدة على المستوى الافقي تكون اثارها اي مواقعها المساقط الاقية لنقط المستقيم ويكون الخط الجامع لها المسقط الافقي للمستقيم وتكون جميع هذه الاعمدة في مستو واحد عمود على المستوى الافقي ويكون تقاطعه مع هذا المستوى مسقط المستقيم وكذا يقال في سقوط اي مستقيم على مستو ما فينتد يكون مسقط المستقيم على مستو ما خطا مستقيما

وكيفية تحصيل مسقطي مستقيم ان يمر بهذا المستقيم مستويان عمودان على مستوي المسقط يسمى احدهما بالمستوى المسقط اقبيا للمستقيم والاخر بالمستوى المسقط رأسيا للمستقيم

(١٢)

ولنرمز من الآن فصاعدا لى مستقيم فراغى بحرف كبير ومسقطيه بعين
الحرف المذكور موضوعا عليه حرف ω ان كان المسقط اقصيا ω
ان كان المسقط رأسيا فرمزي ω و ω يدلان على المسقطين الافقي والرأسي
للمستقيم ω كافي (الشكل ٧)
وقد يرمز للمستقيم بنقطتين من نقطه لكن المستقيم المحدد الطول يرمز اليه
دائما بنقطتي نهايته

اي مستقيم يتعين على العموم بمسقطيه لانه اذا اقيم من ω مستو عمود على
المستوى الافقي ومن ω اخر عمود على المستوى الرأسى يوجد المستقيم ω
على هذين المستويين معا فيكون بالضرورة خط تقاطعهما ومن هنا ينتج ان
المستقيم المعلوم بمسقطيه يعلم حقيقة بالمستويين حيث انه خط تقاطعهما
ويتعين ايضا اي مستقيم تعيينا تاما بنقطتين من نقطه لانهما يعينان نقطتين من
كل من مسقطيه

ولنعبر اعتبارا زائدا من نقط المستقيم النقطتين اللتين يقطع فيهما المستقيم
المذكور مستويي المسقط ويسميان باثرى المستقيم لانهما صالحتان كل
الصلاحية لتعيين اتجاهه

* (المسئلة الاولى) * اذا كان المعلوم اثرى مستقيم والمطلوب ايجاد مسقطيه
يقال

اذا فرض ان α الاثر الافقي للمستقيم α و α اثره الرأسى ككافي
الشكل (٧) يكون α و α على خط الارض انظر (ثانيا من
نمرة ١٠) وعلى العمودين النازلين على هذا الخط من النقطتين
 α و α انظر بند (٨) ومن هنا يتصل نقطتان α و α من ω

واخريان - و ا من و فهذا يعلم المسقطان

* (المسئلة الثانية) * اذا كان المعلوم مسقطي مستقيم والمطلوب ايجاد اثره يقال

حيث ان الاثر الافقي $\overline{ك م ا ف}$ (شكل ٧) على المستقيم و والمستوى الافقي يوجد مسقطه الرأسى بالضرورة على و وعلى خ ص فيكون حيثئذى ا وتكون النقطة ا هي مسقط قسم الافقى فتكون حيثئذى على و وعلى عمود واحد على خط الارض مع ا اى انه يكون فى نقطة تقاطع هذين المستقيمين ا وكذلك اذا كان الاثر الرأسى على و وعلى المستوى الرأسى يكون مسقطه الافقى فى و اما النقطة قسمها فتكون فى -

ومن هنا ينتج انه يلزم لا ييجاد اثر مستقيم ان يمد المسقط المخالف للاثر فى الاسم الى خط الارض وان يقام من نقطة التقابل عمود على الخط المذكور فتكون نقطة تقاطعه مع المسقط الاخر الاثر المطلوب

قد لا ينحصر المستقيم الممتد الى غير نهاية فى زاوية واحدة وحيثئذى يكون الجزء السكائن فى الزاوية م م ع مشاهدا لكن كل ما يكون منه خلف المستوى الرأسى او اسفل الافقى يكون مخبأ باحد هذين المستويين ويبين ذلك على الشكل بطريقة رسم مساقط اجزاء هذا المستقيم وقد اصطلح على رسم مسقطى الجزء المحصور فى الزاوية م م ع بخطين اتصالين وعلى رسم مسقطى جزء المستقيم المحصور فى احدى الزوايا الثلاث الاخر بخطين تقطعين ذواتى نقط مستطيلة كما يظهر ذلك من اشكال الامثلة الآتية ومن المعلوم ان الجزء المشاهد من المستقيم يكون مسقطه الافقى تحت خط الارض بخلاف مسقطه الرأسى فانه يكون فوقه

لكن لا يليق هذا الاصطلاح الا بالخطوط الاصلية من الشكل كل اعنى
الخطوط الدالة على معالم المسئلة او مجاھيلها المطلوبة واما الخطوط غير الاصلية
فتقسم

* (اولا) * الى الخطوط المساعدة وهى وان لم تكن من جملة الخطوط الاصلية
لها وقع عظيم فى الشكل وترسم بخطوط متقطعة بمعنى انها مكونة من اجزاء
مستقيمة متفاصلة بنقطة او عدة نقاط وتسمى بالخطوط المركبة

* (وثانيا) * الى خطوط العمل وقد تسمى بخطوط السقوط وتعتبر عدمية لقلة
تفعها فى الرسم وترسم بخطوط نقطية مكونة من اجزاء اصغر وادق من الاجزاء
الداخلية فى تركيب الخطوط المساعدة

وقد يوجد زيادة على اجزاء الشكل الخبا بمستوى المسقط اجزاء اخرى يمكن ان
تكون مخبأة باجزاء الشكل الامامية لكن لعدم تكثير خطوط الشكل النقطية
المضر بوضوحه نفرض غالبا ان اجزاء الشكل المذكورة تكون مبنية
بالخطوط المرسومة على مستوي المسقط الكافية لتعيينها

* (فى بيان اوضاع المستقيم) *

يمكن ان يشغل المستقيم عدة اوضاع فراغية تميز باوضاع المساقط بالنسبة
لخط الارض ويرسم هذه المساقط ولتذكر ذلك فنقول

* (اولا) * قد يكون المستقيم ما يلا بالنسبة لمستوى المسقط وجزؤه المحصور
بين الاثرين فى احدى الزوايا الاربع الزوجية فينتز يكون اثر المستقيم
المذكور كائين على جزئ المستويين المكونين للزاوية المذكورة فبذلك يحصل
معنا اوضاع اربعة كما فى (الشكل ٨) ونسهل معرفتها بمجرد رسمها ولاجل
بيان هذا الرسم نقول حيث كان فى الوضع الاول الجزء ا - الكائن فى الزاوية
م ع مشاهدا يكون الجزآن ا - و ا - من المسقطين مرسومين

بخطين اتصاليين لكن المستقيم و بعد مجاوزته نقطة ا يمر تحت المستوى الافقي
ومجاوزته النقطة ب يمر خلف المستوى الرأسى ومن ثم يمر و اجزى المسقط
الافقى الكائنين خارج النقطتين ا و ب و جزى المسقط الرأسى الكائنين خارج
النقطتين ا و ب بخطوط نقطية وهذه الكيفية يصنع الرسم اللازم اجراؤه
في الحالات الثلاث الاخر

ولنفرض الآن ان المستقيمت مرسومة بدون ركن فنقول لاجل الاستدلال
بكيفية الرسم على مسقط المستقيم الافقى يقال ان جزء المستقيم المرسوم
مسقطاه بخطين اتصاليين لا بد وان يكون في الزاوية م ع ففي الوضع الرابع مثلا
يكون جزء المستقيم الذى على يسار النقطة ا هو الموجود في الزاوية الاولى
فيكون مسقط هذا الجزء الافقى تحت خط الارض ومسقطه الرأسى فوقه
وبذلك تكون النقطة ا اثر المستقيم الافقى والنقطة ب اثر الرأسى ويقاس
على ذلك ايجاد اتجاه المستقيم في الاوضاع الثلاثة الباقية

(وثانيا) قد يكون المستقيم موازيا للمستوى الافقى فيكون مسقطه الرأسى
حيث موازيا لخط الارض لان جميع نقط المستقيم و على بعد واحد من
المستوى الافقى واما المسقط الافقى فيكون حيثما اتفق وتأتى هنا الاوضاع
الثلاثة المبينة في (الشكل ٩) باعتبار كون المستقيم و فوق المستوى
الافقى او داخله او اسفله

(وثالثا) قد يكون المستقيم موازيا للمستوى الرأسى فيكون مسقطه
الافقى موازيا لخط الارض واما مسقطه الرأسى فيكون حيثما اتفق وتأتى هنا
الاورضاع الثلاثة المبينة في (الشكل ١٠) باعتبار كون المستقيم و امام
المستوى الرأسى او داخله او خلفه

(ورابعا) اذا كان المستقيم كما قد يتفق موازيا للمستوى المسقط معا فيلزم ان
يكون موازيا لخط الارض فيكون مسقطاه حيث موازيا لخط الارض خ ص

ومن هنا يتحمل معنا اوضاع تسعة اربعة منها فيما اذا كان المستقيم في احدى
الزوايا الاربع الزوجية كما في (الشكل ١١) واربعة منها فيما اذا كان المستقيم
على احدى اربع جهات مستويي المسقط كما في (الشكل ١٢) والتاسع
فما اذا كان المستقيم متعامدا مع خط الارض كما في (الشكل ١٣)

وهذه الاوضاع التسعة عين تسعة اوضاع النقطة الميمنة في (الشكل ٣ و ٤ و ٥)
فيكون فيها ان تبدل النقطة م و م و م الخ في (الشكل ٣ و ٤ و ٥) بالمستقيمان
و و و و الخ الموازيين لخط الارض فاذا كان المستقيم في هذه الحالة
متساوي البعد عن المستويين كان مسقطاه متساويي البعد عن خط الارض
ولو كان مسقطاه في جهة واحدة لانطبقا على بعضهما كما في (الشكل ١٤)
وكان المستقيم حينئذ في المستوى القاسم للزاويتين م س و خ ع الى
قسمين متساويين

* (وخامسا) * اذا كان المستقيم عمودا على المستوى الافقي يؤل مسقطه الافقي
الى نقطة واحدة ويكون مسقطه الرأسى عمودا على خط الارض لان المستوى
المسقط للمستقيم رأسيا والمستوى الرأسى للمسقط يسكونان عمودين
على المستوى الافقي ويكون للمستقيم في هذه الحالة ثلاثة اوضاع باعتبار كونه
امام المستوى الرأسى او داخله او خلفه كما في (الشكل ١٥)
* (وسادسا) * اذا كان المستقيم عمودا على المستوى الرأسى كان له كذلك ثلاثة
اوضاع متشابهة باعتبار كونه فوق المستوى الافقي او داخله او اسفله كما في
(الشكل ١٦)

وينتج من هاتين الحالتين ان م كافي (الشكل ٢) هو المسقط الرأسى
للمستقيم المسقط افقيا للنقطة م ومسقطه الافقي النقطة م واما م و
فهو المسقط الافقي للمستقيم المسقط رأسيا للنقطة م ومسقطه الرأسى م
* (وسابعا) * اذا كان اتجاه المستقيم في الفراغ عمودا على خط الارض صار مسقطاه

مستقيماً واحداً عموداً على خط الأرض لئلا الوامرين من المستقيم و مستوي
 رأسياً لكان هذا المستوى عموداً على خط فعل ذلك يكون تقابلاً مع
 مستوي المسقط و و عمودين على خط وقاطعين له في نقطة واحدة
 فينتطبقان على بعضهما بالضرورة بعد انطباق المستوى الرأسى على الأفقى
 ومن هنا ينتج لئان مسقطى المستقيم العمودين على خط الأرض غير كافيين
 لتعيين اتجاهه في الفراغ لكن اذا علم منه نقطتان تعين الاتجاه تماماً ويكون
 له حينئذ أربعة اوضاع بحسب انحصار الجزء الكائن بين الاثرين في احدى الزوايا
 الاربعة الزوجية كفى. (الشكل ١٧)

* (وثامناً) * اذا قابل المستقيم خط الأرض اتخذ اثنان و في نقطة واحدة
 من الخط المذكور وقد يتفق في هذه الحالة ان المسقطين و و يصنعان
 كفى (الشكل ١٨) مع جزء واحد من خط زاويتين حادتين احدهما
 فوقه والاخرى تحته وهذا ينتسب بالضرورة للمستقيم النافذ في الزاويتين
 مع و ح س واما اذا كانت الزاويتان الحادتان مصنوعتين من المسقطين
 مع جزءى خط كفى (الشكل ١٩) دل ذلك بالضرورة على مستقيم
 نافذ في الزاويتين ح ع و م س فاذا كانت الزاويتان متساويتين
 يكون المستقيم اما على المستوى القاسم للزاويتين مع و خ س الى
 قسمين متساويين واما على المستوى القاسم للزاويتين خ ع و م س
 كذلك انظر رابعاً من فقرة (١٠) وفي هذه الحالة يصير المسقطان مستقيماً
 واحداً كفى (الشكل ٢٠)

* (وتاسعاً) * اذا كان المستقيم المقابل لخط الأرض عموداً عليه فان مسقطاه
 يتحدان ويصيران خطاً واحداً عموداً على خط ولا يكفيان حينئذ لتعيينه
 فيلزم اخذ نقطة مما من المستقيم المذكور كفى (الشكل ٢١)

* (١٨) *

وينتج مما ذكر جميعه ان المستقيم يكون معيناً بالكيفية بمساقط نقطتين من نقطه

الافى احوال مخصوصة فان مسقطاه لا يكفيان في تعيينه

(١٩)

اي مستقيمين ليسا عمودين على خط الارض يدلان ابداء على مسقطى مستقيم فراغى لانا اذا اتنا المستويين المسقطين من المستقيمين يتقاطعان في مستقيم معين وقد يكون المستقيم غير معين اذا اتحد مسقطاه وصارا خطا واحدا وعمودا على خط وى مستقيمين احدهما عمود على خط الارض او كل منهما عمود عليه ولا يقطعانه في نقطة واحدة لا يصح ان يكونا مسقطى مستقيم واحد فراغى

(٢٠)

المستقيمان الفراغيان اما ان يتقاطعا او يتوازيان ولا يكونان في مستوي واحد وانبين ذلك فنقول

(اولا) اذا تقاطعا كما في (الشكل ٢٢) كان مسقطا نقطة تقابلهما م على مساقط و و و حيث يلزم ان يكون م و م على عمود واحد على خط الارض انظر ثمرة (٨)

(وثانيا) اذا توازيا فسقطاهما المتحدان الاسم يكونان متوازيين كما في (الشكل ٢٣) لان المستويين المسقطين متوازيان
(وثالثا) اذا لم يكونا في مستوي واحد فتقطع مسقطيهما الرأسين لا تكون مع نقطة تقاطع مسقطيهما الا فقيمين على عمود واحد على خط الارض كما في (الشكل ٢٤)

(٢١)

ثم ان عكس هذه الدعاوى الثلاث صحيح ايضا اعنى

(اولا) اذا تقاطعت مساقط المستقيمين في نقطتين على عمود واحد على خط الارض كما في (الشكل ٢٢) نقاط المستقيمان في الفراغ لان مسقطى النقطة م حيث انهما على مسقطى المستقيم و تكون النقطة على هذا الخط وبذلك تكون ايضا على مستقيم و

* (وثانيا) * اذا توازي المسقطان المتحدان الاسم كما في (الشكل ٢٣) توازي المستقيمان فان المستويان الاربعة المسقطية متوازيه مثني وينبني على ذلك ان خطوط التقاطع الاربعة التي من جملتها مستقيما و و متوازية ايضا * (وثالثا) * اذا تقاطعت مساقط مستقيمين في نقطتين ليستا على عمود واحد على خط الارض لا يكون المستقيمان في مستوي واحد كما في (الشكل ٢٤) فان اى مستقيمين على مستويان لم يتقاطعا يتوازيا فحينئذ تكون مساقطهما مرتبة كما في (الشكل ٢٢ و ٢٣) وينتج من ذلك انه اذا توازي المسقطان الافقيان فقط او الرأسيان فقط لا يكون المستقيمان متوازيين

* (7 7) *

متى كانت مساقط مستقيمين اعمدة على $\chi\psi$ كانت متوازية ولا يلزم من ذلك ان يكون المستقيمان الفراغيان كذلك

لكن اذا كان و و كافي (الشكل ٢٥) متوازيين وانتخبنا على كل
من المستقيمين نقطتين ا و - ا و - و وهما رأسين نازلين
من النقطتين - و - واقعيين مارين من النقطتين ا و ا وقاطعين
للرأسين في نقطتين رمزهما - و - حدث مثلثان - و - ا -
متشابهان لان اضلاعهما المتناظرة متوازية فيحدث

$$\frac{2}{3} : \frac{1}{3} :: 2 : 1$$

ایک کن جیٹ ان

[illegible]

بحدوث بالتبدیل

$\frac{r}{r-1} : \frac{r}{r-1} :: \frac{r}{r-1} : \frac{r}{r-1}$

* (7.7) *

ويقال في عكس ذلك متى حصلت هذه التناسبة يكون المستقيمان و و متوازيين لان المثلثين ا-ا-ا و ا-ا-ا القائمى الزاويتين في و و

يكونان بعد تصورهما كما ذكر متشابهين لان فيهما زاويتين متساويتين كل منهما
محصورة بين ضلعين متناسبين مع ضلعي الاخرى وموازيين لهما كل لنظيره
ومنه يحدث ان الزاوية α و β او المستقيمين α و β متوازيان
* (٢٤) *

* (المسئلة الثالثة) * اذا اريد ان يمر من نقطة معلومة مستقيم مواز لآخر
معلوم يقال

لا بد كفا في (الشكل ٢٦) ان يمر مسقطا المستقيم المقروض α
بمسقطي النقطة المعلومة β كل بنظيره وان يكونا موازيين لمسقطي المستقيم
المعلوم α و كل لنظيره

* (في بيان الخطوط المنحنية) *

* (٢٥) *

اذا انزلنا من جميع النقاط α و β و γ ... م كافي (الشكل ٢٧)
اعني نقط المنحنى α اعمدة على المستوى الافقي تكون من الاتار
 α و β و γ ... م اعني اثار الاعمدة المذكورة الخط α وهو
المسقط الافقي للمنحنى المذكور α واما الاعمدة نفسها
 α و β و γ ... م فتكون متوازية ويحدث عنها
سطح سوف نسميه بالسطح الاسطوانى ويقال له ايضا سطح مسقط او اسطوانة
مسقطه افقيا للمنحنى α واذا انزلنا ايضا اعمدة على المستوى الراسى
تكون منها اسطوانة مسقطه رأسيًا للمنحنى α فالمنحنى α حينئذ هو تقابل
سطحين

واذا كان المنحنى α مرسوما داخل مستو عمود على المستوى
الافقى مثلا كانت جميع المستقيمت α و β و γ ... م في المستوى
المذكور وكان α تقابل هذا المستوى بالمستوى الافقى ومنه ينتج ان

مسقط المنحنى ج الافقى خط مستقيم وان الآخر منحنى بالضرورة واما اذا كان المنحنى ج فى مستو عمود على خ ض فكل من مسقطيه يكون مستقيما

* (٢٦) *

* (المسئلة الرابعة) * اذا كان المراد ايجاد نقط تقابل المنحنى بمستوى المسقط يقال ان النقط التى يتقابل فيها المنحنى ج مع المستوى الافقى كفى (الشكل ٢٨) تنسقط انسقاطا رأسيا على ج وعلى خ ض انظر ثانيا من (نمرة ١٠) فينتد يكون المسقطان ا و - فى تقاطعهما وتكون النقطتان ا و - على ج وعلى العمودين القائمين من النقطتين ا و - على خ ض ومن المعلوم ان هذين العمودين يقابلان عموما ج فى عدة نقط يمكن جعلها كلها بلا تمييز آثارا للمنحنى ج مالم يكن هنالك حالة تعجزنا على عدم اعتبار بعضها آثارا كما لو فرضنا مثلا ان ا و - ليسا اثرين للمنحنى ج وبمثل ذلك يكون ايجاد الاثرين الرئيسين

تنبيه قد يوجد جزء من ج غير مقابل لجزء من ج فلا يكون بالضرورة مسقط جزء من المنحنى ج كما ان هنالك جزءا من ج ليس جزءا من مسقط المنحنى ج وسنشرح ذلك

* (فى بيان المستوى) *

* (٢٧) *

يمكن ان يمر مستو واحد بمستقيمين متوازيين او متقاطعين او بمستقيم ونقطة وينتخب من المستقيمات التى يمكن ان تعين موضع مستو فراغى المستقيمان اللذان يقطع ذلك المستوى فيهما مستويي المسقط ويسميان باثرى المستوى ومن المعلوم انه لا بد وان يتقابل اثرا مستويا خط الارض فى نقطة واحدة هى نقطة تقابل الخط المذكور بالمستوى

ولنرض لاي مستو فراغى بحرف من حروف الهجاء ولاثرية الافقى والرأسى

بالحرفين ق و ر عايمار من المستوى كما في (الشكل ٢٩)
 فرم ق و ر يدلان على اثرى المستوى م ومتى علم مستويين مستقيمين
 رمز له برمزى المستقيمين المذكورين موضوعين بين قوسين فرمز (أب) مثلا
 يدل على المستوى المعين بكل من المستقيمين أ و ب كما نرسم للمستوى المعين
 بالمستقيم أ والنقطة أ برمز (أ) ورمز (أ-ج) يدل على
 المستوى المار بالنقط الثلاث أ و - و ج
 * (٢٨) *

* (المسألة الخامسة) * اذا كان المسقط الافقى لمستقيم على مستوي معلوم باثريه
 معلوما والمطلوب إيجاد مسقطه الرأسى يقال
 من المعلوم كما في (الشكل ٢٩) ان اثرى المستقيم على مستوي يكونان
 بالضرورة على اثرى المستوى فيكون الاثر الافقى للمستقيم و النقطة أ التى
 هى تقابل ق بالمسقط و ومن ذلك نستخرج النقطة أ من المسقط و
 وايضا حيث ان الاثر الرأسى للمستقيم و ينسقط اقليما فى النقطة -
 التى هى تقابل و و خض وان النقطة نفسها فى - على ر يعلم و
 واذا علم و استنتج منه ايضا و

* (٢٩) *

* (المسألة السادسة) * اذا كان المسقط الافقى لنقطة على مستوي معلوم باثريه
 معلوما والمطلوب إيجاد مسقطها الرأسى يقال
 اذا امرنا فى مستوى م خطا مستقيما و من النقطة م كما فى
 (الشكل ٢٩) يمر و من م ومنه ينتج و انظر (بند ٢٨)
 وحيث ان م يوجد على و وعلى العمود النازل من النقطة م على
 خض يكون م فى تقابل هذين المستقيمين وكذلك اذا علم م يستنتج منه
 بالكيفية المذكورة م ومن هنا ينتج ان المستوى يتعين باثريه نعيينا كايما

* (١٩) *

* (٣٠) *

ويتعين ايضا المستوى بمستقيمين حيث ما اتفق يتقاطعان
وبيان ذلك ان يفرض ان \overline{M} كما في (الشكل ٣٠) المسقط الافقي لنقطة
من المستوى (أب) انظر بند (٢٧) فيمر من النقطة \overline{M} في المستوى
المذكور مستقيما \overline{S} فيمر \overline{S} من \overline{M} ويقابل بالضرورة المستقيم \overline{S}
المستقيمين \overline{A} و \overline{B} في النقطتين \overline{A} و \overline{B} اللتين مسقطاهما الاقعيان
هما \overline{A} و \overline{B} وهما تقابل \overline{S} مع \overline{A} ومع \overline{B} ومن هنا ينتج
ان \overline{A} و \overline{B} اللذان يعلم منهما المسقط \overline{S} الذي يكون المسقط الرأسى \overline{M}
لنقطة \overline{M} عليه فينتد بتعين هذه النقطة ولا يخفى انه لو كان المستقيمان
 \overline{A} و \overline{B} متوازيين لحدث مثل ذلك

* (٣١) *

* (المسألة السابعة) * اذا علم مستويين مستقيمين واريدا ايجاد اثره يقال
ان اثرى كل مستقيم لا بد وان يوجد على اثرى المستوى المذكور كما في
(الشكل ٣١ و ٣٢) فاذا بحثنا عن الاثار المذكورة بالكيفية المقررة في فقرة (١٥)
نجد نقطتين \overline{A} و \overline{B} من الاثر \overline{C} وآخرين \overline{A} و \overline{B} من \overline{C}
ولا بد ان يقطع هذان الاثران خط الارض \overline{X} في نقطة واحدة وهذا
برهان على صحة الاعمال

وانذ كر على سبيل الاستطراد ان احسن طرق حل المسائل المراد حلها
الاقتصار بقدر ما يمكن على طرق تعميمها بدون زيادة ينشأ عنها عدم سهولة
الاعمال

* (٣٢) *

ولو اريد ايجاد اثرى مستوي معلوم بالمستقيم \overline{O} والنقطة \overline{M} للزم ان يمر من
النقطة المذكورة مستقيما \overline{O} مواز للمستقيم \overline{O} او قاطع له ثم يبحث عن
اثرى المستوى (و)

وإذا كان المستوى معلوما بثلاث نقط حدث لنا بجمعهم سامتني ثلاث مستقييات
والاحسن ان يجمع بين اثنين منها بمستقيم ويعد من النقطة الثالثة موازله وبذلك
يسهل حل هذه المسائل المختلفة

* (في بيان اوضاع المستوى) *

* (٣٣) *

يمكن ان يشغل المستوى عدة اوضاع فراغية نذكرها فنقول

* (اولا) * قد يكون المستوى مائلا بالنسبة لمستويي المسقط فله حينئذ حالتان
متميزتان كافي (الشكل ٣٣) بحسب كون الاثرين يصنعان مع جزء من
خ ض اومع جزئين منه مختلفين زاويتين حادتين α و β -

* (وثانيا) * يمكن في الحالتين المذكورتين ان تكون الزاويتان α و β -

متساويتين وفي الحالة الثانية فقط يتطبق الاثران كافي (الشكل ٣٤)

* (وثالثا) * قد يكون المستوى م عمودا على المستوى الافقي فيكون اثره
الرأسي عمودا ايضا على المستوى المذكور كافي (الشكل ٣٥) ويلزم
بالضرورة ان يكون عمودا على خط الارض

* (ورابعا) * قد يكون المستوى عمودا على المستوى الرأسى كافي (الشكل ٣٦)
فيكون اثره الافقي عمودا على خط الارض بالضرورة

* (وخامسا) * قد يكون المستوى عمودا على خط الارض فيتطابق اثره بالضرورة
ويصير ان مستقيما واحدا عمودا على خط الارض كافي (الشكل ٣٧)

* (وسادسا) * قد يكون المستوى موازيا للمستوى الرأسى فيكون اثره الافقي
موازيا لخط الارض خ ض ولا يوجد له حينئذ اثر رأسي والاولى ان يقال انه

يوجد لانها ثانيا وحينئذ يشغل المستوى وضعين ايضا كافي (الشكل ٣٨)

* (وسابعا) * قد يكون موازيا للمستوى الافقي حينئذ لا يكون له اثر افقي واما
اثره الرأسى فيكون موازيا خ ض ويمكن ان يشغل وضعين ايضا كما

في (الشكل ٣٩)

* (وثامنا) * قد يكون المستوى موازيا لخط الارض فيكون اثره موازيين
 لخط خض لانهما لو لم يساوي لونا كذلك لتقابل خط الارض بالمستوى
 ويمكن ان يكون للمستوى م اربعة اوضاع بحسب كينونة اثره على
 جزئين من اجزاء مستوي المسقط كما في (الشكل ٤٠)

* (وتاسعا) * قد يكون المستوى ما يلا بالنسبة لمستوي المسقط ايضا ميلا
 متساويا فيكون اثره حينئذ متساوي البعد عن خط الارض وينطبقان كل
 منهما على الآخر اذا كانا في جهة واحدة كما في (الشكل ٤١)

* (وعاشرا) * لا يمكن تعيين المستوى المار بخط الارض باثره الذين لا يكونان
 الا مستقيما واحدا لكن اذا كان المستوى معيناً بمستقيم ونقطة اختيار خط الارض
 واما النقطة فتؤخذ حيث ما اتفقت ويرمز لها بعين رمز المستوى المذكور
 فيكون له حينئذ كما في (الشكل ٤٢) وضعان بحسب قسمه للزاوية م ع
 والمقابلة لها وقسمه للزاويتين الاخرتين الزوجيتين

* (وحادي عشر) * قد يكون المستوى احد مستويي المسقط فيكون احد
 مسطوي النقطة على خط الارض

* (٣٤) *

وينتج مما ذكر جميعه انه يمكن تعيين المستوى بمستقيم ونقطة وان اثره غير كافيين
 في حالة مخصوصة

* (٣٥) *

ويجب ان يميز من المستقيمات المستقيمة مستقيمة على اي مستوي المستقيمات التي
 هي

* (اولا) * افقيات المستوى وهي مستقيمات كائنة على المستوى المذكور
 وموازية للمستوى الافقي

* (وثانيا) * رأسيات المستوى وهي مستقيمات كائنة على المستوى المذكور
 وموازية للمستوى الرأسي

* (وثالثا) * الخطوط الاعظم ميلا من غيرها المستوي بالنسبة للمستوى الافقي وهي

مستقيمان اعمدة على الاثر الافقى لهذا المستوى بيان ذلك كما في (الشكل ٤٣) انا
 اذا انزلنا من النقطة م من المستوى م ع الخط م و عمودا على م ن
 والخط م ك ما يلاحظ عليه وانزلنا ايضا م ع عمودا على المستوى ا ن ووصلنا
 ع بكل من نقطتي و و ك يحدث ع و و ع ك فيكون ع و عمودا
 على م ن واما ع ك فيكون ما يلاحظ عليه ومن هنا ينتج ان ع و > ع ك
 وحينئذ يكون $\frac{ع م}{ع و} < \frac{ع م}{ع ك}$ لكن حيث ان هاتين النسبتين تسميان
 بميل م و م ك على المستوى ا ن يكون م و الخط
الاعظم ميلا من غيره

ولننبه على ان $\frac{ع م}{ع و} = \text{ظا } \alpha$ وينتج من ذلك ان ميل اي مستقيم او مستو
 على مستو آخر يتبين بالظل المساحي للزاوية الحادثة من المستقيم المذكور
 او من المستوى مع المستوى الاخر

(ورابعا) الخطوط الاعظم ميلا من غيرها المستوى بالنسبة للمستوى الرأسى
 وهى مستقيمان اعمدة على الاثر الرأسى للمستوى المذكور واثبات ذلك كاثبات
 ما سبق

(المسئلة الثامنة) اذا كان المراد رسم افقى ورأسى لمستوي يقال
 حيث ان الافقى و للمستوى م مواز للمستوى الافقى كما في (الشكل ٤٤)
 يكون مسقطه الرأسى و موازيا لـ ض واثره الرأسى لا بد وان يكون
 على ر ا وعلى و فيكون في النقطة - التى مسقطها الافقى
 - وحيث ان المستقيم و مواز للاثر ق فلا بد وان يكون مسقطه
 الافقى ايضا و موازيا للاثر المذكور ق انظر (ثانيا من بند ٢٠)
 ومارا بالنقطة -

وحيث كان الرأسى ب للمستوى م موازيا للمستوى الرأسى يكون

مسقطه الافقى $\bar{ب}$ موازيا $\bar{خ}$ $\bar{ض}$ ومسقطه الرأسى $\bar{ب}$ موازيا
للأثر $\bar{ر}$

وحيث ان المستقيمين $\bar{و}$ $\bar{ب}$ كائنان على المستوى $\bar{م}$ فانهما يقاطعان
فى نقطة واحدة $\bar{م}$ فيكون $\bar{م}$ و $\bar{م}$ بالضرورة على عمود واحد على
 $\bar{خ}$ $\bar{ض}$ وهذا برهان على صحة الاعمال

(٣٧)

(المسئلة التاسعة) اذا كان المطلوب رسم خطين اعظم ميلا من غيرهما
فى مستو معلوم يقال

ان (الشكل ٤٣) يثبت ان المسقط $\bar{ع}$ و للخط الاعظم ميلا من غيرة $\bar{م}$ و $\bar{ن}$
المستوى $\bar{ع}$ $\bar{م}$ بالنسبة للمستوى ان عمود على $\bar{م}$ $\bar{ن}$ الذى هو خط
تقابل المستويين

اذا تقرر هذا فلا بد وان يكون المسقط الافقى $\bar{و}$ للخط الاعظم ميلا من غيره
بالنسبة للمستوى الافقى عمودا على $\bar{ق}$ كفاى (الشكل ٤٥) ومنه يستخرج
 $\bar{و}$ يمتضى (بند ٢٨) وايضا حيث ان المسقط الرأسى $\bar{ك}$ للخط الاعظم ميلا
من غيره بالنسبة للمستوى الرأسى عمودا على $\bar{ر}$ يستخرج منه المسقط
الافقى $\bar{ك}$

وحيث ان المستقيمين $\bar{و}$ $\bar{ك}$ الكائنين على المستوى $\bar{م}$ يقاطعان
فى نقطة واحدة $\bar{م}$ يجب ان يكون $\bar{م}$ و $\bar{م}$ على عمود واحد على
 $\bar{خ}$ $\bar{ض}$

(٣٨)

ويشاهد مما ذكر ان الخط الاعظم ميلا من غيره بالنسبة لمستويين كفى لتعيينه تعيينا
تاماً حيث يمكن بواسطة ان يحدث عدة اقصيات او رأسيات بقدر ما يراد

للمستوى المذكور يتقاطع منها اثنان

(٣٩)

(المسئلة العاشرة) اذا كان المطلوب ان يمر من نقطة معلومة مستوى مواز لاخر معلوم يقال

من المعلوم ان الاثار المتحدة الاسم لمستويين متوازيين متوازية وانه زيادة على ذلك اذا كان معنامستويان متوازيان م و ك امررنا من نقطة م من نقط المستوى ك مستقيما موازيا للمستقيم كاث في المستوى م يكون كله محصورا في المستوى ك

اذا ثبت ذلك نمر في المستوى المعلوم م كافي (الشكل ٤٦) مستقيما و ثم نمر من نقطة م مستقيما آخر ط موازيا و فيكون في المستوى المطلوب ك ومن هنا ينتج ان اثره الافقي ا نقطة من نقط ق واثره الرأسى ر نقطة من ر وحيث انه زيادة على ذلك لا بد وان يكون الاثر الاول موازيا للآخر ق والثاني موازيا للآخر ر يكونان معلومين ويجب تحقيق العملية ان يتقاطعا على خ ض في نقطة واحدة

ويمكن ان يقال انه لا حاجة الى امرار المستقيم و لاشا لو امررنا من النقطة المعلوم م اتقيا ط للمستوى ك كافي (الشكل ٤٧) لصار ط موازيا للآخر ق فينتد يكون موازيا ايضا الى ق ويكون ط موازيا خ ض ويكون الاثر الرأسى ر لهذا المستقيم نقطة من ك الذي يجب ان يكون موازيا للآخر ر ومقابل الخط الارض في نقطة ك منها يمر الاثر ق ويوازي الاثر ق ولو امررنا بديل الافقي رأسيا للمستوى لوجدنا بلا واسطة نقطة من ق

(٤٠)

واذا كان المستوى م ليس معلوما باثره بل بمستقيمين متقاطعين ك في بالضرورة ان يمر من النقطة المعروفة مستقيمان موازيان للمستقيمين المقروضين

كل لنظيره وبهما يتعين المستوى المطلوب
واما اذا كان المستوى م المذكور معلوما بمستقيمين متوازيين او بمستقيم
ونقطة او بثلاث نقاط فيرجع اولا لاحد الحالتين المذكورتين قبل وذلك اما برسم
انرى المستوى المعلوم كما في (بندى ٣١ و ٣٢) او برسم مستقيمين
كائنين فيه ومتقاطعين ويتعين حينئذ المستوى ك كالمذكور
قبله في بند (٣٩)

* (٤١) *

ولنبين من ايا اصطلاح الرمز المستعمل في الاشكال المتقدمة في هذا الكتاب
فنعول ان (الشكل ١٨) تكرر في اول حالة من احوال (الشكل ٣٣) وان
المقصود من الرمز في (الشكل ١٨) مستقيم يقابل خط الارض ومنه
في (الشكل ٣٣) مستويا فالرمز بالحروف المعلة للمستوى الرأسى غير
كاف لاشترائه بين المستقيمتين والمستويات معا وان الحالة الاولى والثالثة من
(شكلى ١١ و ٤٠) لا يختلفان ايضا الا بالرمز وان (الشكل ١٢)
تكرر بعينه (في شكلى ٣٨ و ٣٩) وان الرمز المستعمل في (الشكل ١٤)
يدل على ان المقصود مستقيمان متحدا المنقاط لمستقيمان مرسوما أحدهما
على الجزء المؤخر من المستوى الافقى والاخر على الجزء الاسفل من المستوى
الرأسى كما في (الشكل ١٢) ولا مستويان موازا أحدهما للمستوى الرأسى
كما في (الشكل ٣٨) والاخر للمستوى الافقى كما في (الشكل ٣٩) وانه
بدون الرمز المستعمل في (الشكل ٤١) لا يعلم مستويان موازيان
لخط الارض متطابقا الا ثار بل يعلم مستويان احدهما مواز للمستوى الافقى
كما في (الشكل ٣٩) والاخر للمستوى الرأسى كما في (الشكل ٣٨) وان
(الشكل ٤٢) لا يدل بدون الرمز المستعمل فيه الا على مسقطى نقطة ولا يمكن
ان يدل على مستويان من خط الارض وليتنبه الى ان تنقيط الخطوط في الامثلة
التي ذكرت لا يجبر وحده على عدم كفاية الرموز المصطلح عليها فالامثلة المذكورة
صالحة جدا لان تدل على نفع الرموز التي اصطالحنا عليها

(الباب الثاني)

في المسائل الاصلية من الهندسة الوصفية
في تغيير مستوي المسقط وفي تدوير الاشكال حول محور

(٤٢)

متى كانت معادلة خط اوسط معقدة يبحث بالتحليلات عن اختصارها وذلك بان ينسب المنحنى او السطح الى محاور جديدة منتقبة بحيث تنعدم بعض الحدود كحدود مستطيلات الاحداثيات والحدود ذات الدرجة الاولى التي تكون في معادلات المنحنيات او السطوح ذات الدرجة الثانية ويمكن في الهندسة الوصفية ان يكون الشكل المرسوم على مستوي المسقط معقد اجدوا من الخطوط التي هي سبب في تعقيده ما يكون ناتجا من طبيعة المسئلة وحيث لا يمكن التخلص منه ومنها ما يكون حادثا من وضع مستوي المسقط بالنسبة للشكل الفراغي المراد بيانه فيمكن في هذه الحالة ازالته بانتخاب مستوي المسقط انتخابا مستحسنا ويمكن ايضا ابقاء مستوي المسقط وتغيير وضع الشكل وهذه العملية تجري دائما بتدوير الشكل حول محور فيحصل من ذلك مسئلتان نذكرهما فنقول

(الاولى) ان يكون مسقطا شكل فراغي على مستويين قائمي الزوايا معلومين والمطلوب ايجاد مسقطيه على مستوي ثالث عمود على احد المستويين المذكورين

(الثانية) ان يكون مسقطا شكل فراغي على مستويين قائمي الزوايا معلومين والمطلوب ايجاد مسقطيه على عين المستويين المذكورين بعد تدويره حول محور ثابت بقدر زاوية معلومة ويتفرع كل من هاتين المسئلتين الى مسائل عديدة مقصودنا من هذا الباب ذكرها مفصلة

(٤٣)

ولننبه قبل الشروع في ذلك على انه يرمز لكل خط ارضى بالرمزين خ و ض

مع وضع اشارة عليه او بدونها ويضعان بحيث لو فرض الانسان انه فوق
المستوى الافقى وامام المستوى الرأسى لرأى الرمز χ على يساره والرمز ψ
على يمينه بحيث يدل وضع كل من هذين الرمزين على جزء فرخ الرسم الذى يراد
ان يبحث فيه عن جهتي كل من مستويي المسقط وعلى ان يوضع ايضا على
كل من رموز مسقط النقط او الخطوط الكائنة على مستويي المسقط
الجديدين الرمز ρ او σ وعليه عين الاشارة التى على χ و ψ
الدالين على خط الارض الجديد ليبدل ذلك على ان المساقط هى عين مساقط
النقط المعلومة او الخطوط كذلك منتسبة للمستوى الرأسى او الافقى الجديدين
وعلى ان يرمز كذلك للآثار الجديدة للمستويات بالرمزين ρ او σ
عليهما عين الاشارات المذكورة وقد لا يوضع خصوصا في مسائل التطبيق
رمز على خط الارض وانما تظل جهة الجزء المقدم من المستوى الافقى والنشرع
في ذكر المسائل فنقول

(المسئلة الاولى) اذا كان المطلوب تغيير المستوى الرأسى بالنسبة لنقطة
يقال

ليفرض كما في (الشكل ٤٨) ان ρ و σ مسقطان للنقطة μ على المستويين المرموز
لهما برمز خط الارض χ و ψ وان المطلوب البحث عن مسقطها على مستوي آخر
رأسى قاطع للافقى في χ فيدل وضع الرمز على ان الجزء الاعلى للمستوى
الرأسى منطبق على المستوى الافقى جهة يسار الرسم وان الجزء الاسفل كذلك
جهة يمينه حيث لم يتغير المستوى الافقى لا يتغير المسقط μ ويبقى ارتفاع النقطة
 μ عن المستوى المذكور على ما كان عليه فحينئذ يكون مسقطها الرأسى
الجديد μ مع ρ على عمود واحد على χ كما في بند (٨) وعلى الجزء
الاعلى للمستوى الرأسى الجديد انظر (اولا من فقرة ١٠) وعلى

بعد وَم من $\text{خ}^{\text{ر}}$ ض يساوى البعد وَم الكائن بين النقطة م والمستوى الافقى انظر (اولا من نمرة ٥)
ويمكن بيان ذلك على الشكل بان يمر من النقطة ع التى هى تقابل $\text{خ}^{\text{ر}}$ مع $\text{خ}^{\text{ر}}$ المستقيم ل عمودا على $\text{خ}^{\text{ر}}$ والمستقيم ط على $\text{خ}^{\text{ر}}$ ثم يراىضا م ل موازيا للخط و ويرسم من المركز ع القوس ل ط والمستقيم ط م موازيا للمستقيم و فينتج بالضرورة

$$\text{وَم} = \text{ل} = \text{ط} = \text{وَم}$$

(٤٥)

(المسئلة الثانية) اذا كان المطلوب تغيير المستوى الافقى بالنسبة لنقطة يقال

هذه المسئلة كفاى (الشكل ٤٨) لا تخالف ما قبلها الا فى اجراء العملية التى علمت فى المستوى الرأسى على المستوى الافقى فاذا اريد تغيير مستوي المسقط معا لزم اجراء العمليتين على التوالى فيفرض انه بعد اجراء التغيير المذكور فى المستوى الرأسى اريد تغيير المستوى الافقى فيفرض ان خط الارض الجديد هو $\text{خ}^{\text{ر}}$ بشرط ان يكون الجزء المقدم من المستوى الجديد تحت $\text{خ}^{\text{ر}}$ وجزؤه المؤخر فوقه فحيث لم يتغير المستوى الرأسى يكون م باقيا على حاله وتكون النقطة م باقية دائما امام المستوى المذكور وعلى بعد واحد منه فينبذ يجب ان يكون المسقط الافقى الجديد م مع م على عمود واحد على خط الارض $\text{خ}^{\text{ر}}$ كفاى نمرة (٨) اى انه يكون تحت هذا الخط الارضى انظر (اولا من نمرة ١٠) وعلى بعد منه $\text{وَم} = \text{وَم}$ انظر (ثانيا من نمرة ٥) ويرسم هذه المتساوية رسما

عما تلا أعمال المتقدمة ينتج

$$\text{وَم} = \text{ل} = \text{ط} = \text{وَم}$$

ويمكن بتغييرات متوالية في المستويين الأفقي والرأسي ان تنسب نقطة لاي مستويين قائمي الزوايا يسمى احدهما دائما مستويا افقيا والاخر رأسيا

* (٤٦) *

* (المسئلة الثالثة) * اذا كان المطلوب تغيير مستوي المسقط بالنسبة لمستقيم يقال

كما يمكن حل المسئلتين المذكورتين بالنسبة لنقطة يمكن حلها بالنسبة لمستقيم لان المستقيم لما كان يتعين بنقطتين كفي في ذلك ايجاد مساقط نقطتين من نقطه على المستويين الجديدين فاذا فرضنا ان χ ض اثر مستورا رأسي جديد كما في (الشكل ٤٩) تبين لنا من وضع الرموز على خط الارض الجديد هذا انطباق الجزء الاعلى على يمين فرخ الرسم والجزء الاسفل على يساره انظر (بند ٤٣) فاذا اخذنا من المستقيم ω نقطتين مثل m و n لا يتغير مسقطاهما الافقيان وحيث انهما فوق المستوى الأفقي يجب ان يكون مسقطاهما الرأسيان الجديدان على يسار χ ض وعلى بعدين

$$\text{وَم} = \text{وَم} \text{ و } \text{ع} = \text{ع} \text{ انظر (بند ٤٤)}$$

وحيث ان الاثر الأفقي للمستقيم ω لا يتغير يقال اذا اجريت العملية بالضبط لا بد وان يكون المستقيم ω عمودا على خط الارض الجديد χ ض

وكان يمكن لاجل ايجاد المسقط الجديد ω للمستقيم ان تنتخب النقطة a ونقطة ما اخرى منه ولتنبيه بمقتضى ما شوهد من هذه المسئلة على مزية رمزنا فتقول انه ليس قاصرا على تبين وضع كل خط واتجاهه والمقصود منه في الفراغ تبيننا تاما على الشكل بل هو مع ذلك يبين جهة انطباق

المستويات التي ليست منطبقة على فرخ الرسم كما بين ان علامات الرمز
و ر المشابهة لاشارات خط الارض المقابل لهما تدل بمجرد النظر اليها
على كيفيات تقل مساقط الشكل الفراغي المتوالية ولواستعملنا الرموز المعلة
لما حصل ذلك الابغاية المشقة

وحينئذ يسهل ايجاد مسقط المستقيم و على مستواً جديداً على مستو
عمود على المستوى الرأسى χ ض χ ض لا نبحت عن ذلك هنا حذرنا من
تعقد الشكل

(٤٧)

(المسئلة الرابعة) اذا كان المطلوب تغيير مستوي المسقط بالنسبة
لمستوي يقال

نقترض كافي (الشكل ٥٠) المستوى معلوماً باثريه χ و χ ثم نبحت
عن اثره على مستوي المسقط الجديد ونقترض ان المطلوب ايجاد اثر
المستوى م على مستوراسى جديد قاطع للمستوى الافقى في χ ض فيث
ان الاثر الافقى χ لا يتغير تكون النقطة و التي يتقابل فيها ذلك
الاثر مع خط الارض الجديد χ ض نقطة من نقط الاثر المطلوب انظر
نمرة (٢٧)

واذا فرضنا على المستوى م مستقيماً ما تكون نقطة تقابله مع المستوى
الرأسى الجديد هي النقطة الثانية من نقط الاثر المذكور انظر (نمرة ٢٨)
وبذلك تحل هذه المسئلة

ثم ينتخب للاختصار الافقى ط لان نقطه حينئذ تكون على بعد واحد
من المستوى الافقى الذي لا يتغير في حينئذ اذا مدينا ط الى χ ض
في النقطة و واقننا من هذه النقطة عموداً على χ ض واخذنا عليه بعداً
= = يحدد لنا الاثر الجديد الرأسى للافقى ط

الكائن في المستوى م كافي (بند ١٥) فيثبت يكون الاثر المذكور
كائنا بالضرورة على R الذي هو الاثر الجديد للرأسي للمستوى م
ولننبه على انه لا حاجة لنا برسم المسقط الرأسي للمستقيم ط وكان يكفي ان
نعين النقطة R التي تقعنا استعمالها

والاحسن ان نستعمل من اقييات المستوى م الافقي A الذي يمر مسقطه
 A بنقطة تقابل X مع X' ان امكن ذلك وحيث ان النقطة A
في المستويين الرأسين تعتبر على المستوى الرأسى القاطع للمستوى الافقي في
 X' واذا اتفق ان الاثر الافقي Q لم يتقابل مع خط الارض الجديد X'
في حدود الرسم ولم يوازيه لا تعلم النقطة Q ويلزم حينئذ ايجاد نقطتين من الاثر
الرأسي R بلا واسطة باخذ اقيين للمستوى م فان خرج في هذه
الحالة الاثر الرأسى الجديد عن حدود الرسم اخذ على المستوى م مستقيمان
يمكن ايجاد مسقطيهما الرأسين الجديدين فيعين المستوى تعينا كليا
بالمستقيمين المذكورين انظر (بند ٢٧)

ثم انه يلزم لتغيير المستوى الافقي اجراء مثل ما ذكرنا ذلك باستعمال رأسي
اورأسيين للمستوى المفروض بحسب تقابل الاثر الرأسى للمستوى المذكور
مع خط الارض الجديد في حدود الرسم او عدم تقابله به مع عدم موازاته له

(المسئلة الخامسة) اذا كان مسقطا نقطة على مستويين قائمي الزوايا
معلومين والمطلوب ايجاد مسقطها على مستوي ثالث يقال
حيث ان المستوى م كافي (الشكل ٥١) ليس عمودا على المستوى الافقي
ولا على المستوى الرأسى فلا يعتبر مستويا جديدا رأسيا ولا اقييا للمسقط
لكن اذا اردنا اعتباره اقييا يجب ان نغير اولا المستوى الرأسى وتنتخب
المستوى الجديد عمودا على المستوى م فيلزم ان يكون Q عمودا

على χ ض انظر (رابعاً من بند ٣٣) ثم نبحث عن اثر المستوى م
كافي (بند ٤٧) وعن مسقط النقطة م على هذا المستوى الجديد الرأسى
كافي (بند ٤٤) ثم نعتبر المستوى م مستويًا اقياً وبذلك لا يكون خط
الارض الجديداً χ فنجده حينئذ م كافي (بند ٤٥) وهى مسقط النقطة
م على المستوى م

وإذا اعتبرت هذه النقطة م نقطة من المستوى م وأريد معرفة مسقطها
على المستويين الاصلين الميين بخط الارض χ ض رمز لهذه النقطة
بالرمز ω وحيث انها موجودة على المستوى الافقى χ ض يجب
ان يكون مسقطها الرأسى على خط الارض فى النقطة ω وإذا اعتبر
المستويان المتقاطعان فى χ ض بدل المستويين المتقاطعين فى χ ض
لا يتغير المسقط ω ويكون المسقط الجديد الافقى فى ω

على عمود على خط الارض χ ض نازل من نقطة ω وعلى بعد

$$\omega = \omega = \omega$$

ثم نعتبر المستويين المتقاطعين فى χ ض بتغيير المستوى الرأسى
فيجاد المسقط ω على عمود نازل من النقطة ω على χ ض وعلى بعد

$$\omega = \omega$$

تنبه حيث ان المستقيم م مواز χ ض يكون عموداً على χ
وحيث ان المستقيم م الفراغى عمود على المستوى م يكون
م مسقطه الافقى وكان يمكن بدل اعتبار المستوى م اقياً اعتباره

رأسياً كان يلزم على ذلك أولاً تغيير المستوى الأفقي وانتخاب آخر قاطع الرأسى فى
 حـ ض عموداً على ر فيكون بذلك ق خط الأرض الحديد حـ ض
 ولو بحثنا أيضاً عن مسقطى النقطة م معتبرة كالنقطة د من المستوى
 م لوجدنا أولاً د مع م على عمود واحد على ر فيكون حينئذ م د
 المسقط الرأسى للعمود م د للمستوى م وينتج من هذه المسئلة أن
 مسقطى عمود على مستو وعمودان على اثرى المستوى المذكور أى أن كلامنا
 المسقطين عمود على موافقه اسما من الاثرين وسنثبت هذه النظرية فيما بعد

* (٥٠) *

* (المسئلة السادسة) * اذا كان المطلوب جعل مستقيم موازياً لاحد مستويي
 المسقط يقال

يلزم لجعل المستقيم و موازياً للمستوى الرأسى كفى (الشكل ٥٢) ان
 يكون و موازياً لخط الأرض كفى (ثالثاً من بند ١٧) ويكفى
 حينئذ جعل حـ ض موازياً للمستقيم و والبحث عن المسقط و للمستقيم
 و على هذا المستوى الحديد الرأسى انظر (بند ٤٦) واذا اريد جعل
 المستقيم موازياً للمستوى الأفقى لزم تغيير المستوى الأفقى وجعل حـ ض
 موازياً للمسقط و انظر (ثانياً من بند ١٧)

* (٥١) *

* (المسئلة السابعة) * اذا كان المطلوب جعل مستقيم عموداً على احد مستويي
 المسقط يقال

اذا كان المستقيم و كفى (الشكل ٥٢) موازياً للمستوى الرأسى يكون
 كل مستو وعمود على هذا المستقيم عموداً أيضاً على المستوى الرأسى ويمكن انتخابه
 مستوياً أفقياً للمسقط مع المستوى الرأسى اما اذا كان المستقيم و موازياً
 للمستوى الأفقى فيكون كل مستو وعمود عليه عموداً على المستوى الأفقى

ويمكن ايضا ان يعتبر مستويا رأسيا جديد المسقط مع المستوى الافقى واما اذا كان المستقيم المذکور ليس موازيا للمستوي مستوي المسقط فلا يكون المستوى العمود على هذا الخط عمودا على مستويين المستويين الافقى والرأسي فلا يمكن اعتباره بالضرورة مستويا افقيا ولا رأسيا للمسقط مع واحد من المستويين الاصلين ومن ثم يلزم حل هذه المسئلة ان نبتهء بجعل المستقيم المقروض موازيا لاحد مستويي المسقط كما هو مبين في (بند ٥٠) فان اردنا مثلا جعل المستقيم و عمودا على المستوى الافقى نجعله اولاموازيا للمستوى الرأسى ثم نغير المستوى الافقى بالتنبيه على انه اذا كان المستقيم و عمودا على المستوى الافقى يكون مسقطه الرأسى عمودا على خط الارض انظر (خامسا من بند ١٧)
 حينئذ نأخذ χ ض عمودا على و فيكون المسقط الافقى حينئذ نقطة واحدة
 كائنة على امتداد و امام χ ض وعلى بعد منه $او = ر$
 وهو بعداى نقطة من المستقيم و عن المستوى الرأسى

(المسئلة الثامنة) اذا كان المطلوب جعل مستوي عمودا على احد مستويي المسقط يقال

ان هذه المسئلة قد انجحت في (بند ٤٨) فقد شاهدنا انه يلزم لجعل المستوى م المعلوم عمودا على المستوى الرأسى للمسقط تغيير المستوى الرأسى للمسقط واخذ خط الارض الجديد عمودا على ق وانه يلزم ايضا لجعل المستوى م عمودا على المستوى الافقى تغيير المستوى الافقى للمسقط واخذ خط الارض الجديد عمودا على ر

(المسئلة التاسعة) اذا كان المطلوب جعل مستوي عمودا على خط الارض يقال

انه يجب ان يكون المستوى عمودا على المستويين الافقى والرأسى معا فنغير

اولا المستوى الرأسى باخذ χ ض مثلا عمودا على η ونستنتج منه ρ
 كفاي (بند ٤٧) ثم نغير المستوى الافقى باخذ χ ض عمودا على ρ
 فيبقى المستوى دائما عمودا على المستوى الرأسى السابق ويكون مع ذلك عمودا
 على المستوى الافقى الجديد وحينئذ يكون عمودا على تقابلهما على خط
 الارض الجديد

(٥٤)

(المسئلة العاشرة) اذا كان المطلوب جعل مستو موازيا لخط الارض
 يقال

ان اثرى المستوى الموازى لخط الارض كفاي (الشكل ٥٣) يكونان موازيين
 للخط المذكور انظر (ثامنا من بند ٣٣) فاذا اردنا حينئذ حل هذه المسئلة
 بتغيير المستوى الرأسى لزم اخذ χ ض موازيا للآخر η ثم لاجل ايجاد نقطة
 من نقط ρ يمكن ان يرسم فى المستوى μ مستقيم ما ويبحث عن تقابله مع
 المستوى الرأسى الجديد وكيفية الوصول لذلك سهلة جدا وذلك ان المستويين
 الرأسين والمستوى μ متقاطعة فى النقطة α التى مسقطها الافقى α'
 بالضرورة نقطة تقابل خطى الارض χ ض و χ ض وباتسباب هذه
 النقطة للمستوى الرأسى χ ض تكون فى α على ρ واذا
 اتسبت للمستوى الرأسى χ ض تكون على عمود على χ ض وعلى بعد منه
 $\alpha' = \alpha$ فتكون النقطة α' نقطة من ρ

ولو اريد حل المسئلة بتغيير المستوى الافقى لزم ان يؤخذ خط الارض الجديد موازيا
 للآخر ρ فيوجد بكيفية مشابهة للكيفية المذكورة نقطة من نقط الاثر
 الافقى الجديد

(٥٥)

(المسئلة الحادية عشر) اذا كان المطلوب جعل مستو موازيا لاحد مستويي

المسقط يقال

ان المستوى الموازي لاحد مستويي المسقط يكون بالضرورة عمودا على الآخر
وحينئذ يلزم حل هذه المسئلة ان يتدء بجعل المستوى المقروض عمودا على احد
مستويي المسقط كما في (بند ٥٢) ثم يجعل موازيا للمستوى الآخر فاذا
اريد مثلا ان يجعل المستوى المقروض وهو م موازيا للمستوى الراسي
فالجعل اولا عمودا على المستوى الافقي ثم يغير المستوى الراسي باخذ خط
الارض الجديد موازيا للآخر ق كما في (سادسا من بند ٣٣) واما
اذا اريد جعل المستوى م موازيا للمستوى الافقي فالجعل اولا عمودا على
المستوى الراسي ثم يغير المستوى الافقي باخذ خط الارض الجديد موازيا
للآخر ر كما في (سابع من بند ٣٣) ومن المعلوم انه لا يوجد في التغيير
الثاني اثر للمستوى حتى يبحث عنه

* (٥٦) *

وقبل الشروع في حل مسئلة دوران الاشكال حول محور نشرع في ثلاث
قواعد واضحة لها وقع عظيم فنقول

* (اولا) * ان كل شكل في مستو مواز لاحد مستويي المسقط ينسقط على
هذا المستوى وينطبق على شكل مثله وبيان ذلك انك اذا انزلت من نهايتي
مستقيم اعمدة على مستوى المسقط يتكون معك شكل متوازي الاضلاع قائم
يكون مسقطه الضلع المقابل للمستقيم المنسقط فكل شكل يحدد بخطوط
مستقيمة متناهية في الصغر

* (وثانيا) * ان كل شكل كائن في مستو عمود على احد مستويي المسقط
ينسقط عليه في اثر المستوى المشتمل عليه لان الاعمدة النازلة من كل نقطة من
الشكل المذكور لا تخرج عن المستوى المذكور

* (وثالثا) * انه متى دار شكل حول محور يدور ايضا مسقطه على المستوى
العمودي على المحور المذكور حول اثر المحور ببقائه دائما كما هو واما
مسقطه على مستو آخر فيغير في اى وقت من اوقات الحركة اذا ثبت هذا امكن

تدوير شكل حول محور عمود على احد مستويي المسقط او مواز له او على
اي اتجاه كان ثم بعد تدوير الشكل الفراغي تتغير مواضع اجزائه المختلفة والحق
ان يقال انه صار شكلا آخر مساويا للاول نبحت عن مساقطه ولاجل
ذلك نسم رموز النقط والخطوط والمستويات دون اسس رموز مستويي
المسقط

(المسئلة الثانية عشر) اذا كان المطلوب تدوير نقطة حول
محور رأسي بقدر زاوية معلومة واييجاد مسقطيها في وضعها الجديد
يقال

لتفرض كما في (الشكل ٤٥) ان النقطة المفروضة هي م وان المحور الرأسي
هو ا فاذا انزلنا من النقطة م عمودا على المحور يكون اقليبا وينسقط
بالضرورة انسقاطا اقليبا في ر بمقداره الاصلى انظر (اولا من نمرة ٥٦)
واما مسقطه الرأسي ر فيكون موازيا لخط الارض خ ض انظر
(ثانيا من نمرة ١٧) فاذا دورنا الجمله بقي العمود ر دائما عمودا على المحور
ا وعلى طوله الاصلى ورسم بالضرورة دائرة تكون في مستوي عمود على ا
او افقي ومركزها على المحور ومسقطها الافقي ج دائرة مساوية لها مركزها
في ا ونصف قطرها يساوي ر ومسقطها الرأسي ج مستقيم مواز لخط
الارض خ ض وحيث ان النقطة م لا تخرج عن المحيط المذكور يكون
مسقطها على ج و ج فاذا فرضنا ان النقطة م تدور حول ا بمقدار
الزاوية ا على اتجاه السهم ف صار نصف القطر ر في وضع ر فيحدث
ر مع ر الزاوية ا وحيث انه لا بد وان يتكون من المسقطين الافقيين عين
الزاوية المذكورة يكفي ان يمد ر بحيث يحدث مع ر الزاوية ا فتكون
نقطة تقابل المستقيم المذكور مع ج المسقط الافقي م للنقطة م بعد

الدوران واما مسقطها الرأسى فحيث انه يجب ان يكون على المسقط الرأسى
للدائرة ج يكون فى نقطة م ولو حصل الدوران فى جهة عكس المذكورة
كما يظهر ذلك من السهم ف صار نصف القطر ر فى ر والنقطة
م فى م

(٥٨)

(المسئلة الثالثة عشر) اذا كان المطلوب تدوير نقطة بقدر زاوية معلومة
حول محور عمود على المستوى الرأسى يقال
ان هذه المسئلة كفاى (الشكل ٥٥) لا تخالف ما قبلها فى شئ سوى ان
الدائرة المرسومة هنا بالنقطة م كأنه فى مستو مواز للمستوى الرأسى بحيث
ان الزاوية المفروضة لا بد وان تكون حادثة من المسقطين الرأسين ر و ر
الذين هما مسقطان فى قطرى الدائرة المذكورة المارة بالنقطتين م و م

(٥٩)

(المسئلة الرابعة عشر) اذا كان المطلوب دوران مستقيم بقدر زاوية معلومة
حول محور رأسى او عمود على المستوى الرأسى يقال
ان المستقيم المذكور يمكن ان يشغل ثلاثة اوضاع مختلفة بالنسبة
للمحور ولنذكر ذلك فنقول
(اولا) قد يكون المستقيم موازيا للمحور فيرسم سطح اسطوانيا اذا قاعدة
مستديرة كما هو معلوم فى الهندسة الاصلية
(وثانيا) قد يقطع فى نقطة فيرسم حينئذ سطح مخروطيا اذا قاعدة
مستديرة كما هو معلوم ايضا من الهندسة الاصلية
(وثالثا) قد لا يكون كأنه فى مستو واحد فيرسم سطح انسي بسطح
القطع الزائد الدائرى الطية وسنبينه ولنشرح هذه الاحوال الثلاثة فنقول
(الاولى) ان يفرض ان المحور الرأسى هو ا كفاى (الشكل ٥٦) وان
المستقيم الموازى له هو و الذى هو بالضرورة رأسى فتكون جميع نقط

المستقيم و الدائرة حول ا باقية على البعد الكائن بينهما وبين المحور
المذكور فينتد يكون و ا متوازيين دائماً ويرسم حينئذ الاثر الافقى
للمستقيم و الزاوية ا وبذلك يصير المستقيم و في و

* (الحالة الثانية) * ان يفرض ان المحور الرأسى ا كفاى (الشكل ٥٧)
وان المستقيم القاطع له فى نقطة م هو و فى دور المستقيم و بقدر
الزاوية ا حول المحور ا فلا بد وان يستمر ماراً من النقطة م ويكفى حينئذ
لمعرفة الوضع الجديد لهذا المستقيم معرفة تامة ان يعين الموضع الذى شغلته نقطة
من نقطه فتأول المسئلة حينئذ الى تدوير احدى نقط المستقيم و حول المحور
ا والاحسن ان ينتخب من نقط هذا المستقيم اثره الافقى ا ان كان موجوداً
فى حدود الرسم لان الدائرة ج التى يرسمها تكون فى المستوى الافقى
ومسقطها الرأسى بالضرورة على خط الارض كما ان مسقط النقطة ا يكون
كذلك فاذا وصلنا هذه النقطة بالنقطة م حدث المستقيم و ومن حيث
ان الاثر الرأسى ر يخرج مدة الحركة من المستوى الرأسى لا يكون
وضع الاثر الرأسى الجديد ج الوضع الحادث للنقطة ر ولذا رمزنا له
برمز آخر

* (الحالة الثالثة) * ان يفرض ان المحور الرأسى هو ا كفاى (الشكل ٥٨)
وان المستقيم الذى ليس معه فى مستو واحد هو و فلا جل معرفة وضع
المستقيم المذكور بعد دورانه حول المحور ا بقدر زاوية معلومة ا يكنى
بالضرورة تعيين الوضعين الجديدين لنقطتين من نقط المستقيم المذكور كما هو معلوم
ولنفرضهما عليه م و ه فيرسمان مدة الدوران قوسى دائرتين
ج و ج فى مستويين عمودين على المحور وموازيين بالضرورة للمستوى
الافقى فتصير حينئذ النقطة م فى م و ه فى ه ولعدم رسم الزاوية
ا بعد دوران النقطة م كما علم ذلك من (بند ٥٧) يمد نصف
القطر المار من ه الى ر ويؤخذ قوس رسم م م ويرسم

المستقيم من α فيقطع هذا المستقيم الدائرة β في النقطة γ ومن ذلك
ينتج δ

وتختصر العمليات باخذ نقطتين مسقطاهما الاقيان على بعد واحد من α
لان الدوائر التي ترسمها هاتان النقطتان متحدة المسقط الافقي فلو اخذنا مثلاً
النقطتين α و β لاجرى على احدهما وهي β ما اجرى عليها قبل
في (نمرة ٥٧) ولايجاد النقطة α نأخذ على الدائرة β او γ

البعد $\alpha\beta = \beta\gamma$

ثم انه يمكن انتخاب النقطتين بكيفية خاصة بواسطة نحل المسئلة وهي ان ينزل
من α عمود β على γ يقطعه في النقطة δ التي هي المسقط الافقي
لنقطة ϵ من نقط المستقيم β ثم نفرض ان جملة المستقيم β والمسقط

الافقي γ والرأسي β تدور حول المحور بقدر الزاوية α فيصير الرأسى
في β صانعا مع β الزاوية α ويبقى المستقيم β مدة الدوران عمودا
على β ومسقطا افقيا للمستقيم β في جميع اوضاعه كما في (الثامن
بند ٥٦) فينشأ اذا مدينا γ عمودا على β او مماسا للدائرة

β يحدث معنا المسقط الافقي للمستقيم β بعد الدوران ونقطة اخرى

δ من المسقط الرأسى فاذا علم اتجاه هذا المسقط او نقطة ثانية منه امكن رسمه

ويمكن ايجاد النقطة α بجعل النقطة α في α على γ برسم قوس

دائرة من α معتبرة مركزا ومن المعلوم انه يمكن انتخاب اى نقطة
غير النقطة α

ويمكن حل المسئلة التي الغرض منها دوران مستقيم حول محور عمود على

المستوى الرأسى بهذا الكيفية نعم ينبغي ان نجري على المستوى الرأسى العمليات
التي اجريت على المستوى الافقى وبالعكس

(٦٠)*

(المسئلة الخامسة عشر)* اذا كان المطلوب دوران مستوي بقدر زاوية
معلومة حول محور رأسى يقال

ان الوضع الجديد للمستوى المقروض يعلم اذا علم وضع المستقيمين الكائنين على
المستوى المذكور والاحسن ان ينتخب من المستقيمان مستقيمان افقيان
ويؤخذ الاثر الافقى للمستوى بدل احدهما لكونه لا يخرج مدة الحركة عن

المستوى الافقى فاذا انزلنا من النقطة ^ق ا كافي (الشكل ٥٩) عمودا ن

على ق^ا فانه يقابل الاثر المذكور في النقطة ع التي ترسم مدة الدوران
دائرة ج يكون الاثر الافقى مماسا لها دائما وحيث ان المستقيم المذكور
يصير في الوضع ن الصانع مع ن الزاوية المفروضة ا تكون
النقطة ع في ع واذا اخذنا للدائرة ج مماسا في النقطة ع كان

هو الاثر الافقى ق^م للمستوى م بعد الدوران وانتسبت النقطة ب^ب التي
يقابل فيها الاثر المذكور خط الارض للاثر الرأسى الجديد للمستوى المذكور
ثم نستعمل لاييجاد نقطة ثانية منه افقيا ط من المستوى م فيبقى مدة
الدوران على بعد واحد من المستوى الافقى فيكون بالضرورة مسقطه الرأسى
على خط واحد مواز لخط الارض خ ض دائما واما مسقطه الافقى فيبقى
موازيا للاثر الافقى للمستوى فحينئذ ط يقطع المستقيم ن في النقطة ك^ق

المتقلة في ك^ق على ن فاذا امررنا من هذه النقطة المستقيم ط موازيا

للاثر ق^ا يكون هو المسقط الافقى للخط الافقى ط بعد الدوران
كافي (ثالثا من بند ٥٦) وتكون النقطة س التي يقطع فيها

ط المستوى الرأسى النقطة الثانية المطلوبة من الاثر ر^ا فاذا وصلنا

بين α و β نجد الاثر المذكور

وكان يمكن بدل انزال العمود β على α ان نبحث عن الوضعين الجديدين
لنقطتين حيث ما اتفق لكن يكون في العمليات تطويل ولو انتخبت النقطتان
المذكورتان على بعد واحد من النقطة α فقد اخذنا اقليان α و β وكان
يمكن اختصار الشكل لو فرضنا الافق المار بالنقطة التي يقابل فيها المحور
المستوى α فيكون مسقطه الافق مارا بالنقطة α

فلو لم يقابل الاثر الافق α خط الارض في حدود الرسم لما حدثت النقطة
 β من الاثر الرأسي فتجبر على استعمال مستقيم آخر يستحسن انتخابه اقليان
ونبحث عن اثره الرأسي بعد الدوران فيحدث لنا نقطة من α اذا وصلت بنقطة
 β يحدث لنا الاثر المطلوب
ويمكن ان نحل المسئلة ايضا باخذ محور عمود على المستوى الرأسي ولا تستعمل
في هذه الحالة الازاسيات المستوية

* (٦١) *

* (المسئلة السادسة عشر) * اذا كان المطلوب جعل مستقيم في وضع مواز
لاحد مستويي المسقط يقال

انه يمكن كما في (الشكل ٦٠) بدل دوران المستقيم بقدر زاوية معلومة ان
يطلب تدويره حتى يصير في وضع معين بالنسبة لمستويي المسقط فاذا اريد مثلا
دوران المستقيم α حول المحور الرأسي α حتى يصير موازيا للمستوى
الرأسي يكون في هذا الوضع مسقطه الافق موازيا لخط الارض انظر (الثامن
بند ١٧) ويكفي حينئذ معرفة احدى نقطه ويسهل معرفة انه
يجب ان يستعمل هنا الحال الاخير المقرر في (الثامن بند ٥٩) فنزل
من النقطة α عمودا على α يقابله في النقطة β التي هي المسقط الافق
لنقطة α من المستقيم α فاذا تصورنا الآن الجملة المتحصلة من

المستقيم ω ومن مسقطه الافقى ω ومن الرأسى النازل من النقطة ϵ
ومن المستقيم η ودورها حول المحور α لبقية المستقيمتين α و β على
وضع متناسب فيكون ω اما عمودا على η او مماسا للدائرة المرسومة من
 α معتبرة مركزا بالنصف قطر η وموازيا في هذه الحالة الثانية لخط الارض
خ ζ وتصير النقطة ϵ في ϵ على ارتفاع واحد فوق المستوى الافقى
وكذلك تصير النقطة α في α وبذلك يصير ω المسقط الرأسى للمستقيم
في حالة وضعه الجديد

وحيث ان نقط المستقيم ترسم اقواس دوائر افقية يتضح انه ينتج من الشكل
الزاوية α المرسومة بالنصف قطر η والتي تدور بقدرها اجزاء الشكل
الباقية اذا وجدت خطوط اخرى تابعة لحركة المستقيم ω

* (٦٢) *

واذا لم يعلم المحور α من قبل ينتخب مارا بنقطة من المستقيم ω لما في ذلك من
اختصار الشكل وانبيه على اننا مجبورون في جعل المستقيم ω موازيا
للمستوى الرأسى على انتخاب المحور رأسيا ومن المعلوم ان المسئلة تنحل في هذه
الحالة كما ذكرنا لو كان المحور عمودا على المستوى الرأسى لرسمت جميع نقط
المستقيم ω دوائر موازية للمستوى الرأسى وكان لها بالضرورة بعد واحد
عن المستوى المذكور فلا تكون جميع نقط ω بعد الدوران على بعد واحد
عن المستوى الرأسى ولا يكون المستقيم المذكور موازيا لهذا المستوى بالضرورة
ولا يمكن بما ذكر جعل المستقيم ω في وضع مواز للمستوى الافقى الا بحركة
دوران حول محور عمود على المستوى الرأسى

* (٦٣) *

* (المسئلة السابعة عشر) * اذا كان المطلوب جعل مستقيم في وضع عمود على
احد مستويي المسقط يقال

متى كان مستقيم ω عمودا على احد مستويي المسقط كما في (الشكل ٦١) يكون

بالضرورة موازيا للاخرو حينئذ يلزم لجعل مستقيم موازيا للمستوى الرأسى ان يدور ذلك المستقيم حول محور رأسى كفاى (بند ٦٢) لكن جميع نقط المستقيم مدة هذه الحركة تبقى على بعد واحد من المحور فلا يمكن ان يوازيه بالضرورة اصلا وذلك لان كل مستقيم دائر حول محور عمود على المستوى الرأسى لا يمكن ان يكون موازيا له ان لم يكن كذلك قبل الدوران فيستحيل حينئذ جعل مستقيم رأسيا لدورانه بحركة بسيطة جدا حول محور واحد لكن باول حركة حول محور رأسى ا يجعل المستقيم و في وضع كوضع و موازيا للمستوى الرأسى كفاى (بند ٦١) ثم يجعل هذا المستقيم ثانيا حركة دوران حول المحور ب العمود على المستوى الرأسى في وضع رأسى كوضع و لان المسقط و يشغل مدة الدوران الثانى جميع الاوضاع المماسية للدائرة

ج فلا بد ان يبقى في وقت من اوقات الحركة برهة صغيرة عمودا على خ ض فيكون المستقيم و حينئذ رأسيا كفاى (خامسا من بند ١٧) ولاجل جعل المستقيم المفروض في وضع عمود على المستوى الرأسى يلزم ان يجعل اول موازيا للمستوى الافقى بتدويره حول محور عمود على المستوى الرأسى وان يجعل في الوضع المطلوب بحركة دوران اخرى حول محور رأسى

تنبيه يمكن ان يتحصل من العملية زاويتان ا و - حادثتان من دوران المستقيم و حول المحورين فلو وجدت خطوط اخرى او نقط كذلك تابعة للمستقيم في هذه الحركات للزم دورانها بمقادير زوايا متساوية

(٦٤)

*(المسئلة الثامنة عشر) اذا كان المطلوب جعل مستوي في وضع عمود على احد مستويي المسقط يقال

لنفرض كفاى (الشكل ٦٢) ان المستوى هو م وان المحور الرأسى هو ا وان المطلوب دوران المستوى م حول المحور ا حتى يصير عمودا على

المستوى الرأسى فيكون اثره الافقى في وضعه الجديد عمودا على $خ ض$ ولو
 انزلنا من النقطة $أ$ عمودا كالعمود $ن$ على $ق$ وقابله في النقطة $ر$
 رسمت هذه النقطة دائرة $ك$ دائرة $ج$ يمسا دائمتا الاثر الافقى
 للمستوى ويصير العمود $ن$ موازيا $خ ض$ اما في $ن$ واما في $ن$
 بحسب كون الدوران من اليمين الى اليسار او بالعكس ثم اذا رسمنا
 مماسا للدائرة $ج$ عمودا على $خ ض$ نجد $ق$ او $ق$ ولايجاد الاثر
 الرأسى ننبه على ان المحور $أ$ يقطع المستوى $م$ في نقطة غير متغيرة مدة
 الدوران ومسقطها الرأسى على الاثر الرأسى الجديد للمستوى $ك$ كما في
 (ثانيا من بند ٥٦) فاذا رسمنا افقيا كلافقى $ط$ للمستوى $م$
 مقابلا للمحور في النقطة $م$ تكون النقطة $م$ احدى نقط الاثر الرأسى
 المطلوب ونقطة $ع$ او $ع$ التى يقابل فيها الاثر الافقى خط الارض $خ ض$
 نقطة ثانية له وبذلك يتعين الاثر $ر$ او $ر$
 ولواريد جعل المستوى عمودا على المستوى الافقى للزم تدويره حول محور عمود
 على المستوى الرأسى

(المسئلة التاسعة عشر) اذا كان المطلوب جعل مستوي وضع عمود
 على خط الارض يقال
 ان المستوى في وضعه الجديد عمودا على مستوي المسقط معا كما في (الشكل ٦٣)
 وحيث شوهده انه لم يمكن جعله عمودا على المستوى الافقى بمحركة دوران
 حول المحور الرأسى كما تقدم لنا ذلك في (بند ٦٤) لا يمكن حل مسئلتنا
 هذه الا بتدويرين احدهما حول المحور الرأسى $أ$ لجعل المستوى $م$
 في وضع كالوضع $م$ عمودا على المستوى الرأسى للمسقط فقط والاخر حول
 محور كالمحور $ب$ عمودا على المستوى الرأسى للمسقط لجعل المستوى

م في الوضع م اي الوضع العمودي على المستوى الافقي وحيث ان وضع
المستوى م بالنسبة للمستوى الرأسى للمسقط لا يتغير في التدوير الثاني
كفاي (ثامن بند ٥٦) يكون المستوى م عمودا على مستوي
المسقط معا فيكون عمودا بالضرورة على خط الارض ويختصر الشكل
بامرار المحورين بالنقطة م التي هي احدى نقط المستوى المعلوم م

(٦٦)

(المسئلة العشرون) اذا كان المطلوب جعل مستوي وضع مواز لخط
الارض يقال

يمكن كفاي (الشكل ٦٤) حل المسئلة بتدوير المستوى م حول المحور
الرأسى ا حتى يصير اثره الافقي موازيا لخط خ ض انظر (ثامنا من بند ٣٣)
ثم لايجاد الاثر الرأسى الذي يجب ان يكون موازيا ايضا لخط ض لا يصح
ان يستعمل افقي من افقيات المستوى كما هو معلوم لان المستقيم يصير بعد
الدوران موازيا لخط ض ولا يقابل بالضرورة المستوى الرأسى لكن يبحث
عن النقطة م التي هي تقابل المحور ا بالمستوى م وهذه النقطة ثابتة فاذا
امررنا منها في المستوى م المستقيم و الذي لم يرسم في الشكل غير مسقطه
الافقي و فلا بد وان يستمر مارا بالنقطة م نفسها فيصير اثره الافقي ا
في النقطة ا كما يصير المستقيم و في الوضع و الذي فيه اثره الرأسى هو
النقطة ب فحينئذ اذا امررنا من هذه النقطة موازيا للخط خ ض كان هو
الاثر المطلوب ر

ومن المعلوم انه يصح ان يستعمل بدل الاثر ا نقطة اخرى من المستقيم و

(٦٧)

(المسئلة الحادية والعشرون) اذا كان المطلوب جعل مستوي وضع
موازا لاحد مستويي المسقط يقال

ان المستوى الموازي للمستوى الرأسى يكون ايضا عمودا على المستوى
الافقي واثره الافقي موازيا لخط الارض فيلزم اولا جعل المستوى المفروض م

عمود على المستوى الافقى بحركة دوران حول محور عمود على المستوى
الرأسي كما في (بند ٦٤) ثم يجعل بحركة دوران ثانية حول محور رأسي
موازي للمستوى الرأسي

ولجعل مستوي وضع مواز للمستوى الافقى يجعل اولا عمود على المستوى
الرأسي بحركة دوران حول محور رأسي ثم يجعل بحركة دوران اخرى حول محور
عمود على المستوى الرأسي موازيا للمستوى الافقى

(٦٨)

ويمكن بحركات دوران كالحركات السابقة جعل اي مستوي وضع به يكون
اثره الافقى مثلا موازيا للمستقيم معلوم في المستوى الافقى كما يصح تعيين
حد الحركة اللازم اجراؤها على المستوى المذكور

(٦٩)

ويمكن حل جميع المسائل الهندسية الوصفية بواسطة تغيرات مستوي المسقط
وبحركات دوران حول محور عمود على احد مستويي المسقط وهذا في الحقيقة يرجع
للتغيرات وذلك لان تغير المستوى الرأسي للمسقط مثلا يرجع بالضرورة لدوران
المستوى الرأسي القديم حول محور رأسي حتى يصير في الوضع الجديد المطلوب
وضعه فيه غاية ما فيه ان الفرق بين هاتين الطريقتين الاصليتين ان الذي يدور في
الاولى حول محور عمود على المستوى الاخر ليصير في وضع لائق بالنسبة للشكل
المراد اسقاطه هو احد مستويي المسقط وان الذي يدور في الثانية حول محور
كالاول ليصير في وضع لائق بالنسبة لمستويي المسقط هو الشكل نفسه ومن هنا
ينتج ان المسائل تنحل غالباً بتغيرات مستويي المسقط او بحركات دوران او بهما
معاً ومع ذلك فيشاهد ان استعمال احدهما دون الاخرى اختصارا وسهولة
في بعض الاحيان ومنذ كرمسائل لا يمكن حلها الا باحدى هذه الطرق

ويشاهد مما سبق ان الاختصار في جعل مستوي وضع مواز لخط الارض
تغيير المستوى لا حركة الدورات لانها تستلزم استعمال مستقيم
لا حاجة له في الاولى لكن يختار استعمال حركة الدوران عن استعمال تغيير

نعينها كليا وكذلك النقطة م

* (٧٢) *

ثم ان الجزء الاول من المسئلة مبني على جعل المحور A عمودا على احد مستويي المستط ومن المعلوم انه كان يمكن الوصول لذلك بحركة دوران حول محور رأسي كافي (بند ٦٣) لكن ما تبعناه من العمليات سهل جدا كما لا يخفى ذلك لتوصيلها للمطلوب بلا واسطة

اذا اريد تدوير النقطة او المستقيم حول محور مواز للمستوى الرأسي يتنبه الى ان الدوائر الحادثة من دوران كل نقطة اعمدة على هذا المحور فتكون بالضرورة اعمدة على المستوى الرأسي وبهذا يتوصل اولا الى جعل هذا المحور رأسيا بأخذ مستواً افقي جديد يكون عمودا عليه لان هذه الدوائر تنسقط كلها على هذا المستوى الجديد وآنر مثلها

* (٧٣) *

* (المسئلة الثالثة والعشرون) * اذا كان المطلوب تدوير مستوٍ بقدر زاوية معلومة حول محور مواز لا احد مستويي المستط يقال

ليفرض كافي (الشكل ٦٦) ان المحور A مواز للمستوى الرأسي ومائل بالنسبة للمستوى الافقي ثم يبحث عن ايجاد اثرى المستوى M بعد دورانه حول المحور A بمقدار زاوية معلومة فجميع نقط المستوى M ترسم مدة الحركة اقواس دوائر كائنة في مستويات اعمدة على المحور وتنسقط كلها بدوائر مثلها اذا كان المستوى الافقي عمودا على A ولذا نغير اولا المستوى الافقي ونجعله عمودا على A ولا بد ان يكون حينئذ خط الارض XZ عمودا على A وان يكون المسقط الافقي للمحور A نفس النقطة A متباعدة عن XZ بمقدار مساو لبعده A عن XZ ولايجاد Q نمد R حتى يتلاقى مع XZ في النقطة Q ثم نعين نقطة ثانية كالنقطة S بواسطة الرأسي P للمستوى M فاذا انزلنا من A عمودا AE

على ق^١ ورسمنا قوس دائرة مركزها أ^١ ونصف قطرها هو أ^١ ع^١
ورسمنا أ^١ ع^١ بحيث يصنع مع أ^١ ع^١ الزاوية المقروضة | ثم رسمنا من ع^١ مماسا
لقوس الدائرة المرسومة نجد الاثر الافقي ق^١ للمستوى في وضعه الجديد ومن
ذلك يستخرج الاثر الرأسى ر^١ بواسطة افقى ب^١ للمستوى فعلم منه
النقطة ج^١ فيتحصل معنا الاثر الافقى ق^١ للمستوى م^١ على المستوى
القديم بم د^١ ر^١ الى خ^١ ض^١ ان امكن ذلك ثم نعين نقطة اخرى كالنقطة د^١
بواسطة الرأسى ه^١ للمستوى م^١
ولدوران المستوى حول محور مواز للمستوى الافقى يلزم اولا ان يؤخذ مستو
جديد رأسى عمودا على هذا المحور ويمكن بدل التحديد بالزاوية ان يجعل المستقيم
او المستوى في وضع معين

(٧٤)

(المسئلة الرابعة والعشرون) اذا كان المطلوب تدوير نقطة او مستقيم
بمقدار زاوية معلومة حول محور ما يقال

ليكن المحور أ^١ كفى (الشكل ٦٧) معلوما بمسقطيه أ^١ و^١ والنقطة
م^١ معلومة بمسقطيها ايضا م^١ و^١ والمستقيم و^١ معلوما ايضا بمسقطيه
و^١ و^١ فيلزم ايجاد مسقطي المستقيم اللذين هما و^١ و^١ للمستقيم و^١
والمسقطين م^١ و^١ للنقطة م^١ بعد تدوير و^١ و^١ بمقدار الزاوية | حول
المحور أ^١ ففى مدة الدوران ترسم النقطة م^١ وجميع نقط المستقيم و^١
اقواس دائرة كائنة فى مستويات اعمدة على المحور أ^١ تنسقط بدوائر
متساوية اذا كان المحور أ^١ عمودا على احد مستويي المسقط فيلزم حينئذ
جعله فى هذا الوضع بانتخاب مستو جديد للمسقط عمودا على أ^١ لكن لا يصير
المستوى المذكور عمودا على مستويين المستويين المنسوب اليهما الشكل

الآن فيضطر الى تغيير المستوى مرتين بان نأخذ
 * (اولا) * مستويا رأسيا جديدا موازيا للمحور α ولأجل السهولة
 والاختصار في ذلك ينتخب المستوى المسقط افقيا لهذا المحور وبذلك يكون خط
 الارض الجديد هو المسقط α وحيث ان المساقط الافقية α و α' و α''
 لا تتغير تكون المساقط الرأسية الجديدة α' و α'' على المستوى الرأسى الجديد
 انظر (بندى ٤٤ و ٤٦) وبذلك يؤل الحال الى تدوير النقطة α والمستقيم
 و حول المحور α الموازى لاحد مستويي المسقط اى الى المسئلة المتقدم
 حلها في (بند ٧١) ثم يغير الآن المستوى الافقى بان يجعل α' عمودا
 على المحور α فيكون مسقط المحور الافقى نفس النقطة α وحيث ان
 المسقطين الرأسين α' و α'' لا يتغيران يكون المسقطان الافقيان
 عيني α' و α'' ثم لتدوير α' والمستقيم و حول المحور α الذى
 هو الآن عمود على المستوى الافقى يلزم ان يوصل بين α' و α'' ويجعل هذا
 المستقيم نصف قطر ترسم به دائرة تقطع α' في نقطة ثانية α'' ثم تصنع الزاوية
 α' بواسطة المستقيم α' فيتحصل نقطة α'' ويجعل α' α''
 α' يتحصل معنا نقطة ثانية من α' ويكون المسقطين α' و α''
 يوجدان على خطين موازيين لخط الارض α' و α'' ومارين بالمسقطين
 α' و α'' يتحصل معنا α' فيلزم الآن تغيير المستوى الافقى وانتخاب
 α' خطا ارضيا بشرط ان يؤخذ α' خلف هذا الخط و α''
 امامه كوضعي α' و α'' بالنسبة الى α' انظر (بند ٤٣)
 ومن هذا ينتج α' ومنه ينتج α'' انظر (بند ٤٦)

(المسئلة الخامسة والعشرون) اذا كان المطلوب تدوير مستوي بقدر زاوية معلومة حول محور ما يقال

ليفرض كما في (الشكل ٦٨) ان المحور A معلوم بمسقطيه A^u و A^v وان المستوى M معلوم ايضا باثريه Q^u و Q^v والمطلوب تدوير المستوى M بقدر زاوية معلومة α حول المحور A ففي مدة الدوران ترسم جميع نقط المستوى M اقواس دائرة في مستويات اعمدة على A وبذلك لا تكون موازية لاحد مستويي المسقط ولا اعمدة عليه فقد آل الامر اولا الى تغيير المستوى الرأسي كما في المسئلة المتقدمة فحينئذ يؤخذ المستوى الجديد موازيا للمعور او مارا بالمحور نفسه وهو اخصر فينطبق خط الارض X^u على A^u ثم لايجاد وضع المحور على هذا المستوى يبحث عن وضعي نقطتين من نقطه A و M فيتحصل المحور A وحيث ان الاثر Q^u لا يتغير يعين الاثر الرأسي Q^v باق B من المستوى M يغير المستوى الافقي بانتخابه عمودا على المحور فيكون خط الارض X^u عمودا على A والمسقط الافقي للمعور هو عين A^u فلا يتغير الاثر الرأسي Q^v ويتحصل الاثر الافقي Q^u بواسطة الرأس P للمستوى M يلزم تدوير المستوى M المعلوم باثريه Q^u و Q^v حول المحور A الذي هو الان عمودا على المستوى الافقي للمسقط بان تنزل A^u عمودا على Q^u ونرسم الزاوية α ثم نرسم قوس دائرة يجعل A^u مركزا فيتحصل معنا النقطة E^u وباخذ Q^u مماسا في هذه النقطة للدائرة J يحدث الاثر الافقي للمستوى في وضعه الجديد ويقابل الاثر الرأسي Q^v المحور في نقطة H ثابتة مدة الدوران ومناسبة بالضرورة الى الاثر

الرأسي R أيضا ثم نغير R الى المستوى الافقي بان نأخذ X خطا ارضيا
فيتعين الاثر الافقي Q بواسطة الرأس R ثم نغير ايضا المستوى الرأسى بان
نأخذ X خطا ارضيا فنجد الاثر الرأسى R بواسطة افقى S
* (٧٦) *

اذا علم شكل مستوي في الفراغ كان من المهم معرفة هيئته الحقيقية فيلزم لذلك جعل
المستوى المحتوى على ذلك الشكل في وضع مواز لاحد مستويي المسقط انظر
(اولا من بند ٥٦) ويتوصل الى ذلك بعمليتين مختلفتين هما
* (اولا) * ان يؤخذ مستوي جديد للمسقط مواز لمستوى الشكل المذكور
او يعتبر اختصارا هذا المستوى عينه مستويا جديدا للمسقط L كن اذا لم
يكن هذا المستوى عمودا على احد المستويين الاصليين يجب البدؤ بجعله في
هذا الوضع الخاص

* (وثانيا) * ان يدور مستوى الشكل المذكور حول محور وينتخب محورا
في العادة احد اثريه وتسمى العملية حينئذ عملية الانطباق وحيث ان هذه الحركة
حاصلة حول محور مواز لاحد مستويي المسقط احتيج في ذلك الى عمليتين
انظر (بند ٧٣) فيتحصل من ذلك انه اذا اريد ايجاد هيئة الشكل الحقيقية
لاى شكل كائن في مستو ما وجب اجراء عمليتين الغرض من اولاهما جعل
مستوى الشكل L عمودا على احد مستويي المسقط ومن الثانية جعله
منطبقا على المستوى الاخر للمسقط او جعله اقل ما هنالك موازيا له وكتاهاتين
العمليتين يمكن اجراؤها اما بتغيير مستوي او بحركة دوران ومن ذلك يتحصل اربع
طرق لحل هذه المسئلة هي

- (اولا) ان نتحل بتغيير المستوى بين
- (وثانيا) بتغيير المستوى ثم حركة دوران
- (وثالثا) بحركة دوران ثم بتغيير المستوى
- (ورابعا) بحركتي دوران

ومن المعلوم ان هذه الطرق قد انحلت حلا كافيا فيما سلف ولنشرع الآن في بيان
تطبيقها على حل المسائل الاربعة الآتية التي توصلنا الى مسئلة العكس وهي
ان يكون المعلوم وضع نقطة على المستوى المنطبق او المعتبر مستويا للمسقط
والمطلوب معرفة مسقطها على مستويين معلومين عموديين على بعضهما

(٧٧)

(المسئلة السادسة والعشرون) اذا اريد رسم مثلث متساوي الاضلاع
على مستقيم معلوم يقال

ليفرض كافي (الشكل ٦٩) ان المستوى المراد اجراء العملية المطلوبة عليه
م ومن المعلوم ان المستقيم ا - لا يكون معلوما الا بمسقطه الافقي

ا - وبشرط وجوده في المستوى م حيث يتعين به مسقطه الرأسى

أ ب انظر (بند ٢٨) والاحسن ان يقال من حيث ان المستقيم

محدود بالنقطتين ا و - يبحث عن مسقطى هاتين النقطتين الرأسين

كافي (بند ٢٩) بان يستعمل لذلك اقليان من المستوى م اذا تقرر

ذلك فلا يمكن اجراء العملية المطلوبة الا بعد جعل المستوى م منطبقا على

احد مستويي المسقط ونستعمل في ذلك الطريقة الاولى انظر (بند ٧٦)

اعنى تغييرى المستويين وذلك بان يجعل المستوى م افقيا للمسقط فيلزم

ان ينتخب اول مستور رأسى جديد عمودا على المستوى م فيكون خط الارض

خ ض بالضرورة عمودا على ق انظر (رابعامن بند ٣٣) ولاجل

ايجاد ر يستعمل اقليان قد رسما لايجاد ا و - ثم يجعل المستوى

م مستويا افقيا للمسقط فيصير تقاطعه بالمستوى الرأسى اى ر خط

الارض الجديد خ ض ويكون المسقطان الاقليان للنقطتين ا و -

هما عينهما وايجادهما يكون بالطرق المعلومه فى (بند ٤٥)

وبعد ايجاد المستقيم ا - يرسم المثلث المتساوى الاضلاع المطلوب ولعرفة

مسقطي هذا المثلث على مستويي المسقط الاصلين ينبغي ان يتنبه الى انه لم يبق
علينا بعد معرفة مساقط رأسي المثلث α و β - الامعرفة مسقطي الرأس
ج ويتوصل اليهما بتغيير المستويين على عكس ما سبق اعني ان ينتقل
من المستويين المتقاطعين في χ الى المتقاطعين في χ' بتغيير
المستوى الافقي للمسقط ثم ينتقل من هذا الى الاصلين المتقاطعين في χ بتغيير
بتغيير مستوى المسقط الرأسي

فلو اعتبرنا المستوى م مستويا رأسيالكان الابق تعيين α و β
برأسين من المستوى م يقعان فيما بعد لايجاد الاثر χ على مستوى
المسقط الجديد الافقي العمود على المستوى م الذي كان يلزم اعتباره قبل
اعتبار المستوى م مستويا رأسياللمسقط

* (٧٨) *

* (المسئلة السابعة والعشرون) * اذا اريد ان يرسم على قاعدة معلومة الطول
 α - مناظرة للضلع α - مثلث α - ج مكافئ لمثلث معلوم
 α - ج ورأسه في ج على مستقيم معلوم الوضع يفرض
ان المستوى α - ج كافى (الشكل ٧٠) المراد اجراء جميع العمليات عليه
م ومن حيث ان كلا من المستقيمين α - و β الكائنين على المستوى
م لا يعلم الا بمسقط واحد يستخرج المسقط الاخر بمقتضى (بند ٢٨)
وحيث انه لا يمكن اجراء عمليات المسئلة الابدع جعل المستوى م منطبقا
على احد مستويي المسقط يفرض ان المطلوب انطباقه على المستوى الافقي
وتستعمل في ذلك الطريقة الثانية المقررة في (بند ٧٦) وهي تغيير مستوي
ثم حركة دوران

ويلزم لاجل انطباق المستوى م على المستوى الافقي تدويره حول χ
معتبر المحور لكن من حيث ان هذا المحور افقي يجب ان يجعل اولا عمودا على

المستوى الرأسى انظر (بند ٧٣) بان يغير المستوى الرأسى للمسقط فيؤخذ
 خَضَ عمودا على ق و يبحث عن ر الذى لابد وان يحتوى على
 أ و س و و معا كفى (ثانيا من بند ٥٦) وبعد انطباق المستوى
 م على المستوى الافقى ينسب على ان النقطة ا مثلا ترسم قوس دائرة ج
 موازية لمستوى المسقط الرأسى القاطع لمستوى المسقط الافقى في خَضَ ومن
 حيث ان هذه النقطة لابد وان تصير على المستوى الافقى يكون مسقطها الرأسى
 حيثئذ على خط الارض في ا فتكون النقطة نفسها بالضرورة في ا
 وتحصل ايضا النقطة الاخرى س والمستقيم و ثم يرسم المثلث المطلوب
 ا س ج على المستوى م المنطبق ثم لا جمل معرفة مسقطى
 هذا المثلث على مستويي المسقط الاصلين تنسب على انه حيث ان الرأسين
 ا و س معلومان وان الرأس الثالث موجود على المستقيم و لم يبق
 علينا الا ان نزل من الرأس ج عمودا على ق فيقطع ذلك العمود المسقط
 ق في النقطة ج ومنه ينتج ج وبايصال مسقطى هذه النقطة ج
 بمساقط النقطتين ا و س يحصل مسقطا المثلث المطلوب ا س ج
 ولواريد انطباق المستوى م على المستوى الرأسى لكان يلزم اولا تغيير المستوى
 الافقى يجعل خط الارض الجديد عمودا على ر ثم تدوير المستوى م
 حول هذا الاثر الرأسى وكانت العمليات مشابهة للمذكورة آنفا

* (المسئلة الثامنة والعشرون) * اذا اريد ان يرسم داخل محيط دائرة معلوم
 مخمس منتظم احدى رؤوسه منتظمة على نقطة معلومة يقال
 ان محيط الدائرة كفى (الشكل ٧١) بتعيين بمركزه ونقطة من المحيط
 اذا علم المستوى المحتوى عليه فاذا فرض ان المستوى المذكور هو م

وان المسططين الاقيين $و$ و $أ$ للمركز $و$ والنقطة $ا$ معلومان
يستنجم المسططان الرأسيان انظر (بند ٢٩) بان يستعمل لذلك رأسيان
 $و$ $ا$ للمستوى $م$ ثم انه لا يمكن اجراء العمليات المطلوبة الا بعد انطباق
المستوى $م$ على احد مستويي المسقط ولا جل جعله في هذا الوضع تستعمل
الطريقة الثالثة المقررة في (بند ٧٦) اعني حركة دوران $م$ ثم تغيير مستو
فاذا اريد جعل المستوى $م$ مستويا جديدا رأسيا للمسقط لزم جعله اولا عمودا
على المستوى الافقي بتدويره حول محور عمود على المستوى الرأسى انظر
(بند ٦٤) الى ان يصير $ر$ في وضع $ر$ عمود على $خ$ $ض$ وحيث ان المحور
اختيارى يلزم ان يجعل مارا $ك$ كما هو الاخصر بنقطة تقاطع الاثرين وهذا
الاختيار يتعلق ضرورة بترتيب الشكل الخاص $م$ لاجل ايجاد مساقط
النقطتين $و$ $ا$ بعد الدوران يمكن استعمال رأسيين قد رسما ولكن
يمكن ايضا تبديل هذين الرأسيين بخطين اعظم ميلا للمستوى $م$ بان
تصور مثلا في المستوى $م$ من النقطة $و$ خطا $ط$ اعظم ميلا بالنسبة
للمستوى الرأسى فيكون مسقطه الرأسى عمودا نازلا من $و$ على $ر$
انظر (بند ٣٧) وقاطعا $ر$ في النقطة $ع$ وهى الاثر الرأسى لهذا
المستقيم الاعظم ميلا فتصير النقطة $ع$ في النقطة $ع$ والمستقيم $ط$ يبقى
عمودا على $ر$ وعلى طوله الاصلى كفاي (ثالثا من بند ٥٦) فيثبت
اذا اخذنا $ع$ $و$ $ع$ $و$ عمودا على $ر$ تكون النقطة $و$ مسقط
النقطة $و$ الرأسى في وضعها الجديد ويبقى مسقطها الافقى على بعد واحد من
 $خ$ $ض$ فيكون حيث نثبت $و$ على المسقط الافقى للرأسى $و$ من المستوى
 $م$ الذى سبق استعماله لايجاد $و$ ويمكن بهذه الكيفية ايجاد المسططين

أ و أوينبه على ان النقط الثلاث ن و و أ لا بد وان توجد على ق المعينة فيما سلف بالمسقط الرأسى ن والمسقط الافقى و ومن هنا يستخرج و فيكون أ على قوس دائرة مرسوم من المركز ن بنصف قطر ن أ

وانجعل الآن المستوى م مستويا رأسيا للمسقط فيصير اثره الافقى ق خط الارض الجديد خ ض فيحدث المسقطان الرأسيان للنقطتين أ و و كافي (بند ٤٤) اللذان ليسا في الواقع الا النقطتين نفسيهما وباجراء العملية المعلومة وهى قسمة نصف القطر و أ فى النقطة ع الى جزئين اكبرهما وسط متناسب بين الخط بتمامه وجزئه الاصغر فيكون أ ع ضلع المعشر فاذا زيد على هذا الضلع مثله بان جعل من أ الى ب يكون أ ب ضلع الخمس المطلوب وبعد رسم الخمس أ ب ج د ه يؤول الامر الى البحث عن ايجاد مسقطيه على مستوي المسقط الاصيلين بعمليات عكس العمليات المتقدمة بان ننقل من مستوي المسقط المتقاطعين فى خ ض الى المتقاطعين فى خ ض ويكون ذلك بتغيير المستوى الرأسى ثم ندور المستوى م حول المحور أ فى جهة مخالفة لجهة الدوران المبين بسهم القوس بقدر زاوية مساوية للزاوية ف التى دارها المستوى فى العمالية الاولى

فحيث ان النقطة ع مثلثا تسقط افسقاطا اقلييا فى ع على خ ض

يكون حينئذ مسقطها الرأسى ع باخذ ع = ع على عمودنازل

من ع على خ ض واذا جعل بعد ذلك المستوى م فى وضعه الاصيلى

م تحركت النقطة ع تحركا موازيا للمستوى الرأسى للمسقط وصارت

على الرأسى ب للمستوى م الذى يمر مسقطه الافقى ب بالنقطة ع

بالضرورة وحينئذ يعلم ايضا ب اذا قرر ذلك وجب ان يكون المسقط الرأسى

سُ على كل من بُ ومن قوس الدائرة المرسوم من المركز نُ بنصف
قطر نُ سُ فيه لم المسقط حينئذ وبه يعرف سُ الواجب ان يكون على
المسقط الافقي بُ وبهذه الكيفية توجد مساقط رؤس الخمس الباقية
وتوصيل هذه الرؤس ببعضها واحدة بعد الاخرى بمستقييات يتحصل معنا
مسقطا الخمس نفسه

فاذا اريد جعل مستوى الشكل مستويا اقصيا للمسقط لزم اولا جعله
في وضع م عمود على المستوى الرأسى بحركة دوران حول محور رأسى ثم جعل
هذا المستوى م مستويا اقصيا للمسقط وبهذا يصير ر خطا ارضيا جديدا

(٨٠)*

(المسئلة التاسعة والعشرون)* اذا اريد ايجاد المركز ونصف قطر الدائرة
المرسومة خارج مثلث معلوم يقال

يرسم كما في (الشكل ٧٢) اولا اثر المستوى م الكائن عليه المثلث المعلوم
ا - ب كما في (بند ٣٢) ثم يطبق المستوى م على المستوى الافقى
للمسقط لا مكان اجراء العمليات اللازمة لحل المسئلة بان تستعمل مثلا الطريقة
الرابعة المقررة في (بند ٧٦) اعنى حركتى دوران بان يجعل اولا المستوى م
عمودا على المستوى الرأسى بحركة دوران اولى حول محور رأسى ا فيرسم
الاثر ق زاوية في فيجب حينئذ ان ترسم النقط ا و - و ب عين الزاوية
التي رسمها الاثر ولذلك ترسم من النقطة ا - معتبرة مركزا بانصاف اقطار
ا ا و - ا و - و ا - ب اقواس دوائر عليها تؤخذ بالابتداء من النقط
ا و - و ب مقادير مساوية للمقادير المحصورة في الزاوية في فتتصل
حينئذ المساقط الافقية ا و - و ب واما المساقط الرأسية فتبقى على

ما كانت عليه من الارتفاع عن خط الارض خ ض وتوجد كلها على ر ك وهذا
 برهان على صحة العمليات ثم يدور المستوى م حول المحور ق ك لينطبق
 على المستوى الافقي للمسقط وتصبح المساقط الرأسية على خ ض في النقط
 أ و س و ج واما النقط نفسها أ و س و ج فتكون على
 مستقيمت موازية لخط الارض خ ض ومارة من المساقط الافقية أ و
 س و ج كل مستقيم من مسقط اذا تم ذلك نرسم المركز و والنصف قطر
 و أ للدائرة المرسومة خارج المثلث أ س ج ونحصل مساقطها بدور
 المستوى دورتين مساويتين للدورتين اللتين اجريتا قبل ذلك لكن الى جهة
 عكس جهتهما فبذلك نصير اولا النقطة و في النقطة و بدورانها حول
 ق ك ثم في و بدورانها حول المحور أ فيتحصل معنا المسقطان أ و
 و أ لنصف قطر الدائرة المذكورة
 واذا اريد انطبق المستوى م على المستوى الرأسي بدويره حول اثره الرأسي
 للزم اولا جعل هذا الاثر عمودا على المستوى الافقي بحركة دوران اولى حول محور
 عمود على المستوى الرأسي

(الباب الثالث)

مسائل في النقطة والمستقيم والمستوى
 في المستقيمت والمستويات الاعمدة على بعضها

مسقطا المستقيم العمود على مستوي يكونان عمودين على اثرى المستوى كل مسقط
 على نظيره لانه اذا اخذ المستوى المسقط افقيا للمستقيم مستويا رأسيًا للمسقط

انطبق خط الارض على ω وصار الاثر $ق$ عمودا عليه كما في
 (رابعاً من بند ٣٣) وصار ايضا ω و $ر$ عمودين على بعضهما
 ويمكن ايضا اثبات هذه الدعوى النظرية بسهولة بواسطة حركة دوران لانه بتدوير
 جملة الشكل حول محور رأسي الى ان يصير المستوى $م$ عمودا على المستوى
 الرأسى يكون حينئذ المستقيم ω موازيا لهذا المستوى فعلى ذلك يكون
 ω موازيا لخط الارض $خ$ $ض$ والاثر $ق$ عمودا عليه فحينئذ يكون
 ω و $ق$ عمودين على بعضهما وبتدوير جملة الشكل حول محور عمود
 على المستوى الرأسى للمسقط الى ان يصير المستوى $م$ عمودا على المستوى
 الافقى للمسقط يثبت ان ω و $ر$ عمودان على بعضهما وبالجملة فهذه الاثبات
 يرجع للاول انظر (بند ٦٨) ويسهل رسم الشكل المتعلق بذلك كما يسهل
 رسم الاول

* (المسئلة الاولى) * اذا كان المطلوب امر ارمستقيم عمود على مستو معلوم
 من نقطة معلومة $ع$ يقال

انه يكفي ازالة عمودين من مسقطى النقطة المعلومة $ع$ على اثرى المستوى
 المعلوم لكن اذا لم يكن المستوى معلوما باثريه وكان هذان الاثران خلف حدود
 الرسم وجب اجراء العملية هكذا

بان يفرض ان المستوى المعلوم كما في (الشكل ٧٣) هو (اب)
 فير خط ما افقى $ج$ فى هذا المستوى فيكون مسقطه الرأسى $ج$ موازيا
 لخط الارض $خ$ $ض$ وناطعا $ا$ و $ب$ فى النقطتين $ا$ و $ب$ وهما
 المسقطان الرأسىان للنقطتين $ا$ و $ب$ فيتحصل منهما بدون واسطة المسقطان
 الاقبيان ثم يتحصل ايضا $ج$ لكن $ج$ مواز للاثر الافقى للمستوى فاذا

انزلنا من المسقط ع عمودا على ج يكون ن المسقط الافقي للعمود
المطلوب واذا امرنا ايضا رأسيا ط على المستوى (ا ب) حدث
ن ثم اذا لم يكن لكل من الخطين الافقي والرأسي من المستوى مسقطان
في حدود الرسم يجب تغيير مستوي المسقط بان يجعل اولا مثلا المستوى
الجديد الافقي المستوى المسقط رأسيا لحد المستقيمين ا ثم ينتخب مستويا جديدا
رأسيا مارا بالمستقيم ب بحيث يكون المستقيمان ا و ب اثرين
للمستوى المعلوم على مستوي المسقط الجديدين فينزل على هذين الاثرين
حينئذ عمودين من المسقطين الجديدين للنقطة المعلومة ثم ينتقل من مسقطي
هذا الرأس على المستويين الجديدين الى مسقطيه على المستويين
الاصليين

(المسئلة الثانية) اذا كان المطلوب امرار مستو وعمود على مستقيم معلوم
و من نقطة معلومة م يقال

من النقطة م كافي (الشكل ٧٤) يمر الافقي ط للمستوى المطلوب
م فيكون مسقطه الافقي بالضرورة موازيا للاثر الافقي للمستوى حينئذ

يكون ذلك المسقط عمودا على و ويكون الاثر الرأسى ا للافقي ط
نقطة من الاثر الرأسى للمستوى م ولا بد ان يكون الاثر الرأسى لهذا المستوى
عمودا على و فاذا انزلنا من النقطة ع التى هى تقابل ذلك الاثر مع
خ ض عمودا على و كان ذلك العمود هو الاثر المطلوب ق

فان لم يتقابل الاثر ر بخط الارض خ ض في حدود الرسم عينت
بلا واسطة نقطة من ق بان يمر من النقطة م الرأسى ج للمستوى
م وقد يكون اثرا هذين المستقيمين ط و ج خارجين عن
حدود الرسم ففي هذه الحالة يلزم اولا ان ينسب الى اتهما يكفيان في تعيين المستوى

المطلوب بدون حاجة لايجاد اثر بهما لكن اذا اريد تحصيل جزئ اثرى المستوى
السكائين في حدود الرسم امكن بواسطة الافقى ط والرأسى ج المارين
من النقطة م تعيين جلة مستقيمت اخر غير متناهية ككائنة كلها
في المستوى المطلوب بالتوصيل بين اى نقطتين من هذين المستقيمين احدهما
يمكن ان تكون على بعد غير متناه

* (٨٤) *

* (المسئلة الثالثة) * اذا كان المطلوب امرار مستو عمود على مستو معلوم
من مستقيم معلوم يقال

ليفرض ان المستقيم المعلوم و والمستوى المعلوم م فاذا انزلنا من نقطة ما
من نقط و عمودا ن على المستوى م لا يخرج عن المستوى المطلوب
فيكون هذا المستوى معيناً بالمستقيمين و و ن انظر (بند ٣١)
فاذا كان المستقيم و نفسه عموداً على المستوى م لا يكون معنا المستقيم
واحد ومن المعلوم ان كل مستو مار من مستقيم عمود على مستو آخر يكون عموداً
على هذا المستوى فاذا اخذ بدل المستقيم و نقطة لم يتغير العمل

* (٨٥) *

* (المسئلة الرابعة) * اذا كان المطلوب امرار مستقيم عمود على مستقيم معلوم
من نقطة معلومة يقال

اذا كانت النقطة المعلومة خارجة عن المستقيم المعلوم لا يمكن ان ينزل من مثل
هذه النقطة الا عمود واحد على المستقيم ويمكن حل المسئلة بعدة طرق هي ان يقال
(اولاً) من حيث ان المستقيم المعلوم و والنقطة المعلومة م كافي (الشكل ٧٥)
يعينان مستويا (و م) انظر (بند ٢٧) يمكن جعل ذلك المستوى احد
مستويي المسقط او انطباقه على احد مستويي المسقط المتقاطعين في خض
باستعمال احدى الطرق الاربعة المقررة في (بند ٧٦) ولنتخبط الثانية منها
بفرض تطبيق المستوى (و م) على المستوى الافقى للمسقط ويلزم
لذلك اولاً ان يؤخذ مستو جديد رأسي للمسقط عمود على المستوى (و م) بحيث

يكون χ عمودا على الاثر الافقي لهذا المستوى بالضرورة ولا يلزم
مع ذلك ايجاد هذا الاثر بل يكفي امر ارفاق τ للمستوى (ω)
من النقطة m فيلزم حينئذ ان يمر τ من m ويكون موازيا للخط χ
ويقابل ω في النقطة τ ومنها يستنتج τ الذي يلزم ان يكون كائنا
على ω فاذا اوصلنا τ بالمسقط m حدث المسقط τ الذي يجب ان يكون
 χ عمودا عليه ولاجل الاختصار ينتخب المستوى الرأسى الجديد للمسقط
مارا من النقطة m ومن حيث ان هذه النقطة والمستقيم ω يوجدان
على مستوي عمود على المستوى الرأسى للمسقط يوجد مسقطاهما
الرأسيان m و ω على مستقيم واحد ويجب ان يكون ايضا الاثر الرأسى τ
للمستوى m او (ω) واما τ فيجب ان يكون عمودا على χ
ويمكن ان يكون كائنا ثانيا في حدود الرسم بوضع خط الارض الجديد وضع الانقا
فاذا قررنا بعد ذلك هذا المستوى حول τ انطبق المستقيم ω والنقطة m
على ω و m اى كل على نظيره فاذا انزل من النقطة m العمود n على
المستقيم ω قابل ذلك العمود ω في النقطة ϵ وبارجاع هذه النقطة
الى الوضع الاصلى للمستقيم ω يحصل المستطمان ϵ و ϵ فاذا اوصلنا
مساقط النقطتين m و ϵ بخطين مستقيمين كما ماسقطى العمود المطلوب وكان
يصح اعتبار τ خطا ارضيا جديدا واستعمال الطريقة الاولى المذكورة
في (بند ٧٦) ويمكن ايضا استعمال احدى الطريقتين الاخرتين لذلك
تنبيه * الطريقة التي سلطناها هنا اسهل الطرق المذكورة في كتب هذا الفن
لان الانسان قد يكون مجبورا في هذه الطريقة الاخيرة على امرار مستقيم
من النقطة m قاطع للمستقيم ω او مواز له كما يكون مجبورا ايضا على ايجاد
اثرى المستوى المعين بهذين المستقيمين قبل اجراء الانطباق
*(وثانيا) * من حيث ان المستقيم المطلوب n يقطع المستقيم ω في النقطة

ع التي منها يمكن امرار مستقيم آخر \bar{N} عمود على المستقيم و المذكور
فيكون المستوى (N) عمود على W ويقطعه في النقطة ع فهذا يتوصل
الى امرار مستو عمود على مستقيم W من النقطة م كافي (بند ٨٣) والى
البحث عن نقطة تقابل هذا المستوى بالمستقيم W فاذا اوصلنا نقطة التقابل
ع بالنقطة المعلومة م نحصل معنا المستقيم المطلوب لكن هذه الطريقة
المذكورة دائماً في الكتب منقردة تستدعي حل مسألة تتعلق بعدد مسائل سيأتي
حلها واما المسألة التي نحن بصدد حلها فهي محل حلها والحل الاول حيث نذهب
المناسب لها حقيقة ومزيتها ان يستنتج منه تطبيق جديد للاصول وهذا برهان
آخر على عمومية تلك الاصول

* (المسألة الخامسة) * اذا كان معلوما مسقط افقي لمستقيم عمود على مستقيم
معلوم في نقطة معلومة والمطلوب ايجاد مسقطه الرأسى يقال
اذا كانت النقطة المعلومة كافي (الشكل ٧٦) على المستقيم المعلوم
اسكن في مستثلنا هذه امرار عدة اعمد على هذا المستقيم غير محصورة
لكن يختار منها معرفة ما كان معلوم المسقط الافقي ولنفرض
حيث ان W هو المستقيم المعلوم و N المسقط الافقي المعلوم للخط
العمودي على المستقيم W المأخوذ من النقطة م ومن حيث ان
المستقيم N كائنا في المستوى م العمود على المستقيم W في النقطة
م يتوصل بعد ايجاد اثرى هذا المستوى كما هو مبين في (بند ٨٣) الى
البحث عن المسقط الرأسى لمستقيم W كائن في مستو ومعلوم المسقط الافقي
كافي (بند ٢٨)

* (في تقاطع المستقيمت والمستويات) *

كل سطح يتولد على العموم من خط فراغى متحرك بطريقة معلومة والسطح

عموما وجهان خارجي وداخلي ولا امتياز لحددهما عن الآخر في هذا العلم لكن
ينبغي تمييزا حدهما عن الآخر فيما يتعلق بالصنایع

كل سطحين مثل S و S' يتقاطعان في خط لا يمكن ايجاده دائما
بمجرد تولدهما بل لابد مع ذلك من تعيينه نقطة فتقطة ولهذا تؤخذ نقطة
سطوح متوالية مساعدة بقطع كل منها السطح المذكور S في خط كخط J
والسطح S' في خط كخط J' في تقاطع الخطان الكائنان على سطح واحد
مساعدة H في نقطة M من التقاطع المطلوب للسطحين المذكورين
 S و S' وينبغي ان يختار في كل حالة السطح المساعد H
المذكور لطبيعته ووضع بحيث تتحصل مساقط تقاطعيه مع السطحين المعلومين
بطريقة اسهل من الطريقة التي يتحصل بها مسقطا تقاطع هذين السطحين
نفسهما فاذا كان السطحان S و S' مستويين فن المعلوم ان السطوح
المساعدة كالسطح H تكون بالضرورة مستوية ايضا واختيار هذه
المستويات المساعدة يكون اولا بكيفية ان آثارها تقاطع آثار المستويين
المعلومين في حدود الرسم وثانيا ان تقاطعي المستوي المساعد مع المستويين
المعلومين يتقاطعان في حدود الرسم

(المسئلة السادسة) اذا كان المطلوب ايجاد تقاطع مستويين آثارهما
متقاطعة في حدود الرسم يقال

من المعلوم ان النقطتين A و B اللتين هما نقطتا تقاطع آثار المستويين
المعلومين كافي (الشكل ٧٧) نقطتان من تقاطع المستويين المذكورين وهما
ايضا اثران انظر (بند ٢٨) وبهذا يسهل ايجاد مسقطي هذا المستقيم انظر

* (٦٧) *

* (٩٠) *

* (المسئلة السابعة) * اذا كان المطلوب ايجاد التقاطع γ للمستويين m و n اللذين اثرهما الاقيان متوازيان يقال من المعلوم ان النقطة r التي هي نقطة تقاطع الاثرين الرئيسيين للمستويين γ كما في (الشكل ٧٨) اثر رأسي لتقاطع المستويين فير حينئذ γ بالمسقط r ويقابل بالضرورة الاثرين q و q' في نقطة تقاطعهما اللانهائي ومن ثم يكون γ موازيا لهما ويمر كذلك المسقط γ ضرورة بالنقطة r ويقطع $خ$ في نقطة لانهاية فيها النقطة a ومن هنا يكون موازيا له كما ان γ لما كان موازيا للاثر q يكون المستقيم γ اقلياً للمستوى m المشتمل عليه في حينئذ يكون المسقط γ موازيا بالضرورة للخط $خ$ ثم لا بد وان يكون خط التقاطع γ اقلياً بالاولى لانه لو لم يكن كذلك لقطع المستوى الافقي في نقطة a مشتركة بين q و q' فلا يكونان متوازيين وهذا خلف ويكون ايضا خط تقاطع المستويين المتوازيين الاثرين الرئيسيين موازيا للمستوى الرأسي

* (٩١) *

* (المسئلة الثامنة) * اذا كان المطلوب ايجاد تقاطع مستويين اتحدتا اثرهما كل منهما وصارا مستقيما واحدا يقال حيث ان الاثرين a و b لهذا التقاطع كما في (الشكل ٧٩) متحدان في نقطة واحدة يكون التقاطع γ بالضرورة في مستويين عمودين على $خ$ وحينئذ يكون مسطاه عمودين على $خ$ ويكون معلوما منه ايضا نقطتان هما a و b تنبيه يتحصل من المستقيم γ ومستويي المسقط زوايا متساوية لان هذا المستقيم يحدث مع مسقطيه مثلثا متساوي الساقين

* (٩٢) *

(المسئلة التاسعة) اذا كان المطلوب ايجاد التقاطع γ للمستويين m و n المتقاطعين اترهما الاقبيان خلف حدود الرسم يقال ان المستويين المتوازيين مقطوعان بثالث في مستقيمين متوازيين فلورسم كافي (الشكل ٨٠) مستوي s مواز للمستوي n لكان تقاطعه p مع المستوي m موازيا للتقاطع γ للمستويين m و n لان النقطة s من هذا التقاطع معلومة فيلزم حينئذ اخذ خط مواز للمسقط p من النقطة s وانحر مواز للمسقط p من النقطة s انظر (بند ٢٤)

(٩٣)

(المسئلة العاشرة) اذا كان المطلوب ايجاد التقاطع γ للمستويين m و n اللذين آثارهما الاربعة متقابلة في نقطة واحدة a من خط الارض يقال انه يجب كافي (الشكل ٨١) اختيار المستوي المساعد s بحيث تقاطع s مع n و p وكذلك s مع m و q في زوايا قائمة تقريبا فالمستوي s المذكور يقطع المستويين m و n في مستقيمين a و b يتلاقيان في النقطة m من التقاطع المطلوب ومع ذلك فهذا التقاطع يمر من النقطة a بالضرورة فيتعين حينئذ تعيينا تاما بكل من هاتين النقطتين

(٩٤)

تنبيه يمكن حل هذه المسئلة بالمستوي المساعد ايا ما كان وضعه باعتبار هندسي في غالب اوضاع المستوي ولا يمكن حلها باعتبار رسمي لانه حيث كانت خطوط الشكل غير رياضية ينبغي رسمها بشرط ان يكون تقاطعها صحيحا مضبوطا لاشك فيه والا حسن في تمام هذا الشرط ان تصنع الخطوط المتقاطعة زاوية قريبة من الزاوية القائمة

(٩٥)

(المسئلة الحادية عشر) اذا كان المطلوب ايجاد التقاطع γ للمستويين

م و ك الموازيين لخط الارض يقال
 اذا اخذ المستوى المساعد عمودا على خط الارض خض كفاي (الشكل ٨٢)
 يصير بالضرورة مستويا جديدا راسيا عليه الاثران $\text{م} \text{و} \text{ك}$ وحيث ان
 المستويين المذكورين م و ك عمودان على هذا المستوى الجديد
 الرأسى يكون تقاطعهما عمودا عليه ايضا فينقط حيثئذ هذا التقاطع
 في ي ويكون مسقطه الافقى ي عمودا على خض او موازيا
 خض ومع ذلك فالمستقيم ي يكون موازيا خض وكائنا فوق المستوى
 الافقى بارتفاع ج ي فلو اخذ حيثئذ $\text{وج} = \text{ج ي}$ لحدث
 نقطة من المسقط الثانى ي الموازى بالضرورة ايضا للخط خض
 وكان يمكن ايضا ان يعتبر المستوى المساعد مستويا جديدا افقيا
 للمسقط ويبحث عن الاثرين $\text{ق} \text{و} \text{ك}$

* (المسئلة الثانية عشر) * اذا كان المطلوب ايجاد التقاطع ي للمستويين
 م و ك اللذين لم يتقاطعا اثارهما داخل حدود الرسم يقال
 لحل هذه المسئلة عدة طرق هي
 * (اولا) * ان يرسم كفاي (الشكل ٨٣) المستوى ك موازيا للمستوى
 ك ويرسم تقاطعه ي مع المستوى م ويفرض ان $\text{م} \text{و} \text{ك}$
 ممتدان الى ان يتقاطعا في النقطة ـ ويتوهم رأسى ـ فالمثلثان
 مـ ل و مـ ل متشابهان وكذلك مـ ـ و مـ ـ وكذلك
 مـ ا و مـ ا ومن ذلك يحدث هذه المناسبات

$\text{م}^- : \text{م}^- :: \text{م}^+ : \text{م}^+$ و $\text{م}^- : \text{م}^- :: \text{م}^+ : \text{م}^+$ و
 $\text{م}^- : \text{م}^- :: \text{م}^+ : \text{م}^+$

وبحذف م⁻ و م⁻ من هذه التناسبات تكون هكذا

$\text{م}^+ : \text{م}^+ :: \text{م}^+ : \text{م}^+$ و $\text{م}^+ : \text{م}^+ :: \text{م}^+ : \text{م}^+$

وبواسطة الحدين الرابعين من هاتين التناسبتين تحدث النقطة م^+ من

المسقط م^+ وكذلك النقطة م^+ من م^+ وحيث ان التقاطع م^+ مواز
 للتقاطع م^+ يكون معلوما بالضرورة ويمكن ابدال الحدين الرابعين من
 هاتين التناسبتين بالمستويين الجديدين المساعدين كما تشاهد ذلك في الطرق
 الآتية

* (وثانيا) ان يؤخذ مستويا مساعدا مثل س يقطع المستوى م
 في خط مستقيم ا والمستوى ك في مستقيم ب كما في (الشكل ٨٤)
 فحيث ان هذين المستقيمين في المستوى س يلزم ان يتقاطعا في النقطة م
 من التقاطع م للمستويين م و ك وبأخذ مستويا آخر مساعدا مثل
 ص قاطعا للمستوى م في خط مستقيم ج والمستوى ك
 في مستقيم و توجد نقطة اخرى د من هذا التقاطع فتعين بهاتين اثباتا
 لكن يسهل معرفة ان استعمال المستويات المساعدة اياها كانت لا يفيد دائما تقاطعا
 من التقاطع م للمستويين م و ك

* (وثالثا) ان يؤخذ ك كما في (الشكل ٨٥) المستوى المساعد
 س موازيا للمستوى الافقي وقاطعا للمستويين م و ك في اقليين
 ا و ب من هذين المستويين فيقابل هذان الاقليان في النقطة م
 من التقاطع المطلوب فلو اخذ مستويا آخر مساعدا مثل ص موازيا للمستوى

الرأسي لقطع المستويين المذكورين م و ك في رأسين و و هـ
 من هذين المستويين وهذان الرأسيان يتقابلان أيضا في النقطة هـ من
 التقاطع المذكور ويوصل النقطتين م و هـ يحدث التقاطع ي
 المطلوب للمستويين المعلومين م و ك

* تنبيه * إذا اخذ المستويان المساعدان س و ص ابعد ما يكون من خط
 الأرض فالتقاطعات المساعدة تتقاطع في نقط قريبة من خط الأرض فينتج من
 ذلك أنه لو كان النقطتان م و هـ الكائنتان في الشكل المتكلم عليه هنا
 خارج حدود الرسم لزم سلوك طريقة أخرى يأتي الكلام عليها في (بند ٩٧)
 * (ورابعا) * ان ينتخب المستوي المساعد س موازيا لخط الأرض كما
 هو ممكن أيضا وقاطعا للمستويين م و ك في مستقيمين أ و أ'

يتقاطع مسقطاهما الأفقيان في النقطة أ من ي كما في
 (الشكل ٨٦) ولما كان مسقطاهما الرأسيان لاية تقاطعان الخارج
 حدود الرسم لم يرسموا إذا اخذ مستوي آخر مساعد مثل س' نتج عنه

تقاطعان جديان ب و ب' يحدث منهما نقطة أخرى ر من ي
 فيتعين حينئذ وإذا انتخب أيضا مستويان جديان مثل ص و ص'
 اثرهما الأفقيان بعيدان كل البعد من خط الأرض خ ض وكل منهما يقطع
 المستويين م و ك بأن يقطعهما الأول الذي هو ص في المستقيمين
 و و والآخر في المستقيمين هـ و هـ التي تقاطع مساقطها الرأسية

داخل حدود الرسم حدث من ذلك نقطتان د و هـ من المسقط الرأسى
 ي فيتعين بهما ومن هنا يحدث التقاطع ي للمستويين م و ك

* (المسئلة الثالثة عشر) * إذا كان المطلوب إيجاد تقاطع مستويين انارهما
 تصنع مع خط الأرض زوايا قريبة من القائمة يقال

ليكن كما في (الشكل ٨٧) هذان المستويان م و ك ويسهل في هذه الحالة معرفة ان استعمال المستويات المساعدة المتقدمة لا يؤدي الى حل المسئلة لان المستوى الموازي للمستوى الرأسى يقطع المستويين م و ك في رأسين لا يتقاطعان في حدود الرسم وهذا ناشئ من ككون المستويين م و ك لا يتقاطعان الا بعد مسافة عظيمة الا ان جزء هذا التقاطع المجاور لآثره الافقى ينسقط انسقاطا رأسيا قريبا من خط الارض فاذا اخترنا مستويا مساعدا ماز بجخط الارض خ ض و قليل الميل جدا على المستوى الافقى قطع المستويين م و ك في مستقيمين يقرب مسقطاهما الرأسيان من خط الارض ويتقاطعان بالضرورة في حدود الرسم ومن هنا يتحصل نقطة من المسقط الرأسى للتقاطع المطلوب وباجراء مثل هذه العملية مع مستوي جديد تنتج نقطة ثانية ايضا فيتم تعيين المسقط الرأسى بهما ويتعين المسقط الافقى بامرار مستويين بجخط الارض صانعين مع المستوى الرأسى زاوية صغيرة جدا ونجرب العمل على ما ذكره فنقول

يؤخذ اولاً مستوي مثل س معين بجخط الارض خ ض وبالنقطة س الموجودة قريبا من المستوى الافقى وبعيداً جداً عن المستوى الرأسى فيقطع المستويين م و ك في مستقيمين مابين بالضرورة من النقطتين ع و ك اللتين هما تقاطع المستويين المذكورين بجخط الارض خ ض ولايجاد نقطة اخرى لكل من هذين المستقيمين او التقاطعين يؤخذ مستوي آخر مساعداً مثل موازياً للمستوى الرأسى وماراً من النقطة س فيقطع بالضرورة المستوى س في مستقيم ا موازاً لخط الارض كما يقطع مستوي م و ك في رأسين ب و ج من هذين المستويين فيتقاطع المسقطان ا و ب في النقطة ا من المسقط الرأسى و لتقاطع المستويين م و س لان النقطة ا كائنة على ككل من المستقيمين ا و ب من المستويين المذكورين وبمثل ذلك يتقاطع المستقيمان ا و ج في النقطة ر من

المسقط الرأسى هـ لتقاطع المستويين ك و س ومن حيث ان
المستقيين و و هـ في مستوا واحد س فلا بد ان يتلاقيا في النقطة
م المعلوم مسقطها الرأسى م وهى من تقاطع المستويين م و ك
لان المستقيين و و هـ من هذين المستويين ومن المعلوم ان هذا العمل
لا يتعين به نقطة ما من ^ن ^ن ولذا لم يرسم في الشكل المسقطان الاقيان
و و هـ لتقاطع المستويين م و ك مع المستوى س ويصح
ايجاد نقطة اخرى من ^ن ^ن بواسطة المستوى س المار من خط الارض
خ ض ومن النقطة س^ن التي اختيرت متحدة المسقط الافقى مع النقطة س^ن
المتقدمة لما في ذلك من كثير السهولة فيقطع المستوى ر المستوى المذكور
في المستقيم ا ومنه ينتج التقاطعان و و هـ للمستوى ر مع
المستويين المذكورين م و ك ثم ان هذان التقاطعان او المستقيمان
قد يعينان المسقط الرأسى م للنقطة م من التقاطع ^ن ^ن الذي تعين
بالكلية بهما ولاجل ايجاد المسقط الافقى يمر مستو ص من خ ض ومن
نقطة ص^ن مختارة قريبة جدا من المستوى الرأسى وبعيدة جدا من المستوى
الافقى فيقطع المستويين م و ك في مستقيين ح و ط يمكن
ايجادهما كما تقدم باخذ مستو مساعد ر موازيا للمستوى الافقى فالمسقطان
الاقيان ح و ط اللذان لم يرسم غيرهما هنا لان المسقطين الرأسيين
لا يتحصل منهما شئ كما هو معلوم بتقاطع ان في النقطة ^ن ^ن التي هي مسقط افقى
لنقطة ^ن ^ن من التقاطع ويتحصل نقطة اخرى ^ن ^ن باستعمال مستو ص^ن
مار من خط الارض خ ض ومن النقطة ص^ن فيتم حينئذ تعيين التقاطع
ي للمستويين م و ك

ويمكن التعرض أيضا في هذه المسئلة لعدة احوال اخرى سهل حلها بواسطة الطرق المستعملة في الامثلة السابقة فيمكن مثلا ايجاد تقاطع مستويين احدهما مواز لخط الارض والاخر اترام متحدان في مستقيم واحد وهكذا الى آخره

(٩٩)

(المسئلة الرابعة عشر) اذا كان المطلوب ايجاد تقاطع مستويين معلوم كل واحد منهما باثره ونقطة منه يقال

ليكن كما في (الشكل ٨٨) هذان المستويان م و ك معلومين بالاثرين ق^ك و ق^م والنقطتين ع و ك^ك ولذلك عدة طرق هي

(اولا) انه يمكن ان يرسم الاثران الرأسيان للمستويين المذكورين بامرار

مستقيم افقي للمستوى م من النقطة ع فيعلم منه نقطة من ر^ك بامرار مستقيم افقي للمستوى ك من النقطة ك^ك فينتج منه نقطة من

ك ويمكن امرار رأسيين للمستويين المذكورين من النقطتين ع و ك^ك

فيكون ك^ك و ر^ك حيثئذ موازيين للمستقيمين الرأسيين لهذين المستقيمين كل لتظايره ويمكن ايضا اخذ مستقيمين حيثما اتفق خارجيين من النقطتين

ع و ك^ك ومارين احدهما من نقطة من ق^ك والاخرى من نقطة من ق^م فيؤول الامر الى الطريقتين المتقدمتين

(وثانيا) انه يمكن حل المسئلة بالمستقيمات المعلومة التي فرضناها هنا بلا واسطة

اخرى بان يوصل بين النقطتين ع و ك^ك بمستقيم و يقطع المستوى الافقي في نقطة د ثم يرب هذا المستقيم مستقيما س وليختار المستوى المسقط

افقيا للمستقيم فيقطع المستوى س المستوى م في مستقيم ب مار بالنقطة ع ويقطع المستوى ك في مستقيم ج مار بالنقطة ك^ك فيتقاطع هذان المستقيمان ب و ج في نقطة م من التقاطع المطلوب

وهناك نقطة أخرى $ا$ وهي تقاطع الاثرين $ق$ و $ق$ وبها وبالنقطة
المتقدمة يتم تعيين التقاطع المطلوب

* (وثالثا) * ان العملية المتقدمة اخصر من غيرها لانها كافية في ايجاد التقاطع
المطلوب الا انه يمكن اخذ مستوي $س$ كافي (الشكل ٨٩) ثم يقال ان هذا
المستوى $س$ لابد وان يشتمل في جميع احواله على المستقيم $و$ فيشتمل ايضا
اثره الافقي على الاثر الافقي للمستقيم وهذا هو الشرط اللازم لهذا المستوى فيمكن
حينئذ ان يمر من نقطة $د$ مستقيم ما يعتبر اثرا $ق$ للمستوى المساعد
فيتحصل من هذا المستوى $س$ النقطة $م$ من التقاطع باجراء الاعمال
المتقدمة في الحالة السابقة وبماخذ مستوي آخر مساعد تحصل نقطة ثانية من هذا
التقاطع وبها يتم تعيينه

* (ورابعا) * انه اذا كانت النقطة $د$ خارج حدود الرسم امكن ايجاد التقاطع
 $ي$ بواسطة اعمال الشكل ٨٨ واذا كانت النقطة $ا$ خارج حدود
الرسم امكن اجراء الاعمال التي في الشكل ٨٩ لكن اذا كان هاتان النقطتان
خارجتين عن حدود الرسم فلا يمكن ايجاد التقاطع باستعمال الطرق المتقدمة
فينبغي في هذه الحالة ان يتصور مستويان $س$ و $س$ ماران بالنقطتين
 $ع$ و $ك$ كافي (الشكل ٩٠) وموازيان للمستوى الراسي وبقطعهما
بالمستوى $م$ في مستقيمين متوازيين يلزم بالضرورة ان يمر احدهما الذي
هو تقاطع $س$ و $م$ بالنقطتين $ا$ و $ع$ والاخر بالنقطة $ا$ فيعلم
حينئذ هذان المستقيمان $ا$ و $ا$ وكذلك بقطع المستوى $ك$ للمستويين
 $س$ و $س$ في مستقيمين متوازيين يلزم ضرورة ان يمر احدهما الذي هو
تقاطع المستويين $س$ و $ك$ بالنقطتين $ا$ و $ك$ والاخر بالنقطة
 $ب$ وحينئذ يعلم التقاطعان $ب$ و $ب$ لكن من حيث ان $ا$ و $ب$
موجودان في مستوي واحد $س$ فلا بد ان يتقاطعا في نقطة $م$ من التقاطع
 $ي$ المطلوب كما يتقاطع $ا$ و $ب$ في نقطة أخرى $م$ من هذا التقاطع $ي$

فحينئذ يتم تعيينه بهما ومن المعلوم ان الاعمال لا تختلف اذا امر مستويان
 رأسيان متوازيان اياهما كانا من النقطتين ع و ك ولا يلزم اصلا ان يكون
 المستويان المساعدان س و س موازيين للمستوى الرأسى للمسقط لانه
 لو كان كذلك لجبر الانسان على رءسهما في اتجاه غير الاتجاه الاول اذا كان النقطتان
 ع و ك على بعد واحد من المستوى الرأسى للمسقط لكن يمكن جعل هذه
 الحالة آيلة الى احدى الاحوال الاول بتغيير المستوى الرأسى دون المستوى
 الافقى لانه لا تنتج عنه المعاليم التى بها تحل المسئلة

(١٠٠)

(المسئلة الخامسة عشر) اذا كان المطلوب ايجاد تقاطع مستويين معلومين
 بخطيهما الاعظمين ميلا بالنسبة لمستوى المسقط الافقى يقال

ليكن كافي (الشكل ٩١) م و ك الخطين الاعظمين ميلا للمستويين
 م و ك وحل هذه المسئلة طريقتان هما

(اولا) ان يؤخذ المستوى المساعد افقيا مثل س فيقطع المستقيمين
 م و ك فى النقطتين ع و ك انظر (ثانيا من ٥٦) كما انه يقطع
 المستويين فى افقيين ا و ب مارين بالنقطتين المذكورتين لكن من
 حيث ان م عمود على ق كافي (بند ٣٧) يكون عمودا بالضرورة
 على ا كافي (بند ٣٦) كما ان ك ايضا عمود على ب فيكون هذان
 الافقيان معينين تعيينا كلييا وحيث كانا فى مستوي واحد س فلا بد ان
 يتقاطعا فى نقطة كالنقطة م من التقاطع ي للمستويين وباستعمال
 مستواخرافى س نعلم نقطة اخرى م من هذا التقاطع وحينئذ يكون
 معلوما

(وثانيا) ان يقال اذا كان م و ك متوازيين كافي (الشكل ٩٢)
 يكون ا و ب متوازيين ايضا ولا ينتج منهما نقطة من نقط التقاطع
 لكن التقاطع ي يكون حينئذ افقيا كافي (بند ٩٠)

وكيفية معرفة نقطة منه ان يقطع المستويان المعلومان بكل من المستويين
الافقيين S و S' بان يقطع احدهما في افقيين A و B والاخر في افقيين
 A' و B' فيؤخذ اى نقطتين مثل A و B' على A و B ويوصلان بالمستقيم
 AB ثم يرسم على الخطين A و B' مستقيمين AC مواز للمستقيم
 AB وحيث يمكن اعتبار AC و AB' افقيين لمستوى ثالث قاطع
للمستوى M في مستقيم W وللمستوى K في مستقيم H
فإن تقاطع هذان المستقيمان W و H في نقطة D من التقاطع
 Y وباخذ عمود من S على M و K يتحصل بالضرورة Y
ولا ترسم المساقط الرأسية للمستقيمين W و H والنقطة S ولاجل ايجاد
المسقط Y يقال من حيث انه يقابل المستقيمين M و K في نقطتين
معلوم مسقطاهما الافقيين S و S' ينتج بالسهولة S و S'
فيعينان المسقط المذكور Y ويجب مع ذلك ان يكون هذا المسقط موازيا
لخط الارض XZ

* (١٠١) *

* (المسئلة السادسة عشر) * اذا كان المطلوب ايجاد تقاطع مستويين
معلومين باثرهما الافقيين والزاوية الحادثة من كل منهما مع المستوى الافقى
يقال

من المعلوم كفاي (الشكل ٩٣) من مسئلة نظرية في الهندسة الاصلية انه
اذا كان مستوي عمود على المستوى الرأسى للمسقط تكون الزاوية الحادثة منه
ومن المستوى الافقى مقيسة بالزاوية الحادثة عن اثره الرأسى مع خط الارض
فاذا اخذ حيثئذ مستورا رأسى عمود على المستوى M حدث من الاثر M
لهذا المستوى مع خط الارض XZ الزاوية المعلومه A واذا اخذ ايضا
مستورا رأسى عمود على المستوى K يحدث من اثره K مع خط الارض

خ^ض الزاوية المعلومة \angle وحيث كان المستويان المذكوران
 م و ك منسوبان لمستوى واحد افقى والى راسيين مختلفين امكن تغيير
 المستوى الرأسى لكل منهما وايجاد اثريهما ر^م و ر^ك كما فى (بند ٤٧)
 على مستوي واحد رأسى خ^ض ولكن هذا ليس ضروريا لانا اذا تصورنا
 مستويا افقيا س يكون اثره على المستويين الرأسيين موازيين لخطى
 الارض خ^ض و خ^ض وعلى بعد واحد من هذين الخطين الارضيين
 ويقطع هذا المستوى المذكور س المستويين م و ك فى اقعين
 ا و ب وهذان الاقعيات يتقاطعان فى نقطة م معلوم مسقطها
 الافقى م فبالا توصيل بين ا و م يحدث المسقط الافقى م^ق للنقاط
 المطلوب للمستويين م و ك وحيث علم ايضا المسقطان الرأسيان
 ر^م و ر^ك تعين التقاطع المطلوب

(١٠٢)

يمكن ايضا تنويع معالم المستويين المذكورين بان لا يفرض معلومين بكيفية
 واحدة ومما تقدم يسهل معرفة التغيير الذى يلزم فى كل حالة من احوال طرق الحل
 التى ذكرناها هنا متتالية

(١٠٣)

الهندسة الاصلية والهندسة الوصفية تستد احداهما من الاخرى بحيث توجد
 فى الغالب خواص معلومة من الهندسة الاصلية موصلة الى بعض خواص
 مجهولة فى الهندسة الوصفية وبالعكس فبمقتضى المسئلة الرابعة عشر كما فى
 (الثامن بند ٩٩) يقال كل مستو مساعد مثل س كما فى (الشكل ٨٩)
 ينتج منه نقطة م من التقاطع فتكون حيثئذ جميع النقاط الناتجة
 كالنقطة م على مستقيم بحيث لو اعتبر المسقط الافقى فقط لشوهد
 ان جميع المستقيمات مثل ب و ج تتقاطع فى نقط مثل النقطة م^ق
 كائنة على مستقيم واحد مار بالنقطة ا ومن ذلك تنج دعوى

نظرية هي

اذا وجدت ثلاث مستقييات و م و ك كافي (الشكل ٩٤)
متقاطعة اثنين اثنين وثلاث نقط د و ع و ك على مستقيم منها مثل
و وأمر من النقطة د خطوط ت و ت و ت قاطعة
للمستقيين م و ك ووصلت نقط المستقيم م الى النقطة ع بمستقييات
ب و ب و ب ووصلت كذلك نقط المستقيم ك الى ك
بمستقييات ايضا ج و ج و ج تقاطع المستقيان ب و ج
والمستقيان ب و ج والمستقيان ب و ج في النقط
م و م و م التي هي والتقاطع للمستقيين م و ك
على مستقيم واحد ي

ومن المعلوم انه يمكن اعتبار المستقييات و م و م و م معاليم للمسئلة
وتختار النقطة ع اصلا للخطوط القاطعة ب و ب و ب
لاحد المستقيين م في النقط ب و ب و ب وللاخرى في النقط
م و م و م وينتج منه ان نقط تقاطع المستقيين ج و ت
والمستقيين ج و ت والمستقيين ج و ت على خط مستقيم
مع النقطة ا ويمكن ايضا جعل المستقييات و ك و م و م معاليم والنقطة
ك اصلا للخطوط القاطعة ج و ج و ج لاحد المستقيين
ك في النقط ج و ج و ج وللاخرى في النقط م و م و م
فينتج منه ان نقط تقاطع المستقيين ب و ت والمستقيين ب و ت
والمستقيين ب و ت كائنة على مستقيم واحد م مارا بالنقطة ا

يمكن ان يكون احدى النقط د و ع و ك لانها ثلث حالات وهي ان تقول

(اولا) اذا كانت النقطة د هي الانتهائية تكون الخطوط القاطعة

ت و ت و ت موازية للمستقيم و

(وثانيا) اذا كانت النقطة ع هي الانتهائية تكون الخطوط القاطعة

ب و ب و ب موازية ايضا للمستقيم و

(وثالثا) اذا كانت النقطة ك هي الانتهائية تكون الخطوط القاطعة

ج و ج و ج موازية ايضا للمستقيم و

وينتج من هذه الاحوال الثلاثة دعوى نظرية نطبقها على الحالة الاولى كما في

(الشكل ٩٥) لزيادة الايضاح فنقول

اذا كان معنائلاث مستقيمت و م و ك متقاطعة اثنين اثنين

ونقطتان ع و ك على مستقيم منها مثل و ورسمت جملة موازيات

للمستقيم و قاطعة للمستقيمين الآخرين م و ك ووصلت نقط

المستقيم م بالنقطة ع ونقط المستقيم ك بالنقطة ك يقال ان المستقيمين

ب و ج والمستقيمين ب و ج والمستقيمين ب و ج و ج

تقاطع في النقط م و م و م الكائنة هي والتقاطع ا

للمستقيمين م و ك على مستقيم واحد ي وهذه الحالة تنتج من

(شكاي ٨٦ و ٨٧) باعتبار ان العملية على مستواقي

(١٠٥)

اذا كانت المستقيمت الثلاثة و م و م و م معلومة واختيرت النقطة ع

اصلا للقواطع ب و ب و ب ينتج ان نقط تقاطع المستقيمين

ج و ت والمستقيمين ج و ت والمستقيمين ج و ت و ت

والنقطة ا على مستقيم واحد واذا كانت المستقيمت و م و م معلومة

واختيرت

واختيرت النقطة كـ اصلا للخطوط القاطعة ج و ب و ج
 شوهذان المستقيمتين ب و ت و ب و ت و ب و ت ...
 تقاطع في نقطة على مستقيم مار بالنقطة ا كل اثنين منها متفقين في العلامة
 بتقاطعان في نقطة ومن ذلك تنبع دعوى نظرية هي ان تقول
 اذا كان معنا ثلاثة مستقيمتين و م و ي ونقطتان ع و كـ
 كائنتان على احد هذه المستقيمتين وهو و وأمر من احدى هاتين
 النقطتين وهي ع جلة قواطع ب و ب و ب ثم وصلت
 نقط تقاطع تلك القواطع مع المستقيم ي بالنقطة الاخرى كـ من
 المستقيم و ثم أمر من نقط تقاطع تلك القواطع مع المستقيم م خطوط
 موازية للمستقيم و تقاطعت تلك الموازيات مثل ت والمستقيمتين
 مثل ج في نقطة على مستقيم مار بالنقطة ا التي هي تقاطع المستقيمتين
 م و ي

يمكن ان يستنتج من هذه الدعاوى عكسها فيقال
 * (اولا) * اذا كان معنا كافي (الشكل ٩٤) اربعة مستقيمتين و م
 و كـ و ي ثلاثة منها متقابلة في نقطة واحدة ا وكل منها يقطع
 المستقيم الرابع و وصلت جميع نقط احد المستقيمتين الثلاثة وهو ي بنقطتين
 ع و كـ كائنتين على المستقيم الرابع يقال ان المستقيمتين المارة من النقطة
 ع تقطع المستقيم م والمستقيمتين المارة من النقطة كـ تقطع المستقيم
 كـ والمستقيمتين المار من النقطتين ب و ج والمستقيمتين المار من النقطتين
 ب و ج والمستقيمتين المار من النقطتين ب و ج تقطع المستقيم و في نقطة
 واحدة د او توازيه كافي (الشكل ٩٥)
 واذا وصلنا نقط المستقيم كـ بالنقطتين كـ و د ينتج ايضا ان جميع

المستقيمت ب و ب و ب تتلاقى في نقطة واحدة ع من
المستقيم و وإذا وصلنا أيضا نقط المستقيم م بالنقطتين ع و د ينتج
ان جميع المستقيمت ج و ج و ج تتقابل في نقطة واحدة
ك من المستقيم و

* (وثانيا) * اذا كان معنا ثلاثة مستقيمت م و ك و ي خارجة
من نقطة واحدة ا ونقطة د خارجة عن هذه المستقيمت وامر من النقطة د
خطان قاطعان حيث ما اتفق ت و ت احدهما يقطع المستقيمت م و ك
في النقطتين ب و ب والاخر يقطعهما في النقطتين ج و ج
ثم اخذنا ايضا نقطتين حيثما اتفق كالنقطتين م و م على المستقيم الثالث
 ي ووصلناهما بنقط التقاطع المذكورة ينتج ان المستقيمت ب و ب
يتقاطعان في نقطة ع وان المستقيمت ج و ج يتقاطعان ايضا في نقطة
 ك وتكون النقط الثلاث د و ع و ك كائنة على مستقيم واحد
فلو فرض ان النقطة ع هي التي امر منها التقاطعان ب و ب
لوجد النقطتان د و ك مع النقطة ع على مستقيم واحد ولو فرض ان
النقطة ك هي التي امر منها الخطان القاطعان ج و ج لوجد النقطتان
 د و ع مع النقطة ك على مستقيم واحد

* (وثالثا) * اذا كان معنا كما في (الشكل ٩٥) ثلاثة مستقيمت
 م و ك و ي تتقابل في نقطة واحدة ا ومستقيمتان متوازيتان
 ت و ت قاطعان للمستقيمت م و ك بان يقطع اولهما المستقيمتين
المذكورتين في نقطتين ب و ب والاخر منهما يقطعهما في النقطتين
 ج و ج ووصل بين هذه النقط ونقطتين اخريين مأخوذتين بالاختيار

على المستقيم $ي$ تقاطع المستقيمان $ا ب$ و $ب ب$ في نقطة $ع$
والمستقيمان $ج ا$ و $ج ب$ في نقطة $ك$ وكان النقطتان $ع$ و $ك$ على
مستقيم و مواز للمستقيمين $ت ا$ و $ت ب$

* (1. V) *

اذا كان معنامستقيان م و ك كما في (الشكل ٩٦) مقطوعان
بجملته قواطع متوازية ت_١ و ت_٢ و ت_٣ وامر من النقط
أ_١ و أ_٢ و أ_٣ ومن النقط ج_١ و ج_٢ و ج_٣ التي
هي تقاطع تلك القواطع بالمستقيين م و ك بجلتا مستقييات متوازيتين
مر من النقط الاول ب_١ و ب_٢ و ب_٣ ومن الثانية ج_١ و
ج_٢ و ج_٣ تقاطع المستقيان ب_١ و ج_١ والمستقيان
ب_٢ و ج_٢ والمستقيان ب_٣ و ج_٣ في نقط م_١ و م_٢ و م_٣ ... كأنه
على مستقيم واحد مع النقطة ا التي هي تقاطع المستقيين م و ك
وذلك انك لو اعتبرت المستقيين م و ك اثنتين افقيتين لمستويين والقواطع
كالقواطع آثار الافقية لمستويات مساعدة متوازية وقاطعة للمستويين
المعلومين في مستقييات مثل ب_١ و ج_١ لا تتسببت هي والنقطة ا الى
المسقط الافقي لتقاطع المستويين المعلومين وكانت حينئذ جميع تلك النقط
على مستقيم واحد

* (1. A) *

وينتج مما ذكر دعوى نظرية عكس المتقدمة وهي ان تقول
اذا كان معنا ثلاثة مستقيمات م و ك و ي متقاطعة في نقطة واحدة
ا وأمر من جميع النقط م₁ و م₂ و م₃ الكائنة
على ي جلتا مستقيمات متوازية ب و ب و ب₃

ج و ج و ج ... الجملة الاولى قطعت المستقيم م والثانية المستقيم
 ك في نقط بحيث تكون المستقيمان الحادثة من اصال كل نقطتين منها كالنقطتين
 ا و ج والنقطتين ب و ج والنقطتين ج و د والنقطتين د و ه
 متوازية

(١٠٩)

(المسئلة السابعة عشر) اذا كان معنسا مستقيمان م و ك متقابلان
 في نقطة خارج حدود الرسم ونقطة م والمطلوب امرار مستقيم من النقطة
 م مقابل للمستقيمين م و ك في نقطة واحدة يقال لحل هذه المسئلة
 حالتان نشرع فيهما فنقول

(اولا) يرسم كما في (الشكل ٩٧) مستقيم ت يقطع م و ك
 في النقطتين ب و ج ثم توصل احدى النقطتين ب و م بالآخرى
 واحدى النقطتين ج و م كذلك فيتحصل مستقيمان يقطعان
 المستقيمين ك و م في نقطتين ب و ج وتوصيل احدى هاتين
 النقطتين بالآخرى يتحصل مستقيم ت مقابل للمستقيمين م و ك في النقطة
 د ومن هذه النقطة د يرسم مستقيم ثالث ت يقطع م و ك
 في نقطتين ب و ج وتوصيل احدى النقطتين ب و ج والنقطتين
 ب و ج بالآخرى يتحصل مستقيمان يتقاطعان في نقطة م من المستقيم
 المطلوب وذلك لانه لو اعتبر الثلاثة مستقيمان م و ك و ت انارا افقية
 لثلاثة مستويات مارة بنقطة واحدة فراغية مسقطها الافقى م
 لكان ب و ج المسقطين الافقيين لتقاطعي المستويين
 بالمستويين م و ك ولو اعتبرنا الآن النقطة ج مسقطا افقيا لنقطة من
 المستوى م وكذلك النقطة ب مسقطا افقيا لنقطة من نقط المستوى

ك وكذلك المستقيم ت اثرا اقليدس المستوي آخر مساعد لقطع هذا
المستوى المستويين المذكورين م و ك في مستقيمين مسقطاهما
الافقيان ب و ج وبذلك تكون النقطة م مسقطا اقليدس النقطة اخرى
من تقاطع المستويين م و ك
ويمكن من النقطة د امر ارجله قواطع اخر مهمما اريد وبادامة هذه العملية
نفسها تحصل جلة نقط م و م و م و م على مستقيم واحد
فتنتج بالسهولة دعوى نظرية جديدة متعلقة بالقواطع لافائدة في ذكرها
هنا

* (وثانيا) * ينزل من النقطة م كما في (الشكل ٩٨) هودان على
المستقيمين م و ك يقطعانها في النقطتين - و ج ثم يوصل ما بين
هاتين النقطتين - و ج ويمد الخط - ج موازيا للخط - ج ثم يمد
كذلك من النقطتين - و ج المستقيمان م و ك الموازيان للمستقيمين
م و ك في تقاطع هذان المستقيمان في نقطة م من نقط المستقيم المطلوب
لانه لو اعتبر المستقيمان م و ك اثرين اقليدس لمستويين والنقطة م مسقطا
افقيا لنقطة من نقط تقاطعهما واعتبرا ايضا م - و م ج خطين ارضيين
لا ل الامر الى عملية المسئلة السادسة عشر من (بند ١٠١) فيكون
الخطان م و ك مسقطين لخطين اقليدس من المستويين م و ك
كائنين على ارتفاع واحد ومقاطعين في نقطة م من المسقط الافقي لتقاطع
المستويين م و ك

* (المسئلة الثامنة عشر) * اذا كان المطلوب ايجاد تقاطع المستقيم و
مع المستوى م يقال
* (اولا) * اذا امر من المستقيم و كما في (الشكل ٩٩) مستوي مساعد

س وبحث عن تقاطعه ي مع المستوى م تكون النقطة س هي
تقاطع المستقيمين ي و و هي النقطة المطلوبة
ولنختر من المستويات التي يمكن امرارها من المستقيم و سبعة يختار
استعمالها دون غيرها لكيفية اوضاع الشكل وهي
* (اولا) * المستوى المسقط افقيا للمستقيم و
* (وثانيا) * المستوى المسقط رأسيًا لذلك المستقيم
* (وثالثا) * المستوى الذي يكون فيه المستقيم و هو الخط الاعظم ميلا
بالنسبة للمستوى الرأسي
* (ورابعا) * المستوى الذي يكون فيه و هو الخط الاعظم ميلا بالنسبة
للمستوى الافقي
* (وخامسا) * المستوى المار من و الموازي لخط الارض
* (وسادسا) * المستوى الذي اثره الافقي مواز لـ
* (وسابعا) * المستوى الذي اثره الرأسي مواز لـ
وذلك لان تقاطعات هذه المستويات مع المستوى المعلوم م كلها تقطع
المستقيم و المذكور في نقطة واحدة س هي النقطة المطلوبة
ويختار من تلك المستويات المذكورة في كل حالة مخصوصة المستوى الأليق
وضعا من غيره بتلك الحالة ولا فائدة في رسمها كلها في الشكل لسهولة التمرن عليها
(وثانيا) اذا اتخذ المستوى المساعد مكن ان يتقاطع المسقطان الافقيان ي و
والمسقطان الرأسيان ي و في زاويتين حادتين جدا ومنه يعلم حيثئذان النقطتين
س و س ليستا تامتي التعيين فتكون النقطة س كذلك لكن يمكن
كما هو الاولى دائما اختيار المستوى المساعد س بحيث يتقاطع ي و
مثلا في زاوية قائمة او قريبة منها ولاجل ذلك يرسم في المستوى م مستقيما
بحيث يكون ا عمودا تقريبا على المستقيم و وهذا ممكن دائما حيث يمكن
رسم ا ثم يمر من نقطة م من المستقيم و مستقيما مواز للمستقيم ا

ويعر مستو س من المستقيمين و و أ ويبحث عن التقاطع ي
للمستويين م و س فتكون النقطة م هي تقاطع المستقيمين
ي و و هي النقطة المطلوبة ولننبه على ان المستقيمين ي و أ لا يدوران
بكونا متوازيين وبهذا تتحقق صحة العمليات

(وثالثا) يمكن حل المسئلة ايضا بتغيير المستوى او بحركة دوران لجعل المستوى
م عمودا على احد مستويي المسقط انظر (بندى ٥٥ و ٦٧) لان تقاطعه
حينئذ مع و ينسقط على هذا المستوى في تقاطع اثر المستوى مع مسقط
المستقيم كافي (ثانيا من بند ٥٦) ولناخذ حينئذ مستويا جديدا
رأسيا للمسقط عمودا على المستوى م كافي (الشكل ١٠٠) فيكون
خط الارض خ ض عمودا على ق ويشاهد ان المستقيمين ر و و
يتقاطعان في س التي منها يستخرج س ثم م اللذان هما مسقطا النقطة
المطلوبة وكان يمكن اخذ مستوي جديد افقي خ ض عمودا على المستوى م
فيكون المسقط س حينئذ هو تقاطع و و ق

* (تنبيه) * اذا اخذ خط الارض خ ض في اعلى فرخ الرسم توجد النقطة
س في اعلاه وبالعكس اى انه لو اخذ خط الارض خ ض في اسفل فرخ
الرسم لكانت النقطة س اسفله فعلى هذا لو اخذ خط الارض الجديد في اسفل
فرخ الرسم ما امكن ان تحصلت نقط تقاطع بعيدة جدا عن المستوى الافقي
ولم توجد طريقة غير هذه

ولو اردت تغيير المستوى الافقي لكان يلزم حينئذ اختيار خط الارض الجديد عمودا
على ر و كونه في اعلى فرخ الرسم ما امكن وكان يصح ايضا جعل المستوى م
عمودا على المستوى الرأسى او على المستوى الافقي بتدويره حول محور عمودا على
المستوى الرأسى او الافقى بتحريك المستقيم في كلتا الحالتين مع حركة المستوى
المذكور

(١١١)

(المسئلة التاسعة عشر) اذا كان المطلوب ايجاد تقاطع مستقيم مع مستو معلوم بمستقيم ونقطة يقال

(اولا) اذا فرض ان المستوى (م ع) معلوما بالمستقيم م والنقطة ع وان والمستقيم المعلوم كافي (الشكل ١٠١) لزم كافي (اولا من بند ١١٠) امرار مستو مساعد من المستقيم و والبحث عن تقاطعه مع المستوى م واختيار هذا المستوى مارا بالمستقيم و والنقطة ع فيئت تعلم النقطة ع من التقاطع ي ولايجاد نقطة اخرى منه يمد من النقطة ع مستقيمان م و موازيان للمستقيمين م و و كل لنظيره فيكون المستويان حينئذ معلومين بخطوط متوازية ولو امر مستو افقي مساعد آخر س لقطع المستقيمان الاربعة في النقط ي و ي و د و د التي تعين التقاطعين ا و ب للمستوى س مع المستويين (م م) و (و و) ثم يقابل التقاطعان ا و ب في نقطة م من التقاطع ي الذي يتعين تعينا تاما ثم يقابل هذا المستقيم الاخير المستقيم و في نقطة م وهي النقطة المطلوبة

(وثانيا) يمكن اخذ المستوى س موازيا للمستوى الرأسى او عمودا على احد مستويي المسقط وتحل هذه المسئلة بسهولة بان يؤخذ بدل المستوى المار بالمستقيم و المستوى المسقط له رأسيا كما يظهر ذلك في حل المسئلة الالية انظر (ثانيا من بند ١١٣)

(وثالثا) اذا كان احد المستقيمان المعلومين مثل م موازيا للمستوى الافقى يكون م موازيا لخط الارض خ ض فيكون موازيا بالضرورة الى ر و حينئذ لا تكون النقطة ي معلومة لكن لا يخفى ان المستوى الافقى س في هذه الحالة يقطع المستوى (م ع) في خط افقى او مواز للمستقيم م يصير معينا لانه يمكن ايضا ايجاد النقطة ي باخذ المستقيم م غير مواز للمستقيم م

بل مارا بالنقطة ع ونقطة اختيارية من م

* (ورابعا) * اذا اعتبر المستقيم م اثرا اقيا ن للمستوى استعمل بدل المستقيم م مستقيم رأسي او افقي من هذا المستوى فيختار المستوى س موازيا للمستوى الرأسي فاذا كان المستقيم م هو الخط الاعظم ميلا للمستوى كفي في تعيينه انظر (بند ٣٨) ولا يلزم في هذه الحالة استعمال النقطة ع ويختار بدل المستوى المار من المستقيم والمستوى الذي يكون فيه هذا المستقيم اعظم ميلا وهذا يرجع الى المسئلة المتقدمة حلها في (بند ١٠٠)

* (١١٢) *

ويمكن ايضا ايجاد تقاطع مستقيم مع مستو معلوم في حالات مخصوصة كما اذا كان الاثران متحدان في مستقيم واحد وكغير ذلك وهذه الاحوال يمكن حلها بنفس الطرق المذكورة

* (١١٣) *

* (المسئلة العشرون) * اذا كان المطلوب امرار مستقيم قاطع لمستقيين معلومين من نقطة معلومة يقال

* (اولا) * يمكن من النقطة المعلومة ومن كل من المستقيين المعلومين امرار مستو فيكون تقاطع هذين المستويين بالضرورة هو المستقيم المطلوب وبهذه الكيفية يؤول الامر الى حل المسئلة المتقدمة في (بند ١١١) الذي يلزم فيه ان تكون ع مبينة للنقطة المعلومة في (الشكل ١٠١) وان يكون م و المستقيين المعلومين و المستقيم المطلوب ولاجل صحة العملية يلزم ان يقطع مسقطا هذا المستقيم مساقط المستقيين م و و في النقطة ص و ص و ص و ص الكائن كل اثنين منها على مود واحد على خط الارض انظر (بند ٨)

* (وثانيا) * يمكن كما في (الشكل ١٠٢) حل المسئلة بامرار مستو من النقطة المفروضة م ومن احد المستقيين ا ثم يبحث عن تقاطع هذا المستوى

مع المستقيم الآخر ب ويحصل تقاطعه مع المستوى (ا م) بمرار
مستقيمين ط و ح من النقطة م ومن آخرين حينما اتفق س و ا
من المستقيم ا فيكونان في المستوى المذكور ويقابلان المستوى
الرأسي القائم من ب في نقطتين ط و ح من التقاطع ل هذين
المستويين الذي يقابل المستقيم ب في نقطة س من المستقيم و
المطلوب لان هذا المستقيم لما كان له نقطتان س و م في المستوى
(ا م) كان محصورا فيه فيقابل بالضرورة المستقيم ا
في نقطة ص

(١١٤)

(تنبيه) كان يسهل ايجاد حلول آخر لبعض المسائل المتقدمة وتوابع
معاليم بعضها وفرض مسائل اخر لكن فيما ذكرناه من طرق الحل كفاية
وساأتى بعض هذه المسائل في اثناء الكتاب

(في زوايا المستقيمت والمستويات)

(١١٥)

(المسئلة الحادية والعشرون) اذا كان المطلوب ايجاد الزاوية
الحادة بين مستقيمين يقال
الزاوية الحادة من مستقيمين هي الكمية التي بين انفراج هذين المستقيمين في حالة
امتدادهما فينتج
(اولا) انه يمكن حدوث زاوية من مستقيمين بدون ان يتقاطعا
(وثانيا) ان المستقيمين المتوازيين تكون بينهما زاوية تساوى
صفرا

(وثالثا) ان الزاوية الحادة من مستقيمين لا متقاطعين ولا متوازيين تساوى
الزاوية الحادة من مستقيمين موازيين لهذين المستقيمين المذكورين الممتدين من
نقطة واحدة وحيث فلا يبحث دائما الا عن الزاوية الحادة من مستقيمين متقاطعين

فان لم يكونا كذلك تختار نقطة حيثما اتفق ويمد منها مستقيمان آخران موازيان للمستقيمين المذكورين انظر (بند ٢٤) ثم يبحث عن الزاوية الحادثة من هذين الاخرين فيقال اذا كان هذان المستقيمان α و β كما في (الشكل ١٠٣) متقاطعين في نقطة m عيناً مستويان k اثره الافقي q ثم يطبق هذا المستوى k على المستوى الافقي كما في (بند ٧٦) بان يختار اختصارا المستوى الجديد الرأسى ماراً بالنقطة m فينطبق المستقيمان α و β على α' و β' وتكون am - هي الزاوية المطلوبة وكان يمكن البحث عن الضلعين α' و β' بان يطبق المستويان المسقطان افقياً للمستقيمين α و β على المستوى الافقي ثم يرسم للمثلث am - المعلوم منه اضلاعه الثلاثة ويلزم من ذلك ان تكون النقطتان m و m' على مستقيم عمود على الاثر q وكان يمكن ايضا جعل المستوى k افقياً اورأسياً بواسطة احدى الطرق الاربع المقررة في (بند ٧٦) ويسهل تركيب اشكال هذه العمليات بمقتضى ما تقدم

ولا يتنبه الى ان المستقيم $om' = om$ وتر مثلث قائم الزاوية فيه om ضلع الزاوية القائمة فيكون $om' < om$ وحينئذ تكون الزاوية $am' -$ التي هي زاوية المستقيمين اصغر من الزاوية $am -$ التي هي زاوية مسقطيهما

* (المسئلة الثانية والعشرون) * اذا كان المطلوب ايجاد القاسم للزاوية الحادثة من مستقيمين الى قسمين متساويين يقال يمكن حل هذه المسئلة بالبحث اولا عن الزاوية الحادثة من هذين المستقيمين انظر (بند ١١٥) ثم قسمة زاوية المستقيمين α و β الى قسمين متساويين كما في (الشكل ١٠٣) وحينئذ يقابل القاسم الاثر q في نقطة هي بالضرورة الاثر الافقي للقاسم المطلوب وحيث ان هذا القاسم لا بد وان يمر

بالنقطة م يتعين تعيينها تماماً وقد يمكن إيجاد هذا القاسم أيضاً بدون البحث عن إيجاد الزاوية وذلك ان يعتبر انه لو اخذ بعدان متساويان على المستقيمين أ و ب كما في (الشكل ١٠٤) بالابتداء من النقطة م لحدث مثلث متساوي الساقين فيكون المستقيم الواصل من النقطة م الى وسط قاعدة المثلث هو القاسم المطلوب

فلاجل حل المسئلة بهذه الكيفية يدور المستقيمان المعلومان أ و ب كل واحد على حده حول محور رأسي مار بنقطة تقاطعهما م الى ان يصل الى الوضعين أ و ب اللذين يصيران فيهما موازيين للمستوى الرأسى للمسقط انظر (بند ٦١) ثم يرسم من المركز م بنصف قطر حيثما اتفق قوس دائرة يقطع أ و ب في ه و د ويرجع النقطتين ه و د في النقطتين ه و د على المستقيمين أ و ب بحركات دوران عكس الاولى حول نفس المحور المذكور يكون المستقيم ه المار من النقطة ه الى النقطة د ضرورة قاعدة للمثلث المتساوي الساقين فينسط وسطه ه في الوسيطين ه و د للمستقيمين ه و ه فيكون المستقيم ه الواصل بين النقطتين م و ه هو القاسم المطلوب

ومن المهم ان يلتفت الى ان حركتي المستقيمين المعلومين أ و ب لاتعلق لاحديهما بالآخرى والا فلا يكون هذان المستقيمان موازيين للمستوى الرأسى وانما احتيج لجعله ما في هذا الوضع لا مكان ان يؤخذ على احدهما طول م ه مساو لطول م د المأخوذ على الآخر

فاذا خرج النقطتان أ و ب معا او احدهما عن حدود الرسم اخذ مستواقي مساعد يقطع المستقيمين أ و ب في نقطتين ع و ك بشرط ان يكون النقطتان ع و ك في حدود الرسم فانهما في هذا الوضع يستعملان أيضاً لإيجاد أ و ب ثم يكمل باقي العملية

تنبيه هذه العمليات تؤدي الى عدة تحقیقات

* (المسئلة الثالثة والعشرون) * اذا كان المطلوب ايجاد الزاويتين الحادثتين

من مستقيم مع مستويي المسقط يقال

الزاوية الحادثة من مستقيم مع مستوي كافي (الشكل ١٠٥) هي الزاوية الحادثة من المستقيم المذكور مع مسقطه على المستوى فعلى هذاتكون الزاويتان المطلوبتان هما الزاويتان الحادثتان من المستقيم المفروض و مع مسقطيه

و و فيلزم حينئذ جعل المستويين المسقطين للمستقيم و منطبقين على احد مستويي المسقط او موازيين له ولاجل ذلك يمكن جعل هذين المستويين من اول وهلة مستويين جديدين للمسقط فتوجد الزاوية

ا - ا' = ا الحادثة من المستقيم و مع المستوى الافقي والزاوية

ا - ا' = ا الحادثة عنه مع المستوى الرأسى ويمكن ايضا تدوير هذين

المستويين حول اثريهما ا' او ا الى ان ينطبقا فتوجد ايضا الزاويتان

ا - ا' = ا و ا - ا' = ا فاذا لم يكن اثرا للمستقيم و

في حدود الرسم اخذت نقطتان حيثما اتفق كنقطتي م و ك كافي (الشكل ١٠٦)

فيوجد بتغيير المستويين الزاويتان م ك ط = ا و ل م ك = ا

ويصح ايضا ان ينزل من النقطتين م و ك عمودان احدهما على المستوى

الافقي والاخر على المستوى الرأسى ويدور حولهما المستويان (و و)

و (و و) الى ان يصيراموازيين للمستوى الرأسى او للمستوى الافقي

فتحدث الزاويتان م ك ط = ا و ل م ك = ا

إذا حدث من مستقيم مع مستويي المسقط زاويتان متساويتان حدث أيضاً من
مسقطيه مع خط الأرض زاويتان متساويتان وكان اثره على بعد واحد من خط

الأرض $\chi \psi$ وبيان ذلك أولاً ان المثلثين $\alpha - \beta$ و $\alpha - \beta$ كافي
(الشكل ١٠٥) متساويان لان وتر واحد هما مساو لوتر الاخر وفيهما زاويتين

حادتين متساويتين فينتز $\alpha = \beta$ و $\beta = \gamma$ و $\gamma = \delta$

$\alpha = \beta$ فيكون بالضرورة المثلثان $\alpha - \beta$ و $\beta - \gamma$ متساويين

فينتج ان الزاوية $\alpha - \beta = \beta - \gamma$

وإذا قابل المستقيم خط الأرض فالبرهان بعينه ولو كان مسقطاه في جهة واحدة
من $\chi \psi$ لا تطبقا انظر (ثامناً من بند ١٧)

* (وثانياً) ان يقال ان هذه الحالة المخصوصة واضحة لان اي نقطة من
المستقيم و تكون على بعد واحد من مستويي المسقط فينتج من ذلك تساوي
المثلثين المناظرين للمثلثين المتقدمين فينتز يمكن دائماً الرجوع الى هذه
الحالة بان يؤخذ مثلاً مستوي جديد رأسي موازياً للمستوى القديم ومارباً بالاثـر
الافقي للمستقيم فيقابل هذا المستقيم خط الأرض وحينئذ يحدث

عنه مع مستويي المسقط زاويتان متساويتان فينتز α و β يصنعان
مع خط الأرض $\chi \psi$ زاوية واحدة وحيث كان α موازياً β
و $\chi \psi$ موازياً $\chi \psi$ يحدث من α و β مع خط الأرض $\chi \psi$
زاوية واحدة

* (تنبيه) α و β يكونان متوازيين اذا لم يتخذ المستقيم و
في الزاوية $\chi \psi$ فاذا نفذ و فيها كانا غير متوازيين بالنسبة لخط
الأرض $\chi \psi$

* (١١٩) *

* (المسئلة الرابعة والعشرون) * اذا كان المطلوب ايجاد الزاوية الحادثة من مستقيم مع مستوي يقال

* (اولا) * حيث كانت هذه الزاوية هي الحادثة عن المستقيم المعلوم مع مسقطه على المستوى المعلوم ينبغي حل المسئلة التي حلت بالنسبة للنقطة في (بند ٤٨) بالنسبة للمستقيم المعلوم وبهذا يتوصل الى البحث عن الزاوية الحادثة من مستقيمين انظر (بند ١١٥) وليتنبه الى ان هذه الطريقة ترجع الى جعل المستوى م افقيا او رأسي ويكون ذلك بالطرق الاربع المقررة في (بند ٧٦) مع فرض المستقيم و مرتبها بالمستوى المذكور بحيث يمكن ايجاد مسقطيه على كل مستوي جديد منتخب للمسقط وفرضه ايضا تابعا للمستوى المذكور في حركات دورانه اذا حرك ورأسها مع هذا المستوى دائما زاوية واحدة فحينئذ يؤول الامر الى البحث عن الزاوية الحادثة من مستقيم مع احد مستويي المسقط انظر (بند ١١٧) وقد يسهل تتبع جميع الاعمال على (الشكل ١٠٧)

* (وثانيا) * انه يمكن حل هذه المسئلة ايضا بطريقة اخرى وذلك ان تؤخذ نقطة ما م على المستقيم و ومنها ينزل عمود ن على المستوى م كما في (بند ٨٢) فتكون زاوية المستقيمين و ن هي تمام الزاوية الحادثة من المستقيم و مع المستوى م فيؤول الامر الى البحث عن الزاوية الحادثة من هذين المستقيمين كما في (بند ١١٥) وبعد ايجادها يؤخذ تمامها وهي الزاوية المطلوبة

* (١٢٠) *

* (المسئلة الخامسة والعشرون) * اذا كان المطلوب ايجاد زاويتين حادتين من مستوي مع مستويي المسقط يقال

الزاوية الحادثة من مستويين كما في (الشكل ١٠٨) مقاسة بالزاوية الواقعة بين عمودين قائمين على خط تقاطع المستويين من نقطة واحدة منه

وكل منهما على مستوي فينتج انه اذا كان المستوى المعلوم عمودا على المستوى
الرأسي تكون الزاوية الحادثة منه مع المستوى الافقي مقيسة بزاوية
اثره الرأسى مع خط الارض وكذلك اذا كان المستوى المعلوم عمودا على المستوى
الافقى تكون الزاوية الحادثة منه مع المستوى الرأسى مقيسة بالضرورة بزاوية
اثره الافقى مع خط الارض فحينئذ يكون حل المسئلة مبذيا على جعل المستوى
المعلوم عمودا على المستوى الافقى ثم الرأسى للمسقط اما بتغيير المستوى كما فى
(بند ٥٢) واما بمحركة دوران كما فى (بند ٦٤) وبهاتين الطريقتين
تعلم الزاوية الحادثة من المستوى م مع المستوى الافقى والزاوية
الحادثة منه مع المستوى الرأسى ولا فائدة فى اطالة الكلام على العمليات
لسهولة تتبعها على الشكل

(١٢١)

اذا انزلنا من A أو A' الرأسى N على R و N على Q فيفرض
رجوع المستوى الرأسى للمسقط الى وضعه العمودى على مستوى
المسقط الافقى يكون N عمودا على المحور A فيكون عمودا على
موازيه المار من النقطة R او على Q فحينئذ يكون N عمودا على
المستوى M ويكون N ايضا عمودا على المحور A فيكون عمودا على موازيه المار
من النقطة M او على R فيكون عمودا على المستوى M فاذا ارجعنا
المستويين M و M' الى وضعهما الاقتراني م انطبق العمودان N و N'
وصارا مستقيما واحدا عمودا على المستوى م فيكون $N = N'$ ومن
ذلك ينتج ان R و Q يكونان مماسين للدائرة المرسومة من المركز
 A أو A' بنصف قطر يساوى N أو N'

(١٢٢)

اذا كان المستوى المعلوم يصنع زوايا متساوية مع مستويي المسقط يكون اثره

متساوي الميل على خط الارض وبيان ذلك

* (اولا) * ان تختار نقطة ما و على خط الارض خ ض كما في
(الشكل ١٠٩) وينزل منها عمود ن على المستوى المعلوم م فيقابل
هذا العمود المستوى المذكور في نقطة - فاذا انزل من هذه النقطة عمودان
- و - على اثرى المستوى م حدث في الفراغ مثلثان
و - و - متساويان لان فيهما ضلعا مشتركا وزاويتين
متساويتين فيكون و = و والزاوية - و = - و منه
يحدث زاوية ع و = ع و انظر (بند ١١٨) فيثبت يكون المثلثان
ع و و ع و متساويين فينتج بالضرورة ان الزاوية ع و = ع و
وبحسب وقوع العمودين و و على ق و ر في جهتين
مختلفتين من خط الارض خ ض اوفي جهة واحدة منه يصنع الاثران
زاويتين متساويتين مع جزء واحد من خط الارض اومع جزئين مختلفين منه
وقد ينطبقان في الحالة الاخيرة واذا كان المستوى الموازي لخط الارض
يكون اثره موازيين ايضا خ ض وعلى بعد واحد منه بحيث انهما لو جدا
في جهة واحدة منه لانتبعا على بعضهما

* (وثانيا) * ان يقال من الواضح في صورة ما اذا كان المستوى موازيا لخط
الارض كما في (الشكل ١١٠) ان اثره لا بد وان يوجد على بعد واحد من
خ ض لانه اذا امتد في المستوى م عمود ا ب على خ ض لصار عمودا
كذلك على كل من الاثرين ق و ر فيكون حينئذ المثلث الحادث
ا و ب متساوي الساقين ومنه ينتج ا و = و ج اذا تقرر هذا يدور
المستوى م حول ا ب الى ان يقطع خط الارض في نقطة منه ع
فيكون المثلثان ا و ع و ج متساويين لان فيهما زاويتين متساويتين
محصورتين بين اضلاع متناظرة متساوية فتكون الزاوية ا ع و = ج ع و
ويحدث ايضا من المستوى م مع مستويي المسقط زاويتان متساويتان

* (المسئلة السادسة والعشرون) * اذا كان المطلوب امرار مستو صانع زاوية معلومة α مع المستوى الافقى من مستقيم معلوم يقال
اذا كان المستقيم المعلوم ω كفاى (الشكل ١١١) يلزم ان يكون اثر المستوى σ المطلوب مارين بالاثرين α و β الافقى والرأسى للمستقيم و كل بنظيره اذا تقرر هذا بعد من النقطة β محور رأسى α ويفرض ان المستوى σ دار حول هذا المحور الى ان صار عمودا على المستوى الرأسى فلا يزال اثره الرأسى α مارا بالنقطة β حتى يصنع مع β ض الزاوية α ويرجع المستوى المذكور الى وضعه المشغول به فى الفراغ ترسم النقطة γ التى هى تقاطع اثرى المستوى σ على المستوى الافقى دائرة γ لا يزال الاثر α مماسا لها فينتزعا اذا مدم من النقطة α مماس للدائرة γ كان هذا المماس هو الاثر α للمستوى ثم لا بد وان يمر α بالنقطة β ويقابل خط الارض β فى عين النقطة التى قابله فيها الاثر α
اذا كان الاثر α لا يقابل خط الارض β فى حدود الرسم امكن ايجاد نقطة اخرى من α بان تؤخذ نقطة ما على المستقيم ω ويمد منها افقى للمستوى σ
* (تنبيه) * لا يمكن حل هذه المسئلة بتغيير مستو وهذا يثبت ما قررناه فى آخر (بند ٦٩) ومع ذلك فلو كان للمستقيم المعلوم اثرا افقيا للمستوى المطلوب لا يمكن استعمال احدى الطريقتين بدون اختيار احدهما عن الاخرى لانه اولا لو اخذ محور α ايا ما كان لرجعت النقطة γ فى α ولزم رسم الاثر α صانعا مع β ض الزاوية α ومنه تعلم نقطة β من الاثر α وثانيا لو اخذ مستو رأسى عمودا على α لصنع الاثر الرأسى α مع خط الارض β ض الزاوية α ثم بتغيير المستوى الرأسى وجعل

خ ض خطا ارضيا ينتج ر

* (١٢٤) *

اذا فرض ان المستقيم و لا يقابل مستويي المسقط في حدود الرسم كما في
(الشكل ١١٢) امكن ان يتصور في المستوى المطلوب م خط اعظم ميلا
ط ماربنة نقطة ما م من المستقيم و فاذا دور حول محور رأسي أ
مازبنا نقطة م حتى وازي المستوى الرأسى صنع مسقطه الرأسى ط مع
خط الارض خ ض الزاوية ا ووجد اثره الافقى في ا و بر جوعه الى
وضعه الاول يرسم هذا الاثر الدائرة ج وترسم نقطة اخرى د مأخوذة
حينما اتفق على ط دائرة ج كائنة في مستوا فى س قاطع للمستقيم و في
نقطة ب منها يرافق ب من المستوى المطلوب م مماس للدائرة ج
المذكورة لان هذا الافقى لا بد وان يمر بالنقطة د التى هى نهاية نصف قطر الدائرة
ج وان يكون عمودا على الخط الاعظم ميلا ط انظر (بند ٣٧) فيشذ
يكون في مماسا للدائرة ج وموازيا ب وقد يتحصل لنا نقطتان
س و س من الاثر الرأسى ر بواسطة اقيين م و ر للمستوى
م مارين بنقطتين حينما اتفق م و ر من المستقيم و

* (١٢٥) *

* (المسألة السابعة والعشرون) * اذا كان المطلوب ايجاد مستوي ما من نقطة
معلومة وصانع مع المستوى الافقى زاوية ا ومع المستوى الرأسى زاوية ب
يقال

يؤخذ كما في (الشكل ١٠٨) محورا ا على المستوى الرأسى
ويدور المستوى المطلوب م حول هذا المحور حتى يصير عمودا على المستوى
الرأسى فيصنع اثره الرأسى ر مع خط الارض الزاوية ا ثم يمد هذا الاثر
من نقطة ما من خ ض فيتحصل منه نقطة ب من الاثر ر واذا فرض

محور آخر α في المستوى الافقي ودور المستوى μ حول المحور المذكور
 α حتى صار رأسيا فلا بد وان يحدث من الاثر α مع χ زاوية
 - ومع ذلك فلو انزل من النقطة α أو α' عمودان على الاثرين α و α'
 لكانا متساويين انظر (بند ١٢١) فينتد يكون الاثر α مماسا
 للدائرة المرسومة من المركز α بنصف القطر α ثم يقابل الاثر α المحور
 α في النقطة α من الاثر الافقي α فلو ارجع الآن المستوى μ الى
 وضعه الاصلي رسمت النقطة α التي هي تقاطع اثريه دائرة حول المركز α
 وحينئذ يد من النقطة α مماس لهذه الدائرة يكون هو الاثر المطلوب α
 ومنه يتحصل α الذي لا بد وان يمر بالنقطة - ولو ارجع ايضا
 المستوى μ الى الوضع μ لرسمت النقطة α التي هي تقاطع اثريه قوس
 دائرة يجب ان يكون الاثر α مماسا له وبهذه الكيفية يتحصل معنا مستوي
 يصنع مع مستوي المقسط الافقي والرأسي زاويتين α و α' فلم يبق
 علينا في حل هذه المسئلة التي نحن بصدد حلها الا امرار مستوي مواز للمستوي μ
 من النقطة المعلومة انظر (بند ٣٨)

(المسئلة الثامنة والعشرون) اذا كان المطلوب ايجاد الاثرين الرأسيين
 لمستويين معلوم اثراهما الاققيان والزاويتان الحادثتان منهما مع المستوى
 الافقي يقال

ليكن α و α' الاثرين الاققيين المعلومين كما في (الشكل ٩٣) فاذا اخذنا مستوي
 رأسي عمودا على المستوى μ لزم ان يصنع الاثر الرأسى α مع خط الارض
 χ زاوية α واذا اخذنا مستوي آخر رأسي عمودا على المستوى
 α حدث من الاثر الرأسى α مع χ زاوية α' فلم يبق علينا

الانسيبة المستويين المعلومين م و ك الى مستوي واحد رأسي قاطع للافتق
 في خض وحيث كان الاثران الاققيان ق و ك لا يتغيران يمكن ايجاد
 الاثرين الرأسين م و ك بواسطة استعمال افق مأخوذ على ككل من
 المستويين المذكورين انظر (بند ٤٧)

(المسئلة التاسعة والعشرون) اذا كان المطلوب ايجاد الزاوية الواقعة بين
 مستويين يقال

يمكن حل هذه المسئلة بطرق مختلفة تبين بعضها فيقول

(اولا) قد علمت كيفية ايجاد الزاوية الحادثة من مستويين مستويين المسقط من
 (بند ١٢٠) فعلى هذا يمكن ان يؤول الامر الى هذه المسئلة بجعل احد المستويين
 المعلومين مستويا جديدا للمسقط او بتطبيقه على احد المستويين الاصليين
 وتحصيل ذلك يكون باستعمال احدى الطرق الاربع المعلومه في (بند ٧٦)
 ولم ابرهن هذا الحل هنا لاجل التمرن عليه مع كونه قد تقدم في هذا الكتاب عدة
 عمليات مثل هذه

(وثانيا) اذا كان المستويان المعلومان عمودين على احد مستويي المسقط
 فلا بد وان يحدث من اثريهما على المستوي المذكور زاوية مساوية للزاوية
 الحادثة من المستويين فحينئذ يكون تقاطع المستويين في هذه الصورة عمودا
 على مستويي المسقط ويكفي لجعل الشكل في هذا الوضع المخصوص جعل تقاطع
 المستويين عمودا على احد مستويي المسقط ويلزم لذلك تغييرا مستويين كما في
 (بند ٥١) او حركا دوران كما في (بند ٦٣) او تغيير مستويين حركة دوران
 او حركة دوران ثم تغيير مستويين في كل حالة يلزم اولا معرفة تقاطع المستويين
 وقد عرفت كيفية ايجاده فيما تقدم اذا تقر هذا يقال اذا اريد اولا استعمال تغيير
 مستويين كما في (الشكل ١١٣) فليكن م و ك المستويين
 المعلومين باثارهما الاققيان ق و ك والرأسين م و ك

و γ تقاطعهما المعلوم بمسقطيه γ و γ ولجعل هذا التقاطع عمودا على
المستوى الافقى يؤخذ اولاً بديل المستوى الرأسى للمسقط الموازى للتقاطع γ
المستوى المسقط افقياً بهذا المستقيم بحيث يكون خط الارض γ من عين المسقط
 γ للتقاطع ولو بحث عن مسقط التقاطع γ على هذا المستوى الجديد لكان
المسقط هو التقاطع بعينه ودل ايضا على γ ثم يؤخذ مستواً افقياً عموداً على
المستقيم γ فيصير بالضرورة γ عموداً على γ ويكون مسقط المستقيم γ
على هذا المستوى الجديد نقطة γ من خط الارض الجديد مشتركة بين الاثرين
الجديدين γ و γ ويلزم ايجاد نقطة اخرى من γ كل من هذين الاثرين
فيستعمل لذلك رأسى γ من المستوى γ اثره الافقى γ على المستوى
القديم γ على بعد γ من خط الارض هذا وحينئذ يكون اثره على
المستوى الجديد الافقى γ على بعد واحد بالضرورة من هذا الخط
الارضى ايضا فيكون ذلك الاثر في النقطة γ المنتسبة الى γ انظر
(بند ٢٨) ولو استعمل ايضا رأسى γ من المستوى γ لتحصل منه
نقطة γ من الاثر γ ثم ان الزاوية γ الحادثة من الاثرين الافقيين
 γ و γ هي الزاوية المطلوبة الحادثة من المستويين γ و γ
(ثالثاً) * يمكن ابدال احد تغيرى المستويين بحركة دوران فيبدل التغير
لثانيهما (الشكل ١١٤) ويلزم في هذه الحالة بعد ايجاد المستقيم γ
لذى ينطبق على الاثرين γ و γ تدوير جملة الشكل حول محور γ
عموداً على المستوى الرأسى الى ان يصير γ رأسياً فلو فرض رأسى γ
من المستوى γ ورأسى γ من المستوى γ لبقيا دائماً في مدة الدوران
على بعد واحد من المستوى الرأسى وبقي ايضا مسقطاهما الرأسيان على بعد واحد
من المستقيم γ انظر (ثالثاً من بند ٥٦) وليؤخذ في هذا الشكل

المحور $ا$ مارا بالاثـر $م$ للرأسي $م$ فننتسب حينئذ هذه النقطة دائما
الى الاثر الافقي للمستوى $م$ وبانزال $ا$ صه عمودا على $ي$ تشغل
النقطة $صه$ الوضع $صه$ وتكون ايضا المسقط $ي$ وبالوصل بين $ي$ و $م$
يتحصل الاثر $ق$ ويصير ايضا للرأسي $ط$ في $ط$ فيعين النقطة $ط$ أو $سه$
من الاثر $ق$ الذي لابد وان يمر ايضا بالنقطة $ي$ أو $صه$

حينئذ تكون الزاوية الحادثة من المستقيمين $ق$ و $ق$ مساوية للزاوية المطلوبة
الحادثة من المستويين $م$ و $ك$

(ورابعا) يمكن عكس ما تقدم اى ابدال التغيير الاول للمستوى بحركة
دوران ولسهولة تركيب الشكل على مقتضى هذه الحالة لم يرسم هنا

(وخامسا) يمكن حل المسئلة بحركتي دوران كما في (الشكل ١١٥)
فبواسطة حركة دوران اولى حول محور رأسي $ا$ يختار مارا بالاثـر للرأسي
للتقاطع $ي$ للمستويين $م$ و $ك$ يجعل هذا التقاطع موازيا

للمستوى الرأسي فينتقل $ي$ في $ي$ على $خ$ راسما زاوية
 $ا ا = ف$ حينئذ يجب ان ترسم جميع نقط المستويين $م$ و $ك$

زوايا مساوية للزاوية $ف$ المذكورة وان يتحد الاثران $ر$ و $د$ مع $ي$
المعين بالنقطتين $ا$ و $ر$ وان يمر الاثران $ق$ و $ق$ بالنقطة $ا$ ويمكن

لاجل ايجاد نقطة اخرى انزال العمودين $اع$ و $اك$ على الاثرين
 $ق$ و $ق$ ثم يبحث عن الوضعين الجديدين للنقطتين $ع$ و $ك$ فتوجد

النقطة $ك$ بأخذ قوس $ك$ مساو لقوس من محيطه و $و$ محصورا
في الزاوية $ف$ فيتحصل الاثر $ق$ واما النقطة $ع$ فيث كانت في هذا

الشكل قريبة جدا من النقطة $ا$ يكون نصف القطرين $ا ا$ و $اع$

منساويين تقريرا فيعسر حينئذ تعيين الوضع الجديد للنقطة ϵ ولكن يجعل α
 مركزا واخذ نصف قطر حيثما اتفق اكبر من α ϵ يرسم قوس دائرة ج
 يقطع α في النقطة ϵ و γ في النقطة ϵ فيتعين وضع النقطة ϵ
 بعد الدوران باخذ $\epsilon = \epsilon$ ويلزم ان يمر الاثر α بالنقطتين
 α و ϵ

ثم ندور الآن جملة الشكل حول محور ب عمود على المستوى الرأسى حتى
 يصير التقاطع γ رأسيا وقد يختصر تركيب الشكل بمد هذا المحور من النقطة
 α فيصير المستقيم γ في الوضع γ رأسيا زاوية β يجب ان ترسمها
 جميع اجزاء المستويين α و ϵ ويتحد الاثران الرأسيان α و ϵ مع
 γ ولايجاد الاثرين الافقيين α و ϵ يستعمل رأسى اكل من المستويين
 وليكن α الرأسى المأخوذ في المستوى α و ϵ الرأسى المأخوذ
 في المستوى ϵ ويجعل ب مركزا واخذ نصف قطر حيثما اتفق ترسم
 دائرة ج تقطع α في النقطة α و ϵ في ϵ وبواسطة المسقطين
 الافقيين α و ϵ للنقطتين α و ϵ المفروضة اثرا افقيا للمستقيم α
 ثم اخذ α و ϵ $\alpha = \epsilon$ $\alpha = \epsilon$ المسقطان الرأسيان
 الجديدان يحدث α و ϵ للنقطتين α و ϵ ويتحصل من ذلك ايضا
 مسقطاهما الافقيان α و ϵ وهما ايضا المسقطان α و ϵ للرأسى
 المستويين ولم نرسم هذين المسقطين الاخيرين على الشكل لعدم تعقده ولعدم
 الاحتياج لذلك وحيث كان المستويان α و ϵ الآن رأسيين لازم
 ان يمر اثرهما الافقيان α و ϵ على التوالي بالنقطتين α و ϵ وان
 يمر ايضا بالنقطة α وحينئذ يتم تعيينهما فيحدث من الاثرين α و ϵ

زاوية α بها تقاس الزاوية المطلوبة الحادثة من المستويين m و k
 * (سادسا) * ان الزاوية الحادثة من مستويين تقاس بالزاوية الواقعة بين عمودين
 قائمين على خط تقاطع المستويين من نقطة واحدة منه كل منهما
 في مستوي يكونان في مستوي s عمود على y كما في (الشكل ١١٦)
 وحيث كان هذا المستوى اختياري يمد الاثر q عمودا على y
 من نقطة مامنه فيقطع الاثرين q و q' في النقطتين s و s'
 اللتين هما اثرا المستقيمين اللذين زاويتهم عين زاوية المستويين m و k
 ولاجل تطبيق الطريقة المعتادة المتقدمة في (بند ١١٥) على
 هذه الحالة يؤخذ y خطا ارضيا xz ويبحث عن المستقيم y
 على هذا المستوى الرأسى ومن حيث ان r لابد وان يكون عمودا على y
 يتحصل لنا النقطة s' وهى رأس الزاوية المطلوبة α فاذا طبقت على
 النقطة s' كانت الزاوية المطلوبة هي $s-s'$ وبدل ايجاد الرأس s'
 بتغيير مستوي يمكن ايجادها بحركة دوران بان يدور الرأس xz
 حول اثره الرأسى s لينطبق فتنتقل النقطة α الى α' والنقطة
 و الى q' والتقاطع y الى y' والعمود qs الى qs' ثم يؤخذ
 $q' = qs'$ و $s' = s$ فتوجد النقطة s' ومنه تنتج
 الزاوية $s-s'$

* (تنبيه) * طريقتنا هذه عين التي استعملها مؤلفوا كتب الهندسة
 الوصفية ولا فرق بين ما في شئ بل ربما علم بمقابلتها ان الطريقة التي استعملناها
 توصلها وتسهل معرفتها

وقد يستحسن التنبيه على ان $s' = qs' = qs'$ ضلع من
 الزاوية القائمة في مثلث قائم الزاوية s' او s' وتره $qs' = qs'$
 وينتج منه ان الرأس s' لابد ان تكون دائما بين q و α فتكون

الزاوية $\text{س س ص} < \text{س ا ص}$

* (وسابعا) * يشاهد من الطريقة المتقدمة ان الزاوية المطلوبة معلومة بالمثلث س س ص المعلوم منه الضلع س ص ويمكن البحث عن الضلعين الآخرين بتطبيق المستويين م و ك وإيجاد التقاطع ي على هذين التطبيقين وانزال عمودين على هذا التقاطع من النقطتين س و ص فيتوصل الى رسم مثلث معلومة منه اضلاعه الثلاثة ويجب التفطن الى ان القوسين المرسومين من النقطتين س و ص يجعل الضلعين الموجودين من المثلث نصفي قطر لا بد وان يتقاطعا في نقطة من المسقط ي وسنتهز فرصة تقيم هذه العملية في حل مسألة اخرى

* (وثامنا) * اذا تقاطع مستويان يصنعان اربع زوايا اثنتان حادتان متساويتان واثنتان منفرجتان متساويتان والزاوية الحادة هي المسماة بزاوية المستويين مالم تعين الجهة التي تكون فيها هذه الزاوية محسوبة فعلى هذا اذا انزل من نقطة اختيارية عمودان على المستويين صنعنا ايضا زاويتين حادتين وزاويتين منفرجتين كلاهما مساو لمجانسه من الزوايا الاربع الواقعة بين مستويين فيمكن حينئذ إيجاد زاوية المستويين بان ينزل عمودان من نقطة واحدة على كلا المستويين المفروضين كما في (بند ٨٢) ثم يبحث عن الزاوية الواقعة بين هذين العمودين كما في (بند ١١٥) وعلى اي حال فلوانزل من نقطة مأخوذة داخل زاوية زوجية عمودان على وجهي هذه الزاوية لحدث بينهما زاوية متممة للزاوية الزوجية

ولا تحتاج هذه الطريقة الاخيرة الى معرفة تقاطع المستويين الذي لا تنكر فائدته في بعض الاحوال لانه ربما كان هذا التعيين مقتضيا لعمليات مشككة جدا كما حصل ذلك في بعض الاحوال

* (المسئلة الثلاثون) * اذا كان المطلوب قسمة الزاوية الواقعة بين مستويين الى قسمين متساويين يقال

* (اولا) * اذا فرض وجود المستوى القاسم كافي (الشكل ١١٦)
 كان مقطوعا بالمستوى S في مستقيم $س هـ$ عمود على التقاطع $ي$
 في النقطة $س هـ$ وكان اثره الافقي على $ق$ وقاسمه الزاوية $ا$ أو
 $س هـ$ الى قسمين متساويين فينتج من ذلك انه يلزم بعد ايجاد الزاوية
 المنطبقة $س هـ$ كافي (سادسا من بند ١٢٧) قسمتها الى قسمين
 متساويين بمستقيم قاطع للاثر $ق$ في نقطة $ن$ يجب ان يمر بها وبالنقطة
 $ا$ الاثر الافقي للمستوى المطلوب S وان يمر بالنقطة $ب$ اثره
 الرأسى

* (وثانيا) * اذا انطبق المستويان $م$ و $ك$ على المستوى الافقي كافي
 (الشكل ١١٧) باستعمال الطريقة الثانية المعلومة في (بند ٧٦)
 انتقل تقاطعهما $ي$ في $ق$ ثم في $ق$ فاذا فرض في كل من المستويين
 $م$ و $ك$ مستقيم على بعد واحد من التقاطع $ي$ صار المستقيم $ا$
 الكائن في المستوى $م$ في $ا$ الموازي $ق$ بعد انطباق هذا المستوى وصار
 ايضا المستقيم $ب$ في $ب$ الموازي $ق$ بعد انطباق المستوى $ك$ المشتمل
 على $ب$ وقطع المستقيمان $ا$ و $ب$ على التوالي الاثرين $ق$ و $ك$
 في نقطتين $س هـ$ و $ص هـ$ فينتد يكون $س هـ$ الاثر الافقي للمستوى
 (ا ب) واذا قسم $س هـ$ الى قسمين متساويين في نقطة $ن$ لا تنسب
 هذه النقطة والنقطة $ا$ الى الاثر الافقي $ق$ للمستوى القاسم S المشتمل
 زيادة عن ذلك على خط مواز لخط التقاطع $ي$ ومار بالنقطة $ن$ ولهذا الحل
 كما هو ظاهر شدة مناسبة للحل الذي ذكر في (بند ١١٦) لاجل ايجاد قاسم
 زاوية المستقيمين الى قسمين متساويين بدون البحث عنها وذلك ان النقطة $هـ$
 والنقطة $د$ الكائنتين على المستقيمين على بعد واحد من نقطة تقاطعهما $م$
 في حل (بند ١١٦) مبدلتان هنا بالمستقيمين $ا$ و $ب$ الكائنتين
 في المستويين على بعد واحد من تقاطعهما $ي$ وان النقطة $د$ التي هي

(١٠٩)

في النقطة $س$ فاذا رسمت دائرة بجعل النقطة $و$ مركزا وجعل
 $وس$ نصف قطروا من النقطة $ا$ مماس $ي$ لهذه الدائرة واقم عمود
 $س$ على $ي$ واخذ $س = س$ فحصلت النقطة $س$ وهي
نقطة تقابل الاثرين $ر$ و $ك$ ومن البين ان الزاوية $س$ لا يلزم ان تكون
اصغر من $س$ ا $ص$ فاذا كانت مساوية لهما كان المستويان رأسيين ويشاهد
ان لهذه المسئلة ايضا حلان من حيث انه يمكن مد خطين من النقطة $ا$ مماسين
للدائرة المذكورة

(١٣٠)

(المسئلة الثانية والثلاثون) اذا كان المطلوب امرار مستو $ك$ من
مستقيم $ي$ كائن على مستو معلوم $م$ يصنع مع المستوي $م$ زاوية $ا$
يقال

يد $ق$ عمودا على $ي$ كما في (الشكل ١١٦) ويعين التقاطع $ي$
على المستوي الرأسي $خ$ وينزل عمود $وس$ على $ي$ ويجعل
 $وس = وس$ ويرسم $س$ ثم $ص$ صانعا مع $س$
الزاوية $ا$ وتنسب النقطة $ص$ الى الاثر $ق$ الذي يجب ان يمر ايضا بالنقطة $ا$
ثم يد الاثر $ر$ من النقطة $ك$ الى النقطة $س$ ولهذه المسئلة ايضا حلان
فانه يمكن رسم $ص$ من كل من جهتي $س$

(في اقصر الابعاد)

(١٣١)

(المسئلة الثالثة والثلاثون) اذا كان المطلوب ايجاد اقصر بعد من نقطة
الى اخرى يقال

هذا البعد مقيس بمستقيم هاتين النقطتين وبهذا يتوصل الى ايجاد
الطول الحقيقي بلزء مستقيم محصور بين نقطتين معينين وحيث قد

يكون اولا المسقط الرأسى مساويا للمستقيم الفراغى اذا كان هذا المستقيم موازيا للمستوى الرأسى انظر (اولا من بند ٥٦) ولذلك يؤخذ مستو جديد رأسى موازيا للمستقيم وليختار المستوى المسقط له اقليلا ما فيه من السهولة والاختصار فيئتذلا يكون خط الارض خض كما فى (الشكل ١٠٦)

سوى المسقط الافقى و للمستقيم و فاذا انزل على هذا الخط عودان $م = م$ $و = و$ $ع = ع$ ووصل بين $م$ و $و$ يحدث لنا المستقيم و المطلوب واذا مدم من النقطة و خط ط موازيا للمسقط الافقى و حدث مثلث قائم الزاوية $م$ $ط$ ضلعه ط يساوى المسقط الافقى $م$ $و$ $ط$ يساوى فاضل ارتفاع النقطتين $م$ و $و$ عن المستوى الافقى او يساوى $م$ — $ع$ انظر (اولا من بند ٥) ووتر المثلث المذكور هو مقدار طول المستقيم المطلوب ومن هنا ينتج رسم المستقيم المطلوب بسهولة

* (وثانيا) * قد يكون المستقيم و معلوما بمسقطه الافقى اذا كان موازيا للمستوى الافقى فيمكن حينئذ تغيير المستوى الافقى لجعله موازيا و ليختار لاجل السهولة المستوى المسقط رأسيا لهذا المستقيم فيكون خط الارض خض متعامدا مع و ويلزم ان يؤخذ على عودين على هذا الخط $م = م$ $و = و$ $ع = ع$ وباخذ خط $م$ $ل$ موازيا و يحدث مثلث قائم الزاوية $م$ $ل$ وتره ايضا مقدار طول المستقيم و واحد ضلعي زاويته القائمة $م$ $ل$ مساو للمسقط الرأسى $م$ $و$ والاخر $ل$ مساو لفاضل بعدى النقطتين $م$ و $و$ عن المستوى الرأسى يعنى مساو $ع$ — $و$ انظر (ثانيا من بند ٥)

* (وثالثا) * يمكن بدل جعل المستقيم و موازيا للمستوى الرأسى بتغيير

المستوى الرأسى تدوير المستقيم حول محور رأسى الى ان يصل الى هذا الوضع كما فى (بند ٦١) وليختار بسهولة المحور مارا باحدى النقطتين المعلومتين م فيصير المستقيم حينئذ فى الوضع و ويعلم مقدار طول الحقيقى بالمسقط و

(ورابعا) يمكن جعل المستقيم موازيا للمستوى الافقى بتدويره حول محور أ عمود على المستوى الرأسى وليختار مارا بالنقطة د وحينئذ يصير المستقيم و المذكور فى الوضع و ويعلم مقدار طول الحقيقى بمسقطه الافقى و

وباستعمال الطرق الاربع المذكورة على نفس هذا الشكل يلزم ان يكون

$$م = م = م = م$$

(المسئلة الرابعة والثلاثون) اذا كان المطلوب ايجاد البعد بين اترى مستقيم يقال

هذه المسئلة لا فرق بينها وبين المتقدمة ويكفى فى حلها اخذ النقطتين ا و ب بدل النقطتين م و د المأخوذتين اختيارا فى المسئلة المتقدمة وحينئذ فيحل باستعمال نفس الطرق التى حلت بها المسئلة المتقدمة فيقال

(اولا) اذا اخذ المسقط و كما فى (الشكل ١٠٥) خطا ارضيا جديدا يوجد المستقيم و على هذا المستوى الجديد الرأسى وتنسب النقطة ا حينئذ الى هذا المستقيم

(وثانيا) اذا ابدل المستوى الافقى واخذ و خطا ارضيا جديدا يوجد المستقيم و

(وثالثا) اذا دؤر المستقيم و حول المحور ا يصير فى الوضع و

* (ورابعا) * اذا دُور المستقيم المذكور حول المحور α يصير في الوضع ω فينتج بالضرورة

$$a = a' = a'' = a'''$$

وكل من هذه الخطوط الاربعة يدل على طول المستقيم ω

* (المسئلة الخامسة والثلاثون) * اذا كان المطلوب مد مستقيم معلوم الطول من نقطة m كائنة على مستوي معلوم m الى الاثر الافقي لهذا المستوى يقال

اذا علم المسقط الافقي m للنقطة المفروضة كفاي (الشكل ١١٨) يستنتج منه مسقطها الرأسى m' انظر (بند ٢٩) بان يد من هذه النقطة افقي p من المستوى m ثم يفرض اولا المستقيم ω في وضعه الاصلى ويدور حول محور رأسى α حتى يوازي المستوى الرأسى فينسلط على هذا المستوى في طوله الحقيقي l انظر (اولا من بند ٥٦) ويبقى مسقطه الافقي في رجوعه دائما على طول واحد يجب ان ينتهى بالاثري q فتكون النقطة a التي يقابل فيها ذلك الاثري q الدائرة j نقطتين المستقيم فيتعين وضعه حينئذ تعين اتماما ويوجد حل آخر في b ولومست الدائرة j الاثري q لم يكن للمسئلة الاحل واحد ولو كان المستقيم α اقصر من العمود النازل من α على q لم يكن للمسئلة حل اصلا

* (وثانيا) * قد يتفق كفاي (الشكل ١١٩) ان المستقيم l المار من

النقطة m لا يقابل خط الارض bx الا خارج حدود الرسم ولننبه في هذه الحالة على انه يمكن تقسيم المستقيم ω الى اجزاء متساوية وان يتصور امرار مستويات افقية من نقط المستقيم قاسمة جزء المحور α المحصور بين النقطة m

والمستوى الافقى للمسقط الى اجزاء متساوية عدتها كعدد اجزاء المستقيم $و$
 وقاطعة للمستوى $م$ في اقيان متساوية البعد عن بعضها ثم يقسم ارتفاع
 النقطة $م$ الى قسمين متساويين ويرسم مستواقي $س$ يقطع المستوى $م$
 في اقي $ر$ وتجري بالنسبة لهذا الافقى العملية التي اجريت بالنسبة لخط
 الارض بان يؤخذ $ل$ بالابتداء من النقطة $م$ الى المسقط الرأسي $ر$
 للاقى فيتحصل المستقيمان $و$ و $ب$ الكافيان في حل المسئلة

* (وثالثا) * يمكن حل المسئلة المذكورة بتطبيق المستوى $م$ على المستوى
 الافقى كما في (الشكل ١٢٠) او يجعل هذا المستوى احد مستويي المسقط
 وذلك باستعمال احدى الطرق الاربع المعلومه في (بند ٧٦) ولنجرى هنا
 الطريقة الثانية ورسم اشكال الثلاث الباقية سهل فنقول

ان النقطة $م$ نصير منطبقه في $م$ ويجعل هذه النقطة مركزا واخذ
 نصف قطر مساو للطول $ل$ يرسم قوس دائرة يقطع $ق$ في نقطتين
 $س$ و $ص$ بايصالهما بالنقطة $م$ يتحصل المسقطان الافقيان
 $ب$ و $و$ للمستقيمين $ب$ و $و$ الكافيين في حل المسئلة ويستنتج منهما
 المسقطان الراسيان لهذين المستقيمين انظر (بند ٢٨)

وبمثل ذلك تحل مسئلة مد مستقيم معلوم الطول من نقطة $م$ الى
 مستقيم معلوم الوضع فيكفي امر ارستو من المستقيم المعلوم والنقطة
 $م$ وتطبيق هذا المستوى وايجاد النقطة $م$ والمستقيم المعلوم عليه ثم
 رسم المستقيم المطلوب على هذا المستوى المنطبق ثم يرجع بعد ذلك الى مسقطي
 هذا المستقيم

وبمثل ذلك تحل مسئلة مد مستقيم من نقطة معلومة $م$ يصنع زاوية معلومة
 مع الاثر الافقى او مع مستقيم قامن المستوى $م$

* (المسئلة السادسة والثلاثون) * اذا كان المطلوب ايجاد اقصر بعدين نقطة

ومستقيم يقال

ان هذا البعد كناية عن العمود النازل من النقطة المذكورة على المستقيم ثم يقال
 * (اولا) * يمكن حل هذه المسئلة بامرار مستو م من المستقيم المعلوم و
 ومن النقطة المعلومه م وتطبيقه على المستوى الافقى انظر (بند ٧٦)
 ثم انزال عمود ن من النقطة م على و فيكون هو البعد المطلوب فاذا
 اريد معرفة مسقطيه ارجعت النقطة م الى تقاطع العمود ن مع
 و في الوضع م على المستقيم و بحركة دوران عكس حركة دوران
 الانطباق

* (وثانيا) * يمكن بدل تطبيق المستوى (وم) كافي (الشكل ١٢١)
 على المستوى الافقى تدويره حول احد اقطبياته حتى يصير اقطبيته يمر الافقى من
 النقطة م وحينئذ يمر ا بالنقطة م ويوازي خ ض فيقابل و
 في نقطة م ويستنتج من ذلك م ثم ا ولاجل تدوير المستوى (وم)
 حول ا معتبرا محورا يلزم اولا ان يؤخذ مستوراى خ ض عمودا على
 هذا المحور كافي (بند ٧٣) فيوجد على هذا المستوى المسقطان م و
 ومن الواضح ان النقطتين م و يتحدان مع النقطة ا التى هى المسقط
 الرأسى للمحور وان المستقيم ا ا يصير الاثر الافقى ق ثم يدور المستقيم و
 حتى يصير اقطبيا ولا يتغير موضع النقطة م مدة الدوران فحينئذ يجب ان
 يكون مسقطه الرأسى موازيا خ ض ومارا بالنقطة م ولايجاد المسقط
 الافقى يؤخذ على المستقيم و نقطة ما م ترسم مدة الدوران دائرة ج
 وتصير فى الوضع م وبايصال م الى م يتحصل و فاذا انزل الان
 من النقطة م عمود على و دل على المقدار الحقيقى للبعد الاقصر من النقطة م

الى المستقيم و فاذا اريد معرفة مسقطى هذا البعد الاقصر يقال ان العمود
 المذكور يقابل ^ن و في نقطة ^ن ومنها ينتج ^ن بواسطة مواز لخط الارض
 خ ض ثم يتحصل ^ن و بايصال مسقطى النقطة ^ن بمسقطى النقطة م
 يتحصل م ^ن و م ^ن وهما مسقطا البعد الاقصر الذي مقداره الحقيقي
 م ^ن

وليتنبه الى انه اذا اخذ على المستوى الرأسى خ ض المسقطان الرأسيان
^ر ^ر و ^ر للنقطتين ^ر و ^ر وجب لتحقيق الشكل ان يكون
^ر ^ر م ^ر = م ^ر و ^ر = ^ر

* (وثالثا) * يمكن حل هذه المسئلة ايضا بتغييرى مستويين او حركتى دوران
 ولذلك يتنبه الى انه اذا كان المستقيم و عمودا على المستوى الافقى كما فى
 (الشكل ١٢٢) كان العمود ن افقيا ومساويا بالضرورة لمسقطه الافقى
 انظر (اولا من بند ٥٦) فيلزم حينئذ جعل المستقيم المذكور فى هذا
 الوضع الخاص به ويتوصل اليه اولا باخذ مستورا رأسى موازيا و اومارابه
 ثم اخذ مستو افقى عمودا على و فيكون ن البعد المطلوب وللرجوع الى
 مسقطى المستقيم ن على المستويين الاصلين يتنبه الى ان ن لا بد وان يكون
 موازيا خ ض فيقابل المستقيم و في نقطة م مسقطها الافقى
^ن ^ن ومنه ينتج ^ن فيتحصل من ذلك ^ن و ^ن ويسهل رسم شكل
 حل هذه المسئلة بحركتى دوران او حركتى دوران وتغيير مستو

* (ورابعا) * يمكن بعد تغيير المستوى الرأسى للمسقط لجعل المستقيم و
 موازيا لهذا المستوى الجديد ان يلتفت الى ان العمود ن والمستقيم و حيث
 كانا عمودين على بعضهما فى الفراغ وكان احدهما و موازيا للمستوى الرأسى
 خ ض يلزم ان يكون مسقطاهما الرأسيان ن و و عمودين كذلك على

بعضهما فيمد حيثئذ من النقطة م عمود ن على و فيقابل المستقيم و
 في نقطة س مسقطها الاقي س على و ومسقطها الرأسى س
 على و ويوصل بين س و م وبين س و م فيتحصل المسقطان
 ن و ن للبعد الاقصر المطلوب فلم يبق علينا الا معرفة طوله الحقيقي انظر
 (بند ١٣١)

(وخامسا) حيث كان العمود النازل من النقطة م على المستقيم و
 كافي (الشكل ١٢٣) كائنا في مستو م عمود على و ومار بالنقطة
 م يمكن رسم هذا المستوى كافي (بند ٨٣) وبالبحث عن التقاطع س
 للمستقيم و مع المستوى م كافي (بند ١١٠) والوصل بين س و م
 يتحصل المستقيم المطلوب الذي يوجد مقداره الحقيقي في ن انظر
 (ثالثا من بند ١٣١)

ويمكن امر ار المستوى المساعد من النقطة م فيكون تقاطعه ن مع
 المستوى م عين المستقيم المطلوب الذي جزؤه س م هو البعد الكائن بين
 النقطة م والمستقيم و فيكون الطول الحقيقي لهذا البعد ن
 فاذا لم يكن اثر المستوى س داخل حدود الرسم يعتبر هذا المستوى
 معلوما بالمستقيمين و و فيبحث عن تقاطعه مع المستوى م
 انظر (بند ١١١)

(المسئلة السابعة والثلاثون) اذا كان المطلوب ايجاد اقصر بعد من نقطة
 الى مستوي يقال

(اولا) ان هذا البعد يقاس بالعمود ن النازل من النقطة المعلومة م
 على المستوى المعلوم م فبناء على ذلك يكون المسقطان ن و ن
 عمودين بالتوالي على ق و ر كافي (بند ٨١) وحيثئذ يكونان

معلومين وبالبحت عن التقاطع $س$ للعمود $ن$ والمستوى $م$ كما في
(بند ١١٠) يدل $م$ $س$ الذي هو جزء هذا المستقيم على البعد المطلوب
ويرسم شكل ما ذكر بالسهولة

* (وثانيا) * اذا كان المستوى $م$ عمودا على المستوى الرأسى يكون
المسقط الرأسى $س$ للنقطة $س$ على $ر$ انظر (ثانيا من بند ٥٦)
ويكون ايضا العمود $ن$ موازيا للمستوى الرأسى ومساويا بالضرورة لمسقطه
الرأسى $ن$ ولذلك يتوصل الى هذه الحالة المخصوصة بتغيير مستور رأسى كما هو
واضح من الشكل ١٢٤

* (وثالثا) * يمكن ايضا ان يستعمل لذلك حركة دوران كما يدل عليه
الشكل ١٢٥ الذى أمر فيه اختصار المحور $ا$ بالنقطة المعلومة $م$
ثم بالرجوع الى المسقطين الاولين يوجد $س$ و $و$ كل على انفراده فيلزم
حينئذ ان يكون هاتان النقطتان على عمود واحد على خط الارض $خ$ $ض$
انظر (بند ٨) وهذا برهان على صحة الاعمال

* (المسئلة الثامنة والثلاثون) * اذا كان المطلوب ايجاد اقصر بعددين
مستقيمين ليسا فى مستو واحد يقال

اذا كان احدهما المستقيمين $ا$ كما في (الشكل ١٢٦) عمودا على المستوى الافقى
يكون البعد الاقصر $ن$ افقيا ومساويا بالضرورة $ن$ ويكون زيادة على
ذلك $ن$ فى هذه الحالة المخصوصة عمودا على $ب$ حيث كان $ن$ عمودا على
المستوى الرأسى الذى اثره الافقى $ب$ ويحصل هذا البعد الاقصر بالسهولة
ويمكن ان يتوصل الى هذه الحالة المخصوصة باربعة عمليات هي

* (اولا) * تغيير المستوى

* (وثانيا) * تغيير مستو وثم حركة دوران

* (وثالثا) * حركة دوران ثم تغيير مستو

* (ورابعا) * حركتا دوران ولان ذلك هذه الطرق على الترتيب فقول

* (اولا) * ليكن A و B كما في (الشكل ١٢٧) المستقيمين المطلوب

ايجاد اقصر بعد بينهما فيختار لترجيح المستقيم A ليصير في وضعه المتقدم مستو

آخرا في عمودا على A الا انه لا يكون عمودا على المستوى الرأسى ولذا يؤخذ

اولا مستو جديد رأسى للمسقط موازيا لهذا المستقيم A وليختزل اجل

السهولة المستوى المسقط له وحيث يتحدد X مع A وينتج منه المسقطان

الرأسيان A و B انظر (بند ٤٦) ثم يؤخذ مستو جديد افقى

للمسقط عمودا على A باخذ X عمودا على A فيوجد A و B

ثم ينزل من A العمود N على B فيكون اقصر البعد المطلوب وينتهى

على A و B بالنقطتين S و R اللتين تكون مساقطهما بالتوالى

في S و R وفي S و R وفي S و R ثم في S و R

ومن ذلك يتحصل N و N

* (وثانيا) * يمكن بعد تغيير المستوى الرأسى للمسقط كما ذكر تدوير جله الشكل

حول محور عمود على هذا المستوى الرأسى حتى يصير المستقيم A عمودا على

المستوى الافقى ولاجل ذلك يليق مد محور الدوران من نقطة من المستقيم A

وحيث صار هذا المستقيم بعد رسم الزاوية I في وضعه الجديد A يلزم تدوير

المستقيم B بقدر نفس الزاوية I انظر (بند ٤٦) ليصير في الوضع B فيكون

العمود N النازل من A على B البعد الاقصر المطلوب ويكون N

موازيا X وتحصل منه نقطتان S و R يتقاطع فيهما البعد

الاقصر بالمستقيمين B و A فترجع هاتين النقطتين على B و A

في النقطتين S و R يتحصل المسقطان N و N للبعد الاقصر

* (وثالثا) * اذ ان دور المستقيمان α و β حول محور رأسي قاطع α حتى صار احدهما α في الوضع α موازيا للمستوى الرأسي رسم زاوية α ويندوير المستقيم β بقدر هذه الزاوية ليصير في الوضع β كما في (بند ٥٩) ثم بانتخاب مستو جديد افقي للمسقط عمودا على α يلزم ان يكون α عمودا ايضا على α والمسقط الافقي لهذا المستقيم في نقطة واحدة α ويحصل ايضا β انظر (بند ٤٦) فيكون البعد الاقصر المطلوب حينئذ هو العمود α النازل من α على β وبعد ذلك يرجع كما تقدم الى ايجاد المسقطين α و β للمستقيم المذكور

* (ورابعا) * يمكن لاجل حل المسئلة بمركبي دوران ان يدور اولا المستقيمان α و β معا حول محور رأسي كما في الحالة المتقدمة ثم يدور كل من المستقيمين α و β حول محور عمود على المستوى الرأسي كما تقدم في الحالة الرابعة

ومن البين انه يمكن ايضا تصيير المستقيم α عمودا على المستوى الرأسي بجعله اولا موازيا للمستوى الافقي ويسهل رسم اشكال جميع هذه الاحوال * (وخامسا) * يمكن ايضا حل المسئلة بدون احتياج الى ماسوى المستقيمين المفروضين في وضعهما المفروض مع ابقاء مستويي المسقط الاصلين وذلك انه يلزم اولا الالتفات الى ما تقر في الهندسة الاصلية من انه يمكن دائما مد عمود على مستقيمين α و β كما في (الشكل ١٢٨) ليسا في مستو واحد وانه لا يمكن الا مد عمود واحد وان هذا العمود المشترك هو اقصر بعد من نقطة من α الى نقطة من β قد شوهد ان العملية مبنية على مد مستقيم α من نقطة α من β موازيا α وامرار مستو من α و β موازيا α وانزال عمود α من نقطة α من α على هذا المستوى (ب α) وامرار مستوا آخر من المستقيمين

ا و ط والبحث عن التقاطع γ للمستويين (ب أ) و (أ ط)
وان يمد من النقطة σ التي هي تقاطع γ و ب مستقيم ν يوازي
المستقيم ط ويقابل أ في نقطة σ وهذا المستقيم ν هو قياس
البعد الاقصر المطلوب وكل تلك العمليات يلزم اجراؤها بواسطة
المساقط

وليكن ا و ب المستقيمين المعلومين كما في (الشكل ١٢٩) فتؤخذ
نقطة ما م على المستقيم ب ومنها يمد مستقيم أ مواز ا فيكون
أ موازيا ا و ا موازيا ا ويمر مستو م من ا و ب فيمر
ق من الاثرين الاقبيين ا و ب اهذين المستقيمين ويمر ا باثريهما
الرأسيين ا و ب ثم تؤخذ نقطة ما د من ا وينزل من هذه النقطة
عمود ط على المستوى م فيكون ط عمودا على ق و ط عمودا
على ا وبامرار مستو ك بالمستقيمين ط و ا يمر ق باثريهما
الاقبيين ط و ا و ك بالاثر الرأسي ا وبالنقطة التي يقابل فيها
ق خط الارض خض ومن حيث ان اثرى التقاطع γ للمستويين
المذكورين م و ك في ع و ك يتعين ذلك التقاطع ومن حيث انه
مواز ا يلزم ان يكون γ موازيا ا و γ موازيا ا اذا كانت
الاعمال صحيحة ثم يقطع هذا التقاطع γ المستقيم ب في نقطة σ منها يمد
المستقيم ν موازيا ط الى ان يتلاقى مع ا في النقطة σ فيكون هو
البعد الاقصر المطلوب ويتحصل لنا مقدار الحقيقي بتدويره حول محور رأسي
مار بالنقطة σ حتى يصير في الوضع ν موازيا للمستوى الرأسي بحيث
يكون مقداره الحقيقي معلوما بالمسقط ν

وليست العملية العمومية المتقدمة ممكنة دائما لانه قد يتفق ان لا يكون لاثري

المستوى م نقطة داخل حدود الرسم ولكن من حيث انه لا يحتاج الى
 الاثرين الا لا مكان مد العمود ط على المستوى م يمكن ابدال ق بافق ما
 يحصل بقطع المستقيمين ا و ب بمستواقي وكذلك ابدال ر برأسي
 للمستوى يتحصل ايضا بقطع هذين المستقيمين بمستوا مواز للمستوى الرأسى
 ويمكن ايضا اعتبار المستوى ك معيناتينا كافيا بمستقيمين ا و ط
 الا انه قد يتفق خروج العمود المشترك عن حدود الرسم وحينئذ لا يمكن ايجاده
 الا بالرجوع الى الحالة الخاصة المعبرة اول الامر ويمكن باحدى الطرق الاربع
 الاولية زيادة على ذلك ايجاد البعد الاقصر بين مستقيمين مادام داخل في حدود
 الرسم وذلك انه يمكن اختيار مستوي المسقط الجديين او محوري الدوران بحيث
 تكون مساقط المستقيمين ا و ب واقعة في طرفي فرخ الرسم وهذه الطرق
 مختارة ايضا في اعتبار رسمى لانه لا يوجد في تغيير المستويات الانتقال الابعاد
 المأخوذة بانفتحات البرجل وفي حركات الدوران الا كون الخطوط التى يجب
 رسمها تقاطع على زوايا قائمة

ق
 (المسألة التاسعة والثلاثون) اذا علم المستقيم ا والمسقط الافقى ب
 مستقيم آخر ب والمسقط ن لا قصر بعد ن بين ا و ب وكان
 المطلوب ايجاد المسقطين الرأسيين ب و ن لمستقيمي ب و ن
 والمقدار الحقيقى للمستقيم ن يقال
 حيث كان البعد الاقصر المذكور عمودا على المستقيم ا الذى يقابله في نقطة
 معلومة س يُعَيَّن المسقط ن بالطريقة المذكورة في (بند ٨٦) وحيث
 ان المستقيم المذكور ايضا لا بد وان يكون عمودا على المستقيم ب الذى
 يقابله في نقطة معلومة ص يوجد المسقط ب بالطريقة المذكورة وحيث
 كان الطرفان س و ص للبعد الاقصر ن بين المستقيمين ا و ب

معلومين يستنتج منهما المقدار الحقيقي لهذا البعد انظر (بند ١٣١)

(١٣٩)

(المسئلة الاربعون) * اذا علم مستقيم α والمستقط الافقي β
 مستقيم آخر β والمقدار الحقيقي للبعد الاقصر γ بين المستقيمين
 α و β والنقطة δ التي يقابل فيها γ المستقيم المعلوم α
 والمطلوب ايجاد المسقط الرأسى β' للمستقيم β ومسقطى البعد الاقصر
 γ يقال

من حيث ان المستقيم γ لابد ان يكون عمودا على المستقيم α كافي
 (الشكل ١٣٠) يلزم ان يكون في مستو γ مار بالنقطة δ وعمودا على
 المستقيم α المذكور انظر (بند ٨٥) فاذا طبق هذا المستوى γ على
 المستوى الافقى صارت النقطة δ في الوضع δ' والمستقيم γ احد
 انصاف اقطار محيط الدائرة γ المرسومة بجعل النقطة δ' مركزا والمقدار
 المعلوم للمستقيم γ نصف قطرها اذا فرض المستقيم γ تابعا للمستوى γ
 في حركة الدوران علم وضعه ولزم ان يوجد اثره الانقى على γ ويعلم منه وضع
 المستقيم γ' فتحصل حينئذ النقطة δ' ويستخرج منها النقطة δ''
 ولكن حيث كانت هذه النقطة δ'' موجودة بالضرورة على المستقيم β
 وعلى محيط الدائرة المنطبق في γ معا يبحث عن ايجاد المسقط β' للمحيط
 المذكور فيقطع β' في نقطتين δ' و δ'' وهما المسقطان الافقيان
 للنقطتين الكافيتين لحل المسئلة ويحصل حينئذ المسقطان الافقيان γ' و γ''
 ويستخرج منهما المسقطان الرأسيان γ' و γ'' ومنه يعلم δ' و δ''
 فلم يبق الا تعيين β' بحيث يكون المستقيم β المار بالنقطة δ'
 عمودا على γ' او تعيين γ' بحيث يكون المستقيم γ المار بالنقطة δ''

عودا على ط انظر (بند ٨٦) ويكون المستقيمان ب و و كافيين
في الشرط الذي هو دلالة نفس المستقيم ب^١ على مسقطهما الاقيين وكونهما
على بعد معلوم من المستقيم ا

لا يمكن رسم المنحنى ج^١ هنا الا نقطة فتقطعة ويتضح فيما سياتى ان هذا المنحنى
قطع ناقص فلا يمكن حينئذ ان يقطع ب^١ الا في نقطتين
فاذا كانت النقطة س غير معلومة امكن اخذها على المستقيم ا في اى
وضع كان وبتكرار العملية المتقدمة لكل من الاوضاع تحصل جملة مستويات
كالمستوى م متوازية ويحدث حينئذ من الدوائر كالدائرة ج المتساوية
سطح اسطوانى مستدير محوره المستقيم ا وجميع نقط ب^١ المحصورة في المسقط
الافقى لهذا السطح الاسطوانى يمكن ان تدل على النقطة ص^١ وسنذكر
حل هذه المسئلة في محل آخر من هذا الكتاب بعد ذكر ما تتوقف عليه من
معارف لا بد منها

* (الباب الرابع) *

* (في الزوايا الثلاثية والاهرام) *

* (١٤١) *

* (مسئلة عامة) * اذا كان المعلوم زاوية ثلاثية والمطلوب ايجاد الزوايا السطحية والزوايا الزوجية المترتبة هي منها بعملية على مستوية قال
يؤخذ احد وجوه الزاوية الثلاثية الممتدة مستويا افقيا للمسقط ثم تقطع هذه
الزاوية بمستوي رأسي بحيث يكون م و ك مستويين الوجهين
الآخرين و ي تقاطعهما كما في (الشكل ١٣١) فتكون احدي
الزوايا السطحية معلومة في ا وتحصل الاخرى بانطباق الوجهين م و ك
على المستوى الافقي كما في (بند ٧٦) ويختار المستويان الرأسيان الجديدان
مارين بالاثري - للتقاطع ي بحيث يكون خط الارض خ ص
و خ ص مارين بالمسقط و وينتقل التقاطع ي في ي و ي
على المستويين المنطبقين ولا يخفى ان ا = ا حيث انهما يدلان
على الجزء ا - من التقاطع ي فاذا رسم المستقيمان ع - و ك -
دلا على الاثرين الرأسين ع - و ك - المعلوم مقدارهما الحقيقي
ويلزم من ذلك ان يكون ع - = ع - و ك - = ك - فحينئذ
تحصل معنا الثلاث زوايا السطحية ا = ع ا ك و ب = ع ا -
و ج = ك ا - وحيث كان المستوى م عمودا على المستوى الرأسي
خ ص و ك على المستوى الرأسي خ ص تكون زاويتا هذين المستويين
الحادثتان منهما مع المستوى الافقي او الزاويتان الزوجيتان ع و -
معلوماتين بالتوالي في ا - ع - و ا - ك - فلم يبق حينئذ الا البحث عن
الزاوية ا الواقعة بين الوجهين ب و ج لكن هذه الزاوية مقاسة بزاوية
العمودين الممتدين من نقطة واحدة من التقاطع ي احدهما في المستوى
م والاخر في ك فاذا وجد هذان العمودان على المستويين المنطبقين

في حالة انطباقهما صارا عمودين كذلك على Y و Y' في نقطتين M و M' على بعد واحد من A فيقابلان الاثرين Q و Q' في النقطتين S و S' فاذا وصل بين هاتين النقطتين كان من الواضح ان المستقيم SS' يدل على الاثر الافقي للمستوى العمود على Y ويلزم حينئذ ان يكون عمودا على Y' وبانطباق المستوى المذكور بدويره حول اثره S لا تخرج رأس الزاوية المطلوبة عن المستوى الرأسى الذى يكون Y' اثره وينطبق ضلعاها على مقدارهما الحقيقى فينتد لوجعل كل من النقطتين S و S' مركزا واخذ S و S' نصف قطر ورسم قوسا دائرة لزم ان يتقاطعا في نقطة S'' من Y' اذا وصل بينهما بين النقطتين S و S' صار S'' زاوية المطلوبة A

(١٤٢)

اذا عرفت هذه المسئلة العامة يسهل عليك حل المسائل الخصوصية المختلفة المتعلقة بالزاوية الثلاثية وهى ستة ولنزمن للزوايا السطحية الثلاث بحروف A و B و C وبحروف A' و B' و C' للزوايا الثلاث الزوجية المقابلة لها كل لتظيرتها فتحدث الستة ترتيبات التى صورتها هكذا

معالم	مجاھيل	معالم	مجاھيل
A	B	A'	B'
B	C	B'	C'
C	A	C'	A'

وقد ترجع الاحوال الثلاثة الاخيرة الى الثلاثة الاولى بواسطة الزاوية الثلاثية المتممة ومن المعلوم انه اذا اخذت نقطة داخل زاوية ثلاثية وانزل منها اعمدة على اوجه هذه الزاوية وأمرت بهذه المستقيمات مستويات حدثت زاوية اخرى ثلاثية زواياها السطحية متممة لمقابلاتها الزوجية فى الاولى وزواياها الزوجية متممة

لمقابلاتها السطحية فيها ايضا ولذا اطلق على هاتين الزاويتين الثلاثيتين اسم
الزاويتين الثلاثيتين المتمتين فعلى هذا اذا رمز الى الزوايا السطحية في الثانية بالحروف
أ و ب و ج والى الزوايا الزوجية فيها بالحروف أ و ب و ج فيحدث

$$\begin{aligned} \text{أ} - \text{ب} &= 180^\circ - \text{أ} - \text{ب} = 180^\circ - \text{ج} \\ \text{أ} - \text{ج} &= 180^\circ - \text{أ} - \text{ج} = 180^\circ - \text{ب} \\ \text{ب} - \text{ج} &= 180^\circ - \text{ب} - \text{ج} = 180^\circ - \text{أ} \end{aligned}$$
 فحينئذ اعلم مثلاً أ و ب و ج تحصلت الزوايا السطحية
 أ و ب و ج وبواسطة هذه تتعين الزوايا أ و ب و ج
 كما سنبينه ثم يحدث من هذه أ و ب و ج ومثل ذلك
 يعمل في الحالتين الاخرين غير ان الحالة التي تفرض فيها الزوايا الثلاث
 الزوجية معلومة تخرج دون غيرها عن القواعد المذكورة آنفاً وسنذكر طريقة
 حلها

(المسئلة الاولى) اذا كان المعلوم الثلاث زوايا السطحية المكونة للزاوية
 الثلاثية والمطلوب ايجاد الثلاث زوايا الزوجية يقال
 (اولاً) يؤخذ دائماً مستوى احد الواجه مستويافقياً كما في
 (الشكل ١٣٢) فيدل ضلعاً الزاوية أ على الاثرين الاقبيين ق و ق
 لمستويي الوجهين الاخرين اللذين يفرضان منطبقين على المستوى الافقي
 في ب و ج احدهما في احدى جهتي أ والاخرى في الجهة الاخرى
 انظر (بند ١٤١) فيعلم تقاطعهم في ق و ق وتوجد نقطة ما ر
 من هذا التقاطع على ق و ق على بعد واحد من ا فاذا اخذ حينئذ

$$\text{ا} = \text{ا} \text{ و مد من النقطتين } \text{ق} \text{ و } \text{ق} \text{ عمودان على ق و ق}$$
 كاناهما الخطين الارضيين خ خ و خ خ كما تقدم في المسئلة العامة
 انظر (بند ١٤١) وتقاطع في نقطة ر من ق وكانت النقطة ر
 معلومة على المستويين الرأسيين في ا و ا لانها لا بد ان توجد على

عمود على خط الارض $\chi \chi'$ أو $\chi \chi''$ قائم من النقطة χ وعلى
الدائرة المرسومة من المركز χ يجعل $\chi \chi'$ أو $\chi \chi''$ نصف قطر ويلزم
منه ان يكون $\chi \chi' = \chi \chi''$ فقد آل الامر الى المسئلة العامة لانه
يمكن ايجاد χ و χ' على مستوي رأسي $\chi \chi'$

(وثانيا) * اذا تساوى زاويتان من الزوايا الثلاث السطحية لزم ان تكون
الزاويتان الزوجيتان المقابلتان لهما متساويتين ايضا وذلك ان يؤخذ المستوى
الافقي مستوي الزاوية الثالثة χ وترسم الزاويتان المتساويتان $\chi \chi'$ و $\chi \chi''$ في
كأني جهتي χ كما تقدم ومن المعلوم في فرضنا هذان المثلثان $\chi \chi'$ و $\chi \chi''$
متساويان لان وتر احدهما مساو لوتر الآخر وفيهما زاويتين حادتين متساويتين
فينتج ان $\chi \chi' = \chi \chi''$ وان المثلثين القائمي الزاوية $\chi \chi'$ و $\chi \chi''$
 $\chi \chi'$ متساويان ايضا لان الضلع $\chi \chi' = \chi \chi''$ والضلع $\chi \chi' = \chi \chi''$
 $\chi \chi'$ فتكون حينئذ الزاوية $\chi \chi' = \chi \chi''$

(وثالثا) * اذا كان زيادة على ذلك الزاويتان المتساويتان $\chi \chi'$ و $\chi \chi''$
قائمتين لزم ان يكون الزاويتان الزوجيتان المقابلتان $\chi \chi'$ و $\chi \chi''$ قائمتين ايضا
لانه يسهل في هذه الحالة مشاهدة كون $\chi \chi'$ و $\chi \chi''$ يتحدان على التوالي
مع χ و χ' ومنه تتحدد النقطة χ و χ' و χ'' وينتقل
المستقيمان $\chi \chi'$ و $\chi \chi''$ على χ و χ' بالتوالي وتوجد النقطتان
 χ و χ' على نفس هذين المستقيمين فتكون بالضرورة الزاويتان $\chi \chi'$ و $\chi \chi''$
 $\chi \chi' = \chi \chi''$ و $\chi \chi' = \chi \chi''$ قائمتين

(ورابعا) * اذا كانت الثلاث زوايا $\chi \chi'$ و $\chi \chi''$ و $\chi \chi'''$ متساوية كان
الثلاث زوايا الزوجية المقابلة لهما $\chi \chi'$ و $\chi \chi''$ و $\chi \chi'''$ متساوية ايضا لانه
بسبب كون الزاوية $\chi \chi' = \chi \chi''$ يتحصل $\chi \chi' = \chi \chi''$ ولكون $\chi \chi' = \chi \chi''$

يحدث $\perp = \text{ج} = \text{ج}$ فيفتح $\perp = \text{ج} = \text{ج}$
 * (وخامسا) * اذا كانت الزوايا الثلاث \perp و ب و ج قائمة لزم ان تكون
 الزوايا الثلاث \perp و ب و ج قائمة ايضا واثبت ان هذا كاثبات ما تقدم
 * (وسادسا) * يسهل معرفة ان احدى الزوايا \perp و ب و ج اذا كانت
 قائمة لاتعين شيئا في الزاوية المقابلة الزوجية

(١٤٤)

من المعلوم في الهندسة العادية ان الزوايا \perp و ب و ج لا يمكن ان تكون
 ثلاث زوايا سطحية لزاوية ثلاثية الا اذا كان مجموعها اقل من اربع زوايا قائمة
 وكان كل منها اصغر من مجموع الزاويتين الاخرين وقد تحصلت هذه الشروط
 من العملية المتقدمة وبيان ذلك

* (اولا) * ان خطي الارض $\text{خ} \text{ض}$ و $\text{خ} \text{ض}$ كافي (الشكل ١٣١)
 لا يمكن في المسئلة العامة ان يتقاطعا الا في النقطة و وان و و ي
 يتركان الزاوية و دائما خارجة عن مجموع $\perp + \text{ب} + \text{ج}$
 فيكون هذا المجموع حيثئذ اصغر من اربع زوايا قائمة

* (وثانيا) * ان احدى الزوايا الثلاث \perp اذا كان اكبر من مجموع الاثنتين
 الاخرين كانت النقطة و خارج المحيطين وبناء عليه لا يمكن ان يقابل
 العمودان القائممان من هذه النقطة على خطي الارض هذين المحيطين ابدا

(١٤٥)

* (المسئلة الثانية) * اذا كان المعلوم زاويتين سطحيتين لزاوية ثلاثية والزاوية
 الزوجية المحصورة بينهما والمطلوب ايجاد الزاوية الثالثة السطحية والزاويتين
 الزوجيتين الاخرين يقال

يختار المستوى الافقي دائما مستوى احد الالوجه المعلوم \perp ويفرض كافي
 (الشكل ١٣٢) الوجه الاخر المعلوم ب منطبقا حول الاثر ق
 ويؤخذ $\text{خ} \text{ض}$ عمودا على ق فيعلم الاثر ر لانه لا بد وان يصنع مع

خَض الزاوية الزوجية المعلوم β فتنتقل حينئذ النقطة γ في رجوع
المستوى μ الى الوضع α فيكون مسقطها الافقى γ ومن ذلك ينتج
 γ فيؤول الامر الى المسئلة العامة انظر (بند ١٤١) لان الاثر
 γ معلوم واذا اخذ خط ارضي حينما اتفق مارا بالنقطة γ تحصلت النقطة
 γ التي يمر بها الاثر γ

* (المسئلة الثالثة) * اذا كان المعلوم وجه زاوية ثلاثية والزاويتين الزوجيتين
المجاورتين والمطلوب ايجاد الزاويتين السطعيتين الاخرين والزاوية الثالثة
الزوجية يقال

يختار المستوى الافقى مستوى الوجه المعلوم α كما في (الشكل ١٣٣)
فيكون ضلع الزاوية α الاثرين γ و γ لمستويي الوجهين الاخرين
الذين ينسبان الى مستويين رأسيين γ و γ يكونان عمودين
عليهما بالتوالي بحيث يصنع كل من الاثرين γ و γ مع خط الارض
المقابل له الزاويتين الزوجيتين المعلومتين β و β والغرض من هذه
العملية ايجاد المسقط γ لتقاطع المستويين المذكورين وقد علمت طريقة
ايجاده في (بند ١٠١) فيؤول الامر حينئذ الى المسئلة العامة انظر
(بند ١٤١)

* (المسئلة الرابعة) * اذا كان المعلوم وجهي زاوية ثلاثية والزاوية الزوجية
المقابلة لآخذهما والمطلوب ايجاد الوجه الاخر والزاويتين الزوجيتين الاخرين
يقال

يؤخذ المستوى الافقى كما في (الشكل ١٣٤) مستوى الوجه المعلوم

١ المجاور للزاوية المعلومة β ويؤخذ χ ض ϵ عمودا على ϵ
 فيعلم حينئذ δ ويؤخذ ايضا χ ض ϵ عمودا على ϵ فاذا فرض ان
 المستوى μ يدور حول ϵ ليشغل الوضع الفراغي الذي يجب ان يشغله
 تحركت نقطة α من γ في المستوى الرأسى χ ض ϵ راسمة قوس
 دائرة γ وصارت في النقطة التى يقطع فيها المستوى μ قوس الدائرة
 المذكورة وهى نقطة يمكن تحصيلها بالبحث عن الاثر δ انظر (بند ٤٧)
 ويوجد على العموم نقطتان α و β يكون مسقطاهما الاقبيان في
 γ و δ ويعينان مسقطين افقيين γ و δ لتقاطع المستويين
 μ و ν فيوجد حينئذ زاويتان ثلاثيتان بواسطة هذه المعالم
 ولا يمكن الايجاد واحدة اذا كان الاثر δ مماسا للدائرة γ ولا يمكن
 وجود هذه الزاوية اذا كان δ لا يقابل الدائرة γ

(المسئلة الخامسة) اذا كان المعلوم زاوية سطحية والزاوية الزوجية
 المقابلة وزاوية زوجية مجاورة والمطلوب ايجاد الزاوية الثالثة الزوجية والزاويتين
 السطحتين الاخرين يقال

يؤخذ المستوى الافقى مستوى وجه مجهول α كما فى (الشكل ١٣٥)
 ويفرض المستوى μ للوجه المعلوم β منطبقا ويمد χ ض ϵ عمودا
 على ϵ فتحدث من α مع خط الارض χ ض ϵ الزاوية المعلومة γ
 المجاورة للزاوية β واذا فرض رجوع المستوى μ الى وضعه
 انتقلت النقطة α فى β التى مسقطها الافقى γ ومنه يعلم γ
 ولايجاد ϵ يفرض ان المستوى μ يدور حول محور رأسى مارا بالنقطة

١ - حتى يصير عمودا على المستوى الرأسى χ وفى هذا الوضع يصنع
اثره الرأسى χ مع χ الزاوية β المعلومة المقابلة للزاوية β
ويصير χ عمودا على χ فاذا فرض رجوع هذا المستوى الى وضعه
ترسم النقطة χ حول χ بمجموعة مركزا قوس دائرة يكون الاثر الافقى
ق مماسا له ومارا زيادة على ذلك بالنقطة α فيتعين حينئذ وبهذا يؤول
الامر الى المسئلة العامة انظر (بند ١٤١)

(١٤٩)

*(المسئلة السادسة) اذا كان المطلوب تحويل زاوية الى الافقى يقال
ان هذه العملية كافي (الشكل ١٣٦) هى عملية الزاوية الثلاثية المعلومة
زواياها الثلاث السطحية لكن يمكن ترتيب الشكل على وضع مخصوص وحيث
علمت الزاوية الواقعة بين مستقيمين والزاويتان الحادتان منهما مع المستقيم
الرأسى فليكن α رأس الزاوية و χ الرأسى المار بهذا الرأس و
احد المستقيمين الصانع مع χ الزاوية المعلومة β وليختار المستوى الرأسى
للمسقط مستوى المستقيمين χ و χ وليكن المستقيم الآخر χ المنطبق
على هذا المستوى الرأسى صانعا مع χ الزاوية المعلومة γ ولتصنع
الزاوية $\delta = \alpha$ الحادثة من المستقيمين ويؤخذ $\alpha = \alpha$ ثم يرسم
قوسا دائرة بجعل α مركزا و α نصف قطرها وجعل δ
مركزا و δ نصف قطرها لآخر فبقاطعان χ و χ يحدد
الضلع الثانى χ من الزاوية المطلوبة α ويسهل تصور اسباب اجراء تلك
العمليات بدون احتياج الى ايضا حها هنا

(١٥٠)

(المسئلة السابعة) اذا كان المطلوب رسم كرة داخل هرم مثلثى

يقال

تقسم الى قسمين متساويين كما في (بند ١٢٨) الثلاث زوايا الزوجية التي اضلاعها غير متلاقية في رأس واحد ويكون مركز الكرة في نقطة تقاطع المستويات القاسمة ونصف قطرها بعد هذا المركز عن احد الاوجه انظر (بند ١٣٦)

* (١٥١) *

* (المسئلة الثامنة) * اذا كان المطلوب رسم كرة خارج هرم مثالي يقال

تقام كما في (بند ٨٣) مستويات اعمدة على منتصف الاضلاع الثلاثة التي لا تكون على وجه واحد فتكون نقطة تقاطعها مركز الكرة المطلوبة ويتحصل نصف قطرها بايصال هذا المركز باحد الرؤس

* (١٥٢) *

* (المسئلة التاسعة) * اذا كان المطلوب رسم هرم مثالي على مثلث حاد الزوايا معلوم وايضا دارتفاعه يقال

يؤخذ مستوى المثلث المعلوم مستويا افقيا كما في (الشكل ١٤٧) ويجعل المستوى الرأسى مستويا عموديا على احد اضلاعه كالضلع ab وانتصوهر الهرم مرسوما ونطبق على المستوى الافقى الوجه abc الذى يكون مستويه عمودا على المستوى الرأسى فيصير مرسوما داخل نصف دائرة قطرها ab وحيث ان الضلع ac عمود على هذا الوجه يكون موازيا للمستوى الرأسى ويلزم ان يكون مسقطه الافقى ac عمودا على ab فينثذتنطبق النقطة c على ab والوجه abc على ab فاذا فرضنا الان ان هذا الوجه يرجع ثانيا الى وضعه رسمت النقطة c قوس دائرة مركزه f و على ab والضلع bc مماس بالضرورة له ورسم المسقط الافقى bc دائرة كالاولى يكون الضلع bc مماسا لها فينثذ يكون هذا المماس ممكنا

دائماً لان نصف القطر $وسه$ دائماً اصغر من $وج$ فحينئذ يكون $ج$ خارج المحيط ويتحصل كذلك المسقط $سه$ الذي منه ينتج $سه$ ومن ذلك يعلم الهرم فاذا وصلنا بين $ا$ و $سه$ حدث المسقط الافقي للضلع $اسه$ العمود على الوجه $سهج$ وحينئذ يكون $اسه$ عموداً على $سهج$ كما يكون $سه$ عموداً على $اهج$

وحيث ان ارتفاع الهرم معلوم في $مهج$ تصيرا لا وجه الثلاثة اذا طبقت مرسومة داخل انصاف دوائر اوتارها المجاورة لرأس واحد من المثلث متساوية

المسئلة المتقدمة توصلنا الى نتيجتين هما ان تقول

(اولا) انه يمكن دائماً رسم هرم مثلثي على مثلث ما حاد الزوايا بمجموع قاعدة

(وثانيا) ان الاعمدة النازلة من رؤس مثلث ما على الاضلاع المقابلة لها تتلاقى في نقطة واحدة وقد برهننا على ذلك فيما اذا كان المثلث حاد الزوايا واما اذا كان المثلث منفرج الزوايا $اهج$ كما في (الشكل ١٣٨) فانا اذا انزلنا من الرؤسين $هـ$ و $ج$ للزاويتين الحادتين عمودين على الضلعين المقابلين لهما تقاطعا بالضرورة في النقطة $د$ الخارجة عن المثلث $اهج$ وحدث منهما بالضرورة مثلث آخر $سهج$ حاد الزوايا فيه المستقيمان $سهج$ و $سه$ عمودان على الضلعين $هـج$ و $سد$ فحينئذ يصير المستقيم $دا$ عموداً ايضا على $سهج$ فحينئذ المستقيمان $دا$ و $سه$ و $سهج$ و $سد$ النازلة من رؤس المثلث $اهج$ الثلاث اعمدة على الاضلاع المقابلة للرؤس تتلاقى في نقطة واحدة $د$ داخله او خارجة بحسب كونه المثلث حاد الزوايا او منفرجها

* (١٣٤) *

* (١٥٤) *

* (المسئلة العاشرة) * اذا كان المطلوب قطع هرم مثلث قائم الزوايا السطحية بحيث يكون المقطع مثلثا حاد الزوايا معلوما يقال
اذا طبقنا وجوه الهرم الثلاثة المفروض في (الشكل ١٣٩) فالنقطة
ا و ب و ج المثلث الذي يكون المقطع مساويا له كما في (الشكل ١٤٠)
فيكون قاعدة الهرم مثلث قائم الزوايا السطحية مصنوع في رأس الهرم المفروض
وانبسط ذلك الهرم فتحصل حينئذ الوجوه ا ب و ب ج و ج ا و
و ب ج التي تؤخذ على التوالي داخل المثلث س ا ب و
س ا ب و س ب ج كما في (الشكل ١٣٩) ثم اذا نقلت النقطتان
ا و ب والنقطتان ب و ج والنقطتان ج و ا في النقط ا و ب و ج
الكائنة على مساقط الاضلاع الثلاث تحصل لنا المسقط الافقي لمثلث المقطع وبه
يسهل ايجاد مسقطه الرأسى وحينئذ يتعين مستويہ تعيينا تاما ويمكن زيادة على
ذلك ايجاد اثره اذا اريد ذلك

* (١٥٥) *

* (المسئلة الحادية عشر) * اذا كان المطلوب قطع هرم مربعي قاعدته شبه
منحرف بمستوي بحيث يكون المقطع شكلا متوازي الاضلاع يقال
يؤخذ مستوي قاعدة الهرم التي هي ا ب ج د مستويا افقيا فلا يحتاج الى
المستوى الرأسى ثم يمد ضلعا القاعدة الغير المتوازيين ا د و ب ج الى ان
يتلاقيا في النقطة و فيتقاطع مستويا الوجهين س ا د و س ب ج
في المستقيم و الذي يمر بالنقطتين س و و يتقاطع ايضا مستويا
الوجهين س ا ب و س ب ج د اللذين اثراهما الاقبيان متوازيان في
افق لهما مار من النقطة س اذا تقرر ذلك فالترمز بالحرف م لمستوى
القطع وحيث انه يقطع الوجهين س ا ب و س ب ج د في مستقيمين متوازيين
ومتوازيين بالضرورة لتقاطع مستويي هذين الوجهين يكون هذان المستقيمان

موازيين لخطي a و b د وللأثر c فيلزم ان يكون الأثر c موازيا
 للخط a ويمكن زيادة على ذلك ان يؤخذ هذا التركيب ما انفق ثم ان المستوي
 m يقطع الوجهين s و d و s في مستقيمين متوازيين وموازيين
 للمستقيم w و m من النقطتين s و v فاذا امد حينئذ من هاتين
 النقطتين موازيان للمستقيم w يقطعان s و a و s و b و s و c
 و s د في النقط a و b و c و d و وصل بين a و b
 وبين c و d كان الشكل a b c d هو المسقط الأفقي للمقطع ويلزم
 ان يكون شكلا متوازي الاضلاع

وحيث ان الضلعين a و d موازيان بالتوالي للخط a وللمسقط
 و يلزم لاجل ان يكون متوازي الاضلاع a b c d قائم الزوايا ان يكون
 و عمودا على a و لاجل ان يكون المسقط a و b و c و d
 شكلا معينيا يلزم التنبيه الى ان كل مستوي مواز للمستوي m يقطع ايضا في هذه
 الحالة الهرم في شكل متوازي الاضلاع مسقطه الأفقي شكل معين وحينئذ
 يمكن اخذ a اثرا للمستوي القاطع كما في (الشكل ١٤٢)
 فيكون بالضرورة a احد ضلعي المعين والاخر مساويا له ضرورة
 فبأخذ النقطة a مركزا و a نصف قطر يرسم محيط دائرة تؤخذ
 عايه النقطة d بالاختيار واذا امد من النقطة w مواز للمستقيم ad قطع
 d في نقطة s وكان يمكن رسم المحيط المذكور بجعل النقطة s
 مركزا ثم قد يكون المسقط a b c d مربعا اذا كان d على المحيط المتقدم و
 عمودا على a

بمستوي بحيث يكون المقطع متوازي الاضلاع يقال
 يؤخذ المستوى الافقي مستوى القاعدة $ا-ب-ج-د$ كما في (الشكل ١٤٣)
 ولا يرسم هذا المسقط الرأسى لسهولة ايجاده متى اريد ثم يمد الضلعان المتقابلان
 $ا-و$ و $ج-د$ الى ان يتلاقيا في نقطة $و$ وبالوصل بين النقطتين $و$ و $س$
 يتحصل المسقط الافقى $س-ي$ لتقاطع مستويي الوجهين $س-ا-و$ و $س-ب-ج-د$
 ثم يمد ايضا الضلعان المتقابلان $ا-د$ و $ب-ج$ الى ان يتلاقيا في نقطة $و$
 وبالوصل بين النقطتين $و$ و $س$ يتحصل المسقط الافقى $س-ي$ لتقاطع
 مستويي الوجهين $س-ا-د$ و $س-ب-ج$ فيكون المستقيم $و-و$
 الاثر الافقى للمستوى (ي-ي) أو $س$ اذا قرر هذا وجب ان يقطع
 المستوى القاطع كل وجهين متقابلين من الالوجه المتقابلة في مستقيمين
 متوازيين وموازيين بالضرورة لتقاطعهما وان يكون هذا القاطع نفسه
 موازيا للمستقيمين $ي-ي$ و $س-ي$ معا وموازيا بالضرورة لمستوييهما فيكون $ق$
 حينئذ موازيا $س-ي$ ويمكن ان يؤخذ مستقيم $ق$ مستوف لهذا الشرط
 ثم يمد من النقطتين $س$ و $و$ اللتين هما تقاطع $ق$ بالمستقيمين
 $ا-ب$ و $ج-د$ موازيان للمسقط $س-ي$ ويمد ايضا من النقطتين $و$ و $س$
 اللتين هما تقاطع $ق$ بالمستقيمين $ا-د$ و $ب-ج$ موازيان للمسقط $س-ي$
 فتقاطع هذه المستقيمات في نقط على مساقط الاضلاع يتحصل منها المسقط
 الافقى $ا-ب-ج-د$ للمقطع الذي يكون بالضرورة شكلا متوازي
 الاضلاع

وقد يكون المسقط الافقى $ا-ب-ج-د$ مستطيلا اذا كان المسقطان $ي-ي$ و $س-ي$
 للتقاطعين عمودين على بعضهما اعني اذا كانت النقطة $س$ كما في

(الشكل ١٤٤) موجودة على محيط الدائرة المرسوم على القطر
و

وقد يكون المسقط $\alpha - \beta - \gamma - \delta$ شكلا معيننا اذا كان المثلث $\alpha - \beta - \gamma$ و
كافي (الشكل ١٤٥) متساوي الساقين واذا كانت النقطة δ زيادة عن
كون المثلث المذكور متساوي الساقين موجودة على محيط دائرة قطره $\alpha - \beta$
يكون المسقط $\alpha - \beta - \gamma - \delta$ مربعا

* (الباب الخامس) *

* (في انواع المساقط) *

* (١٥٧) *

لم نعتبر فيما تقدم الا المساقط العمودية على مستويين عمودين على بعضهما
ويمكن ان يراد دائما بمسقط نقطة على مستوي النقطة التي يقابل فيها مستقيم ما
مار بالنقطة المعلومة هذا المستوى لكن نوع المساقط المتقدم اكثر استعمالا
ومع ذلك فقد تستعمل انواع مساقط اخرى لا يعتبر فيها الامستوى واحد
للمسقط وابسطها النوع الذي تتركب منه المستويات المنتسبة
والموزونة وقد تتعين النقطة في هذا النوع بمسقطها العمودي على مستوي يسمى
بمستوى الاقتران المختار عادة فوق جميع نقط الشكل المنسقط وبعدد مكتوب
بجوار مسقط النقطة يدل على البعد الكائن بينهما وبين مستوى الاقتران ويسمى
هذا العدد بمقدار بعد النقطة وتكون مقادير ابعاد النقط الكائنة اعلا
مستوى الاقتران سالبة ويشاهدان هذا النوع يرجع للمساقط العمودية لانه
يمكن بواسطة مقدار بعد كل نقطة من نقطة جملة الشكل المنسقة ايجاد
مسقطه على مستوي ما عمود على مستوى الاقتران وذلك باختيار خط ما
ارضى وانزال عمود على هذا الخط من المسقط المعلوم لكل نقطة وان يؤخذ
على هذا الخط في الجهة المناسبة ابعاد مساوية لمقادير ابعاد هذه النقط انظر
(بند ٥)

وقد يتعين المستقيم في هذا النوع بمسقطي نقطتين من نقطه ومقداري بعديهما
انظر (بند ١٨) واما المستوى فيتعين بخطه الاعظم ميلا بالنسبة لمستوى
الاقتران انظر (بند ٣٨) ويسمى هذا الخط بمقياس ميل المستوى
وهذا النوع كثير الاستعمال لاسيما في الرسم المتعلق بالاستحكامات واشغال
حفر وردم الطرق والخيلان وما اشبه ذلك

وحيث كان لا يتيسر في العادة فرخ من ورق الرسم فيه كفاية لان يسع صورة
الاجسام المرسومة ككلها اى على حجمها الطبيعي تختصر الصور الى
مقياس اختصارى معين يرسم في الصور وتعد عليه المقادير الافقية وتبقى
مقادير ابعاد النقط على حقيقة تهادا دائما لم يرد عمل المسقط الرأسى للجسم فانها تصغر
بتصغير الجسم على مقتضى مقياسه الاختصارى وسيشاهد مع ذلك انه لا يمكن
في بعض الاحيان تصغير المسقطين الافقى والرأسى بنسبة واحدة بسبب امور
سيأتى ذكرها فيما بعد

المساقط المائلة هي المساقط التى تتعين بمستقييات مائلة بالنسبة لمستوى
المسقط ومتوازية كلها ولاجل امكان ايجاد مسقط النقطة المائل يلزم معرفة
اتجاه وميل المستقيم المسقط لها بالنسبة لمستوى المسقط ويعين الاتجاه عادة
بميله يعنى بالنسبة الواقعة بين ارتفاع وقاعدة المثلث القائم الزاوية الحادث
من المستقيمين المسقطين للنقطة اسقاطا عموديا ومائلا ومن المستقيم الواصل بين
المسقطين فينتج من ذلك ان النقطة تتعين بمسقطها العمودى والمائل على مستو
واحد لان المسقط العمودى يعلم منه مستقيم توجد عليه النقطة المذكورة
وببعد المسقطين مع النسبة المعلومة بين ارتفاع المثلث القائم الزاوية المذكور
وقاعدته يتعين البعدين النقطة ومستوى المسقط فاذا كانت الخطوط المسقطة
مائلة بقدر ٤٥° على مستوى المسقط يكون المثلث القائم الزاوية متساوى
الساقين وتكون قاعدته مساوية لارتفاعه فيكون بالضرورة البعد الكائن بين
النقطة ومستوى المسقط مساويا للبعد الكائن بين مسقطيها

ويسمى هذا المسقط الثانى في نظرى الظل بالظل الساقط من النقطة على
مستوى المسقط الافقى المأخوذ عادة مستويا هندسيا واما المستوى الرأسى
فيؤخذ في القطوع والارتفاعات

وقد يتعين المستقيم ايضا بمسقطه العمودى ومسقط مائل على المستوى المذكور
والمستوى بمسقطى خطه الاعظم ميلا واما ما يسمى بالمنظور العسكرى فليس

الاسقاطا مائلا ويستعمل ايضا في اشغال صناعة القناطر والجسور لا يوضح
تفاصيل اوصال اجزاء التراكيب الداخلية

ويطلق اسم المساقط الاسطوانية على المساقط العمودية والمائلة التي ذكرت
آنفا وهناك نوع آخر من المساقط يسمى بالمساقط المخروطية ويسمى ايضا
بالمساقط المركزية او القطبية وفي هذا النوع تمر جميع المستقيمات المسقطة بنقطة
واحدة ثابتة تسمى قطبا او مركزا للمساقط

ويستعمل في هذا النوع مستويان قائما الزاوية يسمى احدهما بالمستوى
الهندسي الذي تسقط عليه اسقاطا عموديا بجملة الشكل والاخر بمستوى
المنظور الذي يجري عليه المسقط المخروطي او منظور تلك الجملة ويطلق على خط
الارض في هذه الحالة اسم قاعدة مستوى المنظور

وتعين اى نقطة في الفراغ متى علم مسقطها العمودى على المستوى الهندسي
ومنظورها وقاعدة مستوى المنظور ومركز المساقط او نقطة النظر ويمكن تعيين
النقطة ايضا في الفراغ بواسطة منظورها ومقدار بعدها عن المستوى الهندسي
ومسقط نقطة النظر على مستوى المنظور وبعدها عنه ومقدار بعدها لانه
يمكن بواسطة هذا المعالم معرفة مسقط النقطة على المستوى الهندسي وان
مقدار بعدها نقطة النظر قد يعين قاعدة مستوى المنظور

لكن اذا لم يكن المطلوب الانسب الوضع على مستوي يمكن ان يفرض بجميع النقط
والمستقيمات مسقط واحد ويبقى وضع الشكل في الفراغ اختياريا وقد سبق
استعمال هذا في بعض مسائل من الباب الثالث من هذا الكتاب وظهرت
عدة مؤلفات تتعلق بهذا الغرض

*(في المستويات المنتسبة والموزونة) *

هذا الفصل يحتوى على قياس الابعاد الاقضية بمقياس اختصارى مقدر عليه
المتر الواحد بهذا المقدار ٠.١ ر. ٢ كفاً (الشكل ١٦٤) واما عشر المتر فقدر
عليه بواحد من الف من متر بحيث اذا اريد اخذ بعدا صغرا من عشر المتر مثلا
كواحد من مائة يرتب المقياس بهذه الكيفية بان يقام كفاً (الشكل ١٤٧)
من احدى الطرفين للمستقيم ا - عمودياً يؤخذ عليه بعدا اختصارى عشر
مرات ويعد من جميع النقط ١ و ٢ و ٣ الى ١٠ خطوط موازية
للمستقيم ا - ثم يقسم الموازى الاخير الى اجزاء من الف من المتر
مقدارها عشرة ثم يوصل بين ١ و ١٠ وبين ٢ و ٣ و ٤ الى
١٠ و ٩ من كل من الموازى المتطرفين فيتضح ان جميع المستقيمات الحادثة
كلها متوازية وان كل اثنين منها متساويين يحصران على الخطوط الموازية للخط
ا - اجزاء مساوية ٠.١ ر. ٢ وان الاجزاء المنحصرة بين خطى ١٠ - ٩
و ١٠ - ١ من الخطوط الموازية للخط ا - الممتدة من النقط
١ و ٢ و ٣ الى ١٠ مساوية بالتوالى ٠.١ ر. ٢ و
٢ ٣ ٩ الى ٠.١ ر. ٢ و ٠.١ ر. ٢ لانه اذا
اعتبر الجزء ا - محسوباً على الخط الموازى المار من النقطة ٧ يحدث
من المثلثين المشابهين ١٠ - ا - ١ - ١٠ و ٩ - ا - ١٠
هذه المتناسبة

$$١٠ - ١ : ١٠ - ٩ :: ١ - ١٠ : ١ - ٩$$

وحيث ان ١٠ - ١ محتو على ١٠ اجزاء يحتوى المستقيم ١٠ - ٩
على ٧ منها وان ٩ - ١٠ = ٠.١ ر. ٢ يمكن تحويل هذه المتناسبة الى هذه

$$١٠ : ٧ :: ٠.١ ر. ٢ : ١ - ٩$$

وبهذه الكيفية توجد مقادير الاجزاء المنحصرة على بقية الخطوط المتوازية
اذا تقرر هذا بفرض انه اذا اريد ان يقدر على هذا المقياس طول يساوى
٦٤ ر. ٧ يؤخذ على الخط الموازى ا - المار من النقطة ٤ الطول
ب - ج - فيكون هو المستقيم المطلوب المحول الى المقياس المذكور لان

هذا المستقيم ج د يتركب من ح ه = ٠.٧ ر. ومن د ن = ٠.٠٠٦ ر.
ومن الجزء ه ن = ٠.٠٠٠٤ ر. فيكون المجموع الذي هو ج د
= ٠.٧٦٤ ر. هو المبين للطول المفروض ٠.٧٦٤ ر. على المقياس
الاختصاري

(المسئلة الاولى) اذا كان المطلوب إيجاد مقدار بعد نقطة ما معلومة المسقط
وعلى مستقيم معلوم يقال

يفرض المستوى المسقط للمستقيم المعلوم و على مستوى الاقتران المعتبر
افقيا ك ما في (الشكل ١٤٨) مستويا رأسيا للمسقط بحيث
يكون و خط الارض خ ض و يوجد و بان يؤخذ على خطين عمودين
على خ ض البعدان م م و م م مساويين بالتوالي لمقداري البعدين
المعلومين ص و ص للقطعتين م و م فبقامة العمود م م
يدل طوله بالضبط على مقدار البعد المطلوب ص للقطعة م ثم لايجاد
المقدار العددي بنسبة مقداري البعدين المعلومين ص و ص يد م ل
موازيا خ ض فيكون م ل = م ط = م م = ص فيحدث من
المثلثين المتشابهين م ل م و م ط م التناسية م ل : م ط :: ل م : ط م أو

م	:	م	:	م	:	م	:	م
م	:	م	:	م	:	م	:	م
م	:	م	:	م	:	م	:	م

أو

س	:	س	:	س	:	س	:	س
س	:	س	:	س	:	س	:	س
س	:	س	:	س	:	س	:	س

ومنه يحدث

$$\frac{ص - ص}{س} = \frac{س (ص - ص)}{س}$$

$$\frac{ص - ص}{س} = \frac{س (ص - ص)}{س} + \frac{ص (س - س)}{س} + \frac{ص - ص}{س}$$

ونفرض مثلا ان و هو المستقيم كافي (الشكل ١٤٩) وان المطلوب

(١٤٣)

مقدار بعد النقطة م فيوضع على المقياس الاختصاري كما في
(الشكل ١٤٦) البعدان الافقيان م م و م م وليفرض انهما وجدوا
مساويين بالتوالي ٠.٢ و ٠.١٥ وهذا يوصل الى الطولين
الاصليين س = ٢ و س = ١٥ انظر (بند ١٦١) ومن
المعلوم ان معنا زيادة على ذلك ص = ٢٠ و ص = ٩٦٠
فيوضع هذه المقادير في القانون المتقدم يحدث

$$\text{ص} = \frac{١٥ \times ٩٦٠ + (٢ - ١٥) \times ٥٢}{٢} = \frac{١٥ \times ٩٦٠ + ٠.٥ \times ٥٢}{٢}$$

$$\text{أو} \quad \frac{١٧}{٢} = \frac{١٤٢٤٠ + ٢٦٠}{٢} =$$

$$\text{ص} = ٨,٥$$

(١٦٣)

(المسئلة الثانية) اذا كان المطلوب ايجاد مسقط نقطة ما معلوم مقدار
بعدها على مستقيم معلوم يقال

بدرسم المستقيم و كما تقدم يؤخذ كما في (الشكل ١٤٨) على م م
طول م ل يساوي مقدار البعد المعلوم ص ثم يد ل م موازيا لخط
الارض خض فتكون النقطة م هي النقطة المطلوبة التي يكون مسقطها
الافقي في م لكن لا بد من ايجاد البعد الكائن بينهما وبين النقطة م ولذا
يستخرج بعد تركيب هذه المناسبة

$$\begin{aligned} & \text{س} : \text{س} :: \text{ص} - \text{ص} : \text{ص} - \text{ص} \text{ كما تقدم} \\ & \text{س} = \frac{\text{س}(\text{ص} - \text{ص})}{\text{ص} - \text{ص}} \end{aligned}$$

واذا فرض مثلا كما في (الشكل ١٥٠) ان و المستقيم المعلوم والمطلوب
ايجاد نقطة عليه مقدار بعدها ٨ يقال بعد وضع البعد م م على المقياس
الاختصاري الذي هو شكل ١٤٦ يفرض ان هذا البعد وجد مساويا
للعدد ٠.٠٥ الموصول الى س = ٥ انظر (بند ١٦١) ومن

المعلوم ان معناه زيادة عن ذلك $\text{ص} = ١٦٣٠$ و $\text{ص} = ١٣٧٠$
و $\text{ص} = ٨$ فينتج
 $\text{ص} - \text{ص} = ٨ - ١٦٣٠ = - ١٦٢٢$ و
 $\text{ص} - \text{ص} = ١٣٧٠ - ١٦٣٠ = - ٢٦٠$
فبوضع هذه المقادير في القانون المتقدم نزول العلامة - وكان يمكن التنبه
عن هذه العلامة من اول الامر لانه لو فرض مقدار البعد ص في الشكل ١٤٨
اكبر من مقدار البعد ص ومن مقدار البعد ص لسهلت معرفة كون
هذه الاعمال توصل الى هذا القانون $\text{س} = \frac{\text{ص} - \text{ص}}{\text{ص} - \text{ص}}$
الذي يدل فيه $\text{ص} - \text{ص}$ و $\text{ص} - \text{ص}$ بالمقادير الموجبة
 ٨٣٠ و ٢٦٠ ومنه ينتج حيثئذ

$\text{س} = \frac{٨٣٠ \times ٠,٥}{٢,٦٠} = \frac{٤١٥}{٢,٦٠} = \frac{٨٣}{٥٢} = ١,٥٩٦١٥٣٨٤٦١٥٣$
أو $\text{س} = ١,٦٠$ تقريبا فاذا حول هذا المقدار الى المقياس الاختصاري
يصير $٠,١٦$ وباخذه على المقياس المذكور ووضع من م الى م
في جهة مقادير الابعاد المتنازلة تكون النقطة م هي النقطة المطلوبة
فاذا اريد ايجاد اثر المستقيم المذكور على مستوى الاقتران اي النقطة التي مقدار
بعدها صفر يكفي جعل $\text{ص} = ٠$ ومنه ينتج $\text{س} = \frac{\text{ص} - \text{ص}}{\text{ص} - \text{ص}}$
وينبغي الاهتمام بجعل الابعاد السالبة في جهة مضادة للجهة الموضوع فيها
الابعاد الموجبة

(المسئلة الثالثة) اذا كان المطلوب ايجاده ميل مستقيم ما على مستوى
الاقتران يقال
ان هذا الميل مقدار الزاوية الحادثة من المستقيم المذكور مع منقطه على هذا
المستوى فيعلم حيثئذ من الشكل ١٤٨ حيث يستنتج منه
 $\text{ظا ل م م} = \frac{\text{ل م}}{\text{ل م}} = \frac{\text{ص} - \text{ص}}{\text{س}}$

فإذا فرض أن الغرض إيجاد ميل المستقيم و المعلوم في (الشكل ١٤٩)
 يكون معنا $\text{صه} - \text{صه} = \text{صه} = \text{صه}$ و $\text{سه} = \text{سه}$ فينتج
 إذا جعلت الزاوية $\text{ل م م} = \text{ا} - \text{ظا} = \frac{\text{صه}}{\text{سه}} = \text{صه} = \text{صه}$
 يحدث

$$\text{لونا ظا} = \text{لونا} = \text{صه} = ٠,٣٤٢٤٢٢٧ = \text{صه}$$

$$\text{لونا ظا} (٢٢ ٢٣ ٦٥) \text{ فينتج } \text{ا} = \text{صه} = ٦٥$$

(المسألة الرابعة) إذا كان المطلوب إيجاد البعد بين نقطتين على مستقيم
 معلوم يقال

يحدث من المثلث القائم الزاوية م ل م كما في (الشكل ١٤٨)
 $\text{م م} = \text{م ل} + \text{ل م} = \text{ا} - \text{و} = \text{سه} + (\text{صه} - \text{صه})$
 فإذا كان المطلوب الآن إيجاد البعد بين النقطتين م و م كما في (الشكل ١٤٩)
 يعلم من (بند ١٦٢) $\text{سه} = \text{سه}$ و $\text{صه} - \text{صه} = \text{صه} = \text{صه}$
 فإذا وضع هذان المقداران في القانون حدث م م أو

$$\text{و} = \text{ا} + (\text{صه} - \text{صه}) = \text{ا} + \text{صه} = ١٩,٣٦ + ٤ = \text{صه} = ٢٣,٣٦$$

أو

$$\text{و} = ٤,٨٣٣٢$$

(المسألة الخامسة) إذا كان المطلوب إيجاد نقطة بعيدة عن أخرى معلومة
 بمقدار معلوم على مستقيم معلوم يقال

إذا فرضت م النقطة المطلوبة يلزم معرفة م م أو سه و م م أو
 صه وقد علم من (بند ١٦٢) $\text{صه} - \text{صه} = \text{صه} = \text{صه}$
 ثم يحدث من المثلث القائم الزاوية م م م

$$\text{و} = \text{سه} + (\text{صه} - \text{صه}) = \text{سه} + \text{صه} = \text{صه} = \text{صه}$$

$$= \frac{س٢ [س٢ + (ص٢ - ص٢)]}{س٢} \text{ ومنه ينتج}$$

$$س٢ = \frac{س٢ + (ص٢ - ص٢)}{س٢} \text{ فيكون } س٢ = \frac{س٢}{س٢} + \frac{س٢}{س٢} = \frac{س٢ + س٢}{س٢}$$

$$\text{ويستخرج من (بند ١٦٢) } ص٢ = \frac{س٢ + (ص٢ - ص٢)}{س٢} + \frac{س٢}{س٢}$$

فاذا كان المطلوب الا ان يؤخذ على المستقيم و كافي (الشكل ١٥١)
طول يساوي $س٢$ بالابتداء من النقطة م يفرض بعد نقل البعد الافقي

$م م$ على المقياس الاختصاري كافي (الشكل ١٤٦) ان هذا البعد
وجد مساويا $٠.٢٧ ر٢$ فيستخرج منه $س٢ = ٢٧ ر٢$ ومن المعلوم
ان معنا زيادة عن ذلك $ص٢ = ١٨ ر٢$ و $ص٢ = ٢٥ ر٢$ فبأبدال
تلك الحروف بمقاديرها في القوانين المتقدمة يحدث

$$س٢ = \frac{٢,٧ \times ٦}{٢٧ + (٢,٧)} + \frac{١٦,٢}{٦,٢٩}$$

$$= \frac{١٤٧٧٨,٢٧٦٦}{٥٦,٢٩} + \frac{٥٦,٢٩}{٥٦,٢٩} = \frac{١٢١٥٦,٦٣}{٥٦,٢٩} + \frac{٢,١٥}{٥٦,٢٩}$$

$$= \frac{١٢١٥٦,٦٣}{٥٦,٢٩} + \frac{٢,١٥}{٥٦,٢٩} \text{ فاذا اخذ من كلتا جهتي}$$

$م$ طول يساوي المقدار $٠.٢١٥ ر٢$ المأخوذ بالمقياس الاختصاري
كافي (الشكل ١٤٧) تحصل نقطتان $م$ و $م$ هما المسقطان
الافقيان للنقطتين المطلوبتين ومن حيث ان $س٢$ معلوم فلاجل ايجاد مقداري
البعدين $ص٢$ و $ص٢$ يستعمل هذا القانون

$$ص٢ = \frac{س٢ + (ص٢ - ص٢)}{س٢} \text{ الذي يحدث منه}$$

$$ص٢ = \frac{١٨ + (١٨ - ١٨)}{١٨} + \frac{١٥٠,٥}{٢٧} = \frac{١٥٠,٥}{٢٧} + ١٨ = ٥,٥٧ ر٢$$

فيكون حينئذ مقدار بعد النقطة $م$ هو $ص٢ = ٢٣,٥٧ ر٢$ ومقدار
بعد النقطة $م$ هو $ص٢ = ١٢,٤٢ ر٢$ بالتقريب فيكون للكمية

$س٢$ مقداران متساويان ومختلفا لفا لاشارة لانه يمكن اخذ النقطة $م$ من

كلمات جتهى $\text{م}^{\text{و}}$ مقداراً ص يقابلان بالتوالى هاتين النقطتين اللتين لا بد
وان يكون مقداراً بعدهما مختلفين

(١٦٧)

اذا توازى مستقيمان توازى مسقطاهما الاقعيان بالضرورة وترايدت مقادير
ابعاد نقطتهما فى جهة واحدة ويلزم ان يكون البعدان الاقعيان لنقطتين من
كل مستقيم مناسبين لفاضل مقدارى بعدهما انظر (بند ٢٢)
وبالعكس اى اذا توفرت هذه الشروط لا بد وان يكون المستقيمان متوازيين
فيسهل حينئذ مد مستقيم موازلاً آخر معلوم من نقطة معلومة

(١٦٨)

(المسئلة السادسة) اذا كان المطلوب ايجاد الزاوية الواقعة بين مستقيمين
يقال

اذا لم يتقاطع المستقيمان المفروضان يمد من نقطة ما موازيان لهما انظر (بند ١٦٧)
فتكون الزاوية الواقعة بينهما هى الزاوية المطلوبة ولايجاد هذه الزاوية يمكن
استعمال طريقين نذكرهما فنقول

*(اولاً) يؤخذ على المستقيمين ا و ب كما فى (الشكل ١٥٢) نقطتان
متحدتان مقدارى البعدين ولذا يبحث على المستقيم ب عن النقطة ع التى
يساوى مقدار بعدها مقدار البعد المعلوم للنقطة م من المستقيم ا فيكون
المستقيم م ع حينئذ اقياً ومساوياً للمسقطه م ع انظر (اولاً من بند ٥٦) واذا
بحث عن الطولين ع و م كما فى (بند ١٦٣) للجزءين د م و د ع من المستقيمين
 ا و ب علمت ثلاثة اضلاع المثلث د م ع فيمكن حينئذ ان يستخرج من ذلك
الزاوية المطلوبة م د ع فاذا فرض ان المستقيم ا معلوم بالنقطة د التى مقدار

بعدها (٣,٥) وبالنقطة م التى مقدار بعدها (٨,٢) وبالمسقط $\text{د م} = ٠,٢$
وان المستقيم ب معلوم بالنقطة د التى مقدار بعدها (٥,٣) وبالنقطة
التي مقدار بعدها (٤,٢) وبالمسقط $\text{د ه} = ٠,٤٥$

يُحصل أولا النقطة \bar{c} بواسطة القانون المقرري (بند ١٦٣) فيكون

$$\bar{c} = \frac{(2.8 - 3.5) \cdot 0.40}{1.22 - 3.5} = \frac{3.15}{2.26} = 1.40$$

بالتقريب ثم يحدث من القانون المقرري (بند ١٦٥) $\bar{e} = 0.49 + 4 = 4.49$

$$= 1.12 \text{ و } \bar{m} = 1.96 + 0.49 = 2.45$$

و $\bar{w} = 1.40$ ثم يستخرج من علم المثلثات هذان القانونان

$$\frac{s(s-w)}{m} = \frac{1}{f} d$$

$$\frac{s(s-m)(e-s)}{s(s-w)} = \frac{1}{f} d$$

بجعل $s = m + n + w$ وبوضع المقادير المقدمة وهي $m =$

$$1.06 \text{ و } e = 4.49 \text{ و } w = 1.40 \text{ في القانون}$$

المذكور ينتج

$$s = \frac{1.06 + 4.49 + 1.40}{2} = 3.48 \text{ فيكون}$$

$$s - m = 2.42 \text{ و } s - n = 2.42 \text{ و } s - w = 2.08$$

ومن هنا ينتج

$$\frac{2.42 \times 2.08}{1.14 \times 3.48} = \frac{1}{f} d \text{ فينتج بالضرورة}$$

$$\frac{1}{f} d = \frac{1}{f} \log 2.42 + \frac{1}{f} \log 2.08$$

$$+ \frac{1}{f} \log 3.48 = \frac{1}{f} \log 2.42 + \frac{1}{f} \log 2.08 + \frac{1}{f} \log 3.48$$

$$= 0.3861304 + 0.3117246 + 0.5413814 = 1.2392364$$

$$+ 0.5413814 = 1.7806178$$

$$\log d = 1.7806178 \text{ فيكون } d = 60.29$$

(وثنائيا) * يمكن اخذ طولين متساويين على الضلعين a و b من

الزاوية المطلوبة ولذلك يؤخذ على a نقطة m ويبعث عن m الخط الحقيقي

للمستقيم د م انظر (بند ١٦٥) ثم نعين على ب نقطة د بحيث يكون د = د م انظر (بند ١٦٦) ويوصل م الى د ويبحث ايضا عن الطول الحقيقي للمستقيم م د فيعلم ثلاثة اضلاع المثلث د م د وحينئذ تحسب الزاوية د بواسطة القوانين المستخرجة من حساب المثلثات ولم نطبق هذه الطريقة على مثال السهولة التي نرى عليها

* (١٦٩) *

* (المسئلة السابعة) * اذا كان مستو معلوما بمقياس ميله ومسقط نقطة منه والمطلوب ايجاد مقدار بعدهما يقال

مقياس الميل كما في (الشكل ١٥٣) حيث كان معيناً بمسقطه ه و بمقداري بعدى النقطتين م و د اللذين هما (٣٥ و ٢٣) و (١٢ و ٢٨) وكانت المسافة م د مساوية ٥٠٠ م يبحث اولاً عن النقطتين ع و ك اللتين مقداراً بعدهما بالتوالي العددين الصحيحان ٣ و ٨ انظر (بند ١٦٢) ثم تقاس المسافة ع ك وتقسّم الى خمسة اجزاء متساوية ويكتب بجوار نقط هذه التقاسيم ٤ و ٥ و ٦ و ٧ وبهذا يسهل مد القسمة وايجاد اى نقطة اريد معرفتها لكن يمكن الاستغناء عن ذلك متى اريد ويكفي التنبيه الى ان النقطة س توجد على افق من المستوى الذي يكون مسقطه الافق ط عموداً على ه ويقطع ه في نقطة ر يبحث عن مقدار بعدهما انظر (بند ١٦٣) فيكون عين مقدار بعد النقطة س

وليفرض مثلاً ان النقطة ر قد وقعت بين النقطتين م و د وان م ر = ٣٦٠٠ م معلوم في القانون المقرر في (بند ١٦٢) وهو

$$\frac{ص}{ص + س} = \frac{ص}{ص - س}$$

ان ص = ٣٥٤ و ص = ١٢٨ و س = ٢٥ و س = ٣٦ فيكون

صه - صه = ٨,١٢ - ٣,٥٤ = ٤,٥٨ فيحدث
حينئذ بالتبديل

$$\text{صه} = ٣,٥٤ + \frac{٣,٦ \times ٤,٥٨}{٥} = ٤,٥٨ + ٣,٥٤ = ٨,١٢$$

$$\times ٠,٧٢ = ٣,٥٤ + ٣,٢٩٧٦ \text{ فيكون حينئذ مقدار}$$

البعد المطلوب للنقطة س هو صه = ٦,٨٣٧٦

ويرسم مقياس الميل لمستويين متوازيين متقاربين جدا ويقسم دائما الى
اجزاء متساوية بحيث تصنع مقادير ابعاد نقط التقاسيم سلسلة اعداد صحيحة لانه
يسهل حينئذ ايجاد مقادير ابعاد عدة نقط المستوي المختلفة

(١٧٠)

(المسئلة الثامنة) اذا كان المطلوب ايجاد تقاطع مستويين يقال
ان هذه المسئلة قد تقدم حلها في (بند ١٠٠) باستعمال مسقطين فينبغي
اجراء العمليات التي اجريت في حلها غاية ما فيه يعوض المساقط الرأسية
بمقادير الابعاد فيقال

(اولا) اذا لم يكن المسقطان هـ و هـ كما في (الشكل ١٥٤)
لمقياسي الميل متوازيين يؤخذ نقطتان م و ن على هـ مقدارا
بعديهما العددين الصحيحين ٨ و ٣ انظر (بند ١٦٣) ويقاس البعد
الافقي م ن الذي وجد مساويا ٠,٧٢ و ٢٠ ويبحث على هـ عن نقطتين
م و ن متحدتين في مقدارى بعديهما مع النقطتين الاوليين وهما ٨ و ٣
ويقاس البعد الافقي م ن الذي وجد مساويا ٠,٤٣ و ٢٠ ثم يمتد من
النقطتين م و ن بافتيان ط و ط يتقاطعان في نقطة ط من
التقاطع المطلوب مقدار بعدها (٨) ويمد كذلك من النقطتين ن و ن
افقيا آخران ح و ح يتقاطعان في نقطة اخرى ح من النقاط الذي
تم تعيينه بهما مقدار بعدها (٣)

(وثانيا) اذا كان المسقطان هـ و هـ متوازيين كما في (الشكل ١٥٥)
فلا يتقاطع حينئذ المستقيمان ط و ط والمستقيمان ح و ح الا ان المسقطي

في هذه الحالة يكون موازيا τ و τ و مارا ولا بد من نقطة تقاطعهما
 اللانهاية ولايجاد نقطة منه يؤخذ على τ و τ تقطعتان حينما اتفق
 τ و τ يوصلان بمستقيم α ثم يد على α و α مستقيم β
 مواز α فيصير هذان المستقيمان α و β اقليين لمستو ثا ث قاطع
 للمستويين المقروضين في مستقيمين α و α يتقاطعان في نقطة α
 من النقاط المطلوب فاذا م د الان من α مواز للمسا قاطع الا فقية لافقيان كان
 هو α ويمكن لايجاد مقدار بعد النقطة α حساب هذا المقدار على احد
 المستقيمين α و α ويمكن ايضا التنبيه على ان التقاطع α حيث
 كان اقليلا لا بد ان يقابل α و α في نقطتين متحدثي مقدار البعد وهذا
 المقدار هو عين مقدار النقطة α ايضا

* (وثالثا) * من البين انه اذا م د مستقيمان آخران كيف ما اتفق ك مستقيمي
 α و β امكن ايجاد عدة نقط كالنقطة α مهمما اريد من التقاطع
 α فينتد هذا الحل يليق ايضا بالحالة التي يصنع فيها المسقطان الافقيان
 α و α بدون ان يتوازي زاوية صغيرة جدا بحيث لا يمكن تلاقي المستقيمين
 τ و τ والمستقيمين α و α الا خارج حدود الرسم ويوجد كما تقدم في الحالة
 الثانية تقطعتان بالوصل بينهما يحدث α ولايجاد مقدارى بعدى النقطتين
 α و α يمكن ان يمد من هاتين النقطتين افقيان لا حد المستويين
 ويبحث عن مقدارى بعدى النقطتين اللتين يقابل فيهما هذان الافقيان
 مقياس الميل

* (المسئلة التاسعة) * اذا كان المطلوب ايجاد تقاطع مستقيم مع مستو
 يقال
 يمد من نقطة من المستقيم المعلوم و كافي (الشكل ١٥٦) مستقيم ما
 τ يعتبر اقلييا المستو مارا بالمستقيم و ثم يمد في المستوى المعلوم افقي α

متحد مقدار البعد مع المستقيم ط فيكون كل من هذين المستقيمين ط و ح في مستواقي ويتقاطعان في نقطة س من تقاطع المستوي المعلوم مع المستوي (و ط) فاذا مد مستقيمان اقيان آخران ط و ح متحد المقدار ايضا تقاطعا في نقطة ثانية س من التقاطع ي الذي تم تعيينه بما والذى يقابل المستقيم و في نقطة ن وهي النقطة المطلوبة

(المسئلة العاشرة) اذا كان المطلوب انزال عمود من نقطة معلومة على مستوي معلوم يقال

حيث كان مسقط العمود عمودا على مسقط افق المستوي لزم ان يكون موازيا هـ وان تكون مقادير الابعاد زيادة عن ذلك في جهة مضادة لجهة مقادير ابعاد مقياس الميل وان يكون ميلا هذين المستقيمين متممان لبعضهما وبيان ذلك ان يفرض من النقطة التي يقابل فيها العمود ن المستوي خط اعظم ميلا ا فيكون المستوي (ا ن) رأسيا فاذا اعتبر مستويا رأسيا للمسقط كما في

(الشكل ١٥٧) كان ا و ن على خط الارض خ ض وتقاطع المستقيمان ا و ن في نقطة س وصار عمودين على بعضهما فتكون الزاويتان الواقعتان بينهما وبين خ ض متممتين لبعضهما فينتج ظا - = ظت

ا لكن اذا انزل عمود س هـ على خ ض ومد الاقيان ال و د ك
نتج ظت ا = ال / س هـ و ظا - = س هـ / د ك ومنه ينتج
ال : س هـ :: س هـ : د ك

بحيث لو اخذ د ك = س هـ لتحصل س هـ = ال فينتج

اذا اخذ على هـ كما في (الشكل ١٥٨) البعد م م = ٢٠, ٦٥

على مقتضى المقياس الاختصاري وكان فاضل مقداري البعدين

صه - صه = ٢٥ واخذ بالمقياس المذكور البعد ع ع = ٢٥

(١٥٣)

على \hat{N} تحصل $\hat{V} - \hat{V} = \hat{V} = ٦٥, ٢٠$ وينتج بالضرورة
 $\hat{V} = \hat{V} - \hat{V} = ٦٥, ٢٠ - ١٨, ١٧ = ٢٠, ٦٥ = ٤, ٥٣$

(١٧٣)

(المسئلة الحادية عشر) اذا كان المطلوب مد عمود من نقطة معلومة على
 مستقيم معلوم يقال

يبدأ أولاً من النقطة ع مستو عمود على المستقيم المعلوم و فيكون مسقط
 مقياس ميله ه موازياً و ثم يبحث عن التقاطع س للمستقيم
 و مع المستوى فيكون موقع العمود المطلوب ويكون هذا العمود حينئذ
 المستقيم الواصل من النقطة الحادثة م الى النقطة المعلومه ع

(١٧٤)

(المسئلة الثانية عشر) اذا كان المطلوب ايجاد الزاوية الواقعة بين مستقيم
 ومستوي يقال

ينزل من نقطة من المستقيم عمود على المستوى انظر (بند ١٧٢) ثم يبحث عن
 الزاوية الحادثة من هذا العمود والمستقيم المعلوم انظر (بند ١٦٨) فتكون
 هي المئمة للزاوية المطلوبة انظر (ثانياً من بند ١١٩)

(١٧٥)

(المسئلة الثالثة عشر) اذا كان المطلوب ايجاد الزاوية الواقعة بين مستويين
 يقال

ينزل من نقطة اختيارية م عمودان \hat{N} و \hat{M} على المستويين المعلومين
 انظر (بند ١٧٢) فتكون الزاوية الحادثة من هذين العمودين كما في
 (بند ١٦٨) هي قياس الزاوية الواقعة بين المستويين المذكورين انظر
 (ثامناً من بند ١٢٧)

(١٧٦)

(المسئلة الرابعة عشر) اذا كان المطلوب ان يمد من مستقيم معلوم مستو
 يصنع مع مستوى الاقتران زاوية معلومة يقال

ان ميل اى مستو على مستوى الاقتران يساوى ميل مقياس ميله وليكن مقدار
الميل المعلوم للمستوى المطلوب على مستوى الاقتران $\frac{5}{4}$ فاذا مد من النقطة
م كمافى (الشكل ١٥٩) خط اعظم ميلا فى المستوى المطلوب وفرض
معرفة الاثر الافقى ١ لهذا الخط الاعظم ميلا حدث مثلث ام م فيه
 $\frac{م}{م} : \frac{م}{م} :: ٥ : ٤$ ومن حيث ان $\frac{م}{م} = \frac{٢١٣}{٢١٤}$ يكون
 $\frac{م}{م} = \frac{٢١٤}{٢١٥}$ فاذا حول هذا البعد الى المقياس المتفق عليه
فى (بند ١٦١) صار ١٠٤ ر ٠ فيلزم حينئذ جعل النقطة م مركزا
واخذ نصف قطر يساوى ١٠٤ ر ٠ رسم محيط دائرة ومن المعلوم ان
الاثر الافقى للمستوى لا بد ان يمر بالاثرين الاقبيين للمستقيم المعلوم والخط
الاعظم ميلا وانه زيادة على ذلك لا بد وان يكون عمودا على المسقط الافقى للخط
الاعظم ميلا فيلزم ان يكون مماسا للدائرة المذكورة ومارا من الاثر الافقى
للمستقيم و المعلوم لكنه قد يتفق وقوع هذا الاثر الافقى خارج حدود الرسم
وان يكون نصف قطر الدائرة كبيرا الا انه يمكن ان يوضع الشكل على مستو
مواز للمستوى الاقتران وان ينتخب مثلا المستوى المار بالنقطة د المساوى
مقدار بعدها ٧ فينتز لا يكون مقدار بعد النقطة م المنتسبة الى هذا
المستوى الجديد الا $\frac{٢١٣}{٢١٤} = \frac{٢١٤}{٢١٥}$ وهذا هو ارتفاع المثلث
القائم الزاوية وينتج من ذلك قاعدة هذا المثلث او قطر الدائرة بواسطة هذه
المناسبة

$\frac{٢١٤}{٢١٥} : \frac{٢١٤}{٢١٥} :: ٥ : ٤$ ومنه ينتج $\frac{٢١٤}{٢١٥} = \frac{٢١٤}{٢١٥}$ $\frac{٢١٤}{٢١٥} = \frac{٢١٤}{٢١٥}$
ثم ان المستوى المار من النقطة د يقطع المستوى المطلوب فى خط افقى
يكون مسقطه الافقى عمودا على مسقط الخط الاعظم ميلا فاذا رسم بجعل
النقطة م مركزا واخذ نصف قطر يساوى ١٠٤ ر ٠ محيط دائرة ج
ومد من النقطة د خط مماس له فى النقطة ع كان المستقيم م ع مسقط

مقياس ميل المستوى المطلوب ويمكن ان يمد من النقطة د خط آخر مماس و
للدائرة ج وبالوصل بين نقطة التماس ع والنقطة م يتحصل مسقط
مقياس ميل مستوي آخر يليق بمحل المسئلة المفروضة

فاذا كانت النقطة د على الدائرة اي اذا كان م و يساوي ٢٠٤٨ و
كان للمسئلة حل واحد وكان المستقيم و نفسه مقياس ميل المستوى لان
ميل المستقيم و في هذه الحالة يكون مبينا بهذه النسبة

$$\frac{٥}{٤} = \frac{٦٠}{٤٨} = \frac{٧-١٣}{٤,٨}$$


ولا حل للمسئلة اذا كانت النقطة د داخل الدائرة او كان م و اصغر من
 ٢٠٤٨ لان ميل المستقيم و يكون حينئذ اكبر من $\frac{٥}{٤}$ فلا يمكن
ايجاده بالضرورة على مستوي يساوي مقدار خطه الاعظم ميلا على مستوى
الاقتان ميلا مساويا $\frac{٥}{٤}$

(في المساقط المائلة والظلال الساقطة)

اذا اسقطت نقطة فراغية اسقاطا عموديا ثم مائلا على مستوي يكون المستقيم
الواصل بين المسقطين بالضرورة المسقط العمودي للمستقيم المسقط للنقطة
اسقاطا مائلا فاذا كان في الفراغ عدة نقط وكانت المستقيمت المسقطات لها
اسقاطا مائلا متوازية لزم ان تكون مساقطها متوازية ايضا ويكون حينئذ
مسقطا كل نقطة من النقط المذكورة على مستقيمت كلها متوازية اذا تقرر
هذا سهل بعد معرفة مسقطي مستقيم ومسقطي نقطة عليهما معرفة مسقطي
اي نقطة من هذا المستقيم

ومن المعلوم ان اثر المستقيم على مستوى المسقط الذي يعتبر هنا افقيا لا بد من
وجوده على كلا مسقطي المستقيم ويكون بالضرورة في النقطة التي تقاطع

فيها هذان المسقطان

واذا كان المستقيم اقصيا  كان مسقطاه متوازيين واذا كان رأسيا
 آل مسقطه العمودي الى نقطة الا ان المسقط المائل يكون مستقيما مارا بهذه
 النقطة وموازيا للمستقيمين الواصلين بين مسقطي نقطة واحدة فاذا كان المستقيم
 موازيا للمستقيم المسقط اسقاطا مائلا لنقطة صار مسقطه المائل نقطة وكان
 مسقطه العمودي مستقيما مارا بهذه النقطة وموازيا للمستقيمين الواصلين بين
 مسقطي نقطة واحدة

ثم اذا كان مستقيمان متوازيين لزم ان يكون مسقطاهما المتحد الاسم متوازيين
 ايضا

(١٧٨)

قد يكون الاثر الافقي لمستو عمودا على المسقط العمودي لخطه الاعظم ميلا
 ويكون مسقطا مستقيما افقي من المستوى المذكور موازيين للاثر المذكور انظر
 (بند ١٧٥) وبمقتضى هذا تحل المسئلة الخامسة عشر

(المسئلة الخامسة عشر) اذا كان المعلوم المسقط العمودي لنقطة على
 مستو والمطلوب ايجاد مسقطها المائل او العكس يقال

(اولا) ليكن $و$ كما في (الشكل ١٦٠) الخط الاعظم
 ميلا لمستو $و$ نقطة من هذا المستقيم فلا تعين هذه النقطة في الفراغ

عادة الا متى علم ميل الخطوط المسقطة اسقاطا مائلا $و$ $م$ المسقط
 العمودي لنقطة $م$ من المستوى ويمكن فرض الافقي $ب$ مارا بالنقطة
 المعلومة وداخلا في المستوى فير مسقطه الافقي $ب$ بالمسقط $م$ ويكون
 عمودا على $و$ وحيث كان المستقيمان $ب$ و $و$ موجودين في مستو

واحد لزم ان يتقاطعا في نقطة $م$ مسقطها العمودي في $م$ على تقاطع
 $و$ $ب$ فاذا مد حينئذ من $م$ مواز للاتجاه $ا$ للخطوط المسقطة

اسقاطا مائلا كانت النقطة ظ التي يقابل فيها الموازي المذكور و المسقط المائل للنقطة م من المستقيم ب لكن حيث كان هذا المستقيم افقيا كان ب موازيا ب انظر (بند ١٧٦) ثم حيث كانت النقطة س موجودة على المستقيم ب يمد من النقطة س موازيا ا يقطع المستقيم ب في النقطة المطلوبة ظ

(وثانيا) اذا كان و هو الخط الاعظم ميلا للمستوى و نقطة من هذا المستقيم و ظ المسقط المائل لنقطة س كائنة على المستوى يمد من هذه النقطة س افقيا ب للمستوى فيكون مسقطا هذا الافق متوازيين ويكون المستقيم ب عمودا على و فيكون حيث ب عمودا ايضا على و ومارا بالنقطة ظ وحيث كان المستقيمان ب و و في مستوى واحد يلزم ان يتقاطعا في نقطة م مسقطها المائل ظ الذي هو تقاطع المستقيمين و ب ومنه ينتج م واذا مد من هذه النقطة مستقيم يوازي ب كان هذا المستقيم ب ثم اذا مد من النقطة ظ موازيا ا قطع ب في نقطة س وهي النقطة المطلوبة

(المسئلة السادسة عشر) اذا علم المسقطان العموديان لنقطة ميل واتجاه المستقيمتين المسقطتين وكان المطلوب ايجاد المسقط المائل لهذه النقطة على المستوى الافقي يقال

يلزم ان يمد كافي (الشكل ١٦١) من النقطة المعلومة م مستقيم ب مواز للمستقيم المعلوم و انظر (بند ٢٤) ويبحث عن اثره الافقي فيكون هو المسقط ظ المطلوب ويمكن ايضا التوصل الى الحالة التي يكون فيها المستقيم و موازيا للمستوى الراسي بتغيير مستو واتخاب خط الارض الجديد مارا

بالنقطة $\text{م}^{\text{ن}}$ فيثبت يكون المستقيم ب في المستوى الرأسى صانعا مع
 $\text{خ}^{\text{ن}}$ زاوية كزاوية المستقيم و مع المستوى الافقى وقاطعا $\text{خ}^{\text{ص}}$
 في النقطة ظ المطلوبة

وهذا الحل الاخير هو الواجب استعماله متى فرضت النقطة م معلومة
 بمسقطها الافقى وبمقدار بعدها كما في (الشكل ١٦٢) وفرض
 المستقيم و ايضا معلوما بمسقطه الافقى وميله ا او معلوما بمقدارى
 بعدى نقطتين منه يمكن ان يستنتج منهما هذا الميل فيثبت $\text{م}^{\text{ن}}$ المستقيم
 ب موازيا للمستقيم و ويقام $\text{م}^{\text{ن}}$ عمودا على ب ومساويا لمقدار
 بعد النقطة م المختصر بالمقياس المتفق عليه اذا لم تكن الصورة على مقدارها
 الطبيعى التى وجدت عليه ويعد من النقطة م مستقيم ب يصنع مع ب
 الزاوية ا فتكون النقطة ظ التى هى تقاطع ب و ب
 المسقط المائل المطلوب

فاذا دل المستقيم و على اتجاه الشعاع الضوئى كانت هذه النقطة $\text{م}^{\text{ظ}}$ هى
 الظل الساقط من النقطة م على المستوى الافقى ويتحصل كذلك ظلها
 الساقط على المستوى الرأسى

(المسئلة السابعة عشر) اذا علم مسقط نقطة وظلها الساقط وميل الشعاع
 الضوئى وكان المطلوب ايجاد مقدار بعدها يقال

اذا وصل كما في (الشكل ١٦٢) بين المسقطين $\text{م}^{\text{ن}}$ و م للنقطة م
 بمستقيم دل هذا المستقيم على المسقط العمودى للمستقيم ب المسقط
 اسقاطا مائلا للنقطة م فاذا مد حيث ثبت من النقطة $\text{م}^{\text{ظ}}$ مستقيم ب
 صانع مع ب الزاوية ا المساوية للميل المعلوم للشعاع الضوئى واقيم من

م عمود على ب ومد الى ان يتلاقى مع ب في النقطة م كان المستقيم
م م مساويا مقدار البعد المطلوب للنقطة م

(١٨١)

(المسئلة الثامنة عشر) اذا كان المطلوب ايجاد الظل الساقط من شكل ما
كثير السطوح على المستوى الافقى يقال

ليفرض ان المطلوب ايجاد الظل الساقط على المستوى الافقى لهرم ناقص
مثلا غير متوازي القاعدةتين كفى (الشكل ١٦٣) ولنعبر المستوى الافقى
مستوى القاعدة ا - ب ج د ه للهرم فيمكن ان تكون نقط المقطع معلومة
بمسقطين عموديين او معلومة بمسقطها الافقية وبمقادير ابعادها وحيث كانت
هذه المعالم الاخيرة موصلة بدون واسطة الى تعيين المسقط الرأسى يفرض
الهرم الناقص معلوما بمسقطيه ويؤخذ زيادة على ذلك المستوى الرأسى عمودا
على مستوى المقطع ويمكن التوصل الى هذه الحالة دائما باستعمال تغير مستو
رأسى ثم يفرض المستقيم ر الذى هو اتجاه الاشعة الضوئية معلوما بمسقطه

ر وميله ا على المستوى الافقى يتحصل مسقطه الرأسى ر اذا تقر هذا
نعين المساقط المائلة للرؤوس ا و ب و ج و د و ه لقاعدة
الهرم الناقص العليا انظر (بند ١٧٩) وبالوصل بينها بمستقيمان
يتحصل المسقط المائل لهذه القاعدة العليا وبالوصل ايضا بين هذه المساقط
والرؤوس المناظرة لها المنتسبة الى انقاعدة ا - ب ج د ه تتحصل المساقط المائلة
لاضلاع الهرم الناقص فن ذلك تتحصل مساقط الواجه المختلفة من هذا
الشكل ولاجل ايجاد الظل الساقط من الهرم الناقص على المستوى الافقى
ننبه اولاً على ان جميع الاشعة الضوئية موازية ر فالمارة من بعض نقط الضلع

س تكون مستويا اثره الافقى س فينتج ان س هو الظل الساقط
لهذا الضلع وان س ا و ا ا الظلان الساقطان من الضلعين س ا و ا ا
وحيث كان المستقيم ا - على المستوى الافقى يكون نفس ظله الساقط

فينتج بالضرورة من ههنا ان الظل الساقط لاي نقطة من الوجه ا - ا -
 يكون في ذى الاربعة اضلاع ا - ا - اي يكون ذوا الاربعة اضلاع هو
 الظل الساقط للوجه ا - ا - ويشاهد ايضا ان ا ه ه و ه ه د د
 و د د ج ج و ج ج - هي الظلال الساقطة من الالوجه ا ه ه و
 ه ه د د و د د ج ج و ج ج - وان ا - ج د ه هو الظل
 الساقط من القاعدة العليا ا - ج د ه ولكن حيث ان الظل الساقط يجب ان
 يكون خارجا عن الهرم يكون من البين وجوده منحصرا في المسافة
 ا - ج د ه ا - ب مع طرح الاجزاء المحصورة في القاعدة
 ا - ج د ه من اذواء الاربعة اضلاع المذكورة
 الا انه يتعرض في نظري الظل زيادة على الظل الساقط للبحث عن معرفة اجزاء
 سطح الجسم المفروض التي تتلقى الاشعة الضوئية او المنيرة والاجزاء التي لاتقع
 عليها الاشعة الضوئية او المظلمة ويتعرض بعد ذلك الى تعيين الخط الفاصل بين
 هذين النوعين من الاجزاء ويسمى هذا الخط بالخط الفارق بين الظل والضوء لكن
 يسهل في مثالنا معرفة انه اذا مدت اشعة ضوئية من جميع نقط محيط الوجه
 ا - ج ج يتكون اربعة مستويات اثارها الافقية المستقيمت ا - ج ج و
 ا - ج ج و ا - ج ج فكل شعاع ضوئي مار في المسافة المحصورة
 بين الاربعة مستويات المذكورة يقابل الوجه ا - ج ج فيكون هذا الوجه
 مضيقا وكذلك الوجهان ج ج د د و ا - ج د ه و حيث كانت الاشعة
 الضوئية الخارجة من نقط مختلفة من الضلعين ا - ج ج و ا - ج د ه خارج
 الوجه ا - ا - كان هذا الوجه في الظل وكذلك الوجهان الاخران
 ا ه ه و ه ه د د ولهذا السبب جعلناها مظلمة فالخط المذكور
 ا - ا ه د د يكون الخط الفارق بين الظل والضوء للسطح المفروض
 وليتنبه الى ان جملة المستويات المتكونة من الاشعة الضوئية الخارجة من

النقط المختلفة للخط المنكسر - أ ه د د والمستوى الافقى والوجهين
 - س ج و ج ع د د كاه اتعين \equiv كثير السطوح السائر للمستقييات
 ظ ظ ظ ظ ظ ظ
 ا ا ه ه و ج ج و س ج و ج د ولهذا رسمت تلك الخطوط
 منقطة واما الظل الساقط من الخط الفارق بين الظل والضوء فقد رسمه ممتلئا
 دون غيره وهذه هي كيفية التنقيط متى اريد حل مسألة تتعلق بالظل الساقط
 لكن اذا اريد حل مسألة بسيطة متعلقة بالمساقط يلزم حيث كانت الخطوط الاخر
 مساقط للخطوط المرئية ان ترسم هذه ممتلئة ايضا

اذا علم المسقط الافقى والظل الساقط لكثير السطوح على المستوى الافقى وكذا
 ميل الاشعة الضوئية سهل ايجاد المسقط الرأسى لكثير السطوح او مقادير ابعاد
 جميع رؤسه فيكون بالضرورة هذا الكثير السطوح معيننا تعينا تاما بواسطة
 هذه المعاليم وليكن معلوما المسقط الافقى ا ب ج د ه ا ب ج د ه لهرم ناقص
 ذي خمسة اوجه و ا ه د د ه ا ب - ظله الساقط على المستوى الافقى
 و ا ميل الشعاع الضوئى فيؤخذ ر موازيا ا ا او موازيا -
 فيدل هذا المستقيم على المسقط الافقى للشعاع الضوئى ويمد ر صانعا مع
 ر الزاوية ا فيكون هو الشعاع الضوئى فى المستوى الرأسى المسقط له
 ويمكن ايجاد مسقطه الرأسى ر على مستويا رأسى خ ض ثم
 حيث كانت النقط - و ا و ه و د آثارا افقية للمستقييات الموازية
 ر المارة بالتوالى من الرأس - و ا و ه و د للهرم الناقص
 يقال اذا سقطت هذه النقط على خط الارض فى - و ا و ه و د ومد
 من هذه النقط خطوط توازى ر كانت النقط - و ا و ه و د
 فى تقاطعات هذه المستقييات مع الخطوط الاعمدة على خ ض النازلة من النقط

و ا و ه و د ولايجاد ا رأس الخامسة ج ينبه على انه اذا علم
 ج وجد ج كما وجدت المساقط الرأسية للرؤس الاخرى ويمكن تحصيل
 هذه النقطة ج لان من المعلوم ان المستقيمان ا ا و س و
 د و ه ه التي هي المساقط المائلة لاضلاع الهرم تتلاقى في النقطة س
 التي هي مسقط الرأس س الكثير السطوح المذكور وحينئذ لا بد وان توجد
 هذه النقطة ج على المستقيم ج س وحيث كانت على خط يوازي ر
 مار من ج لزم ان توجد على تقاطع هذين الخطين وتكون النقطة س
 المعتبرة خارج حدود الرسم غالباً ولا تحصل النقطة ج المذكورة بواسطة
 هذه الطريقة لكن في هذه الحالة يد من ج خط يوازي ج س مقابل
 للخط س س في نقطة س فيكون المستقيم ج س مسقطاً افقياً
 لمستقيم ج س كائن في مستوى الوجه س ج س و مواز للخط س ج
 ومسقطاً لافقي من هذا المستوى بالضرورة فلو اخذ حينئذ المسقط المائل س
 للنقطة س كما في (بند ١٧٧) ومد من النقطة س خط يوازي
 س ج او س ج كان هذا المستقيم المسقط المائل للخط س ج
 كما في (بند ١٧٧) واشتغل بالضرورة على النقطة ج الكائنة ايضاً
 على خط يوازي ر مار من النقطة ج وبهذه الكيفية يوجد المسقط المائل
 لاي رأس ليست على الخط الفارق بين الظل والضوء

* (في المساقط المخروطية وفي المنظور) *

اذا علمت نقطة ثابتة في الفراغ و ونقطة ما م يكون وم

خطا مسقطا للنقطة م وتكون النقطة التي يقابل فيها هذا الخط
مستويا معلوما مسقطا مخروطيا وقطبيا للنقطة م حيث كانت النقطة و
قطب هذا المسقط فاذا اسقط كذلك جميع نقط جسم كان المسقط المخروطي
المتحصل حينئذ هو الظل الساقط من الجسم المذكور على مستوى المسقط اذا
كانت النقطة و نقطة مضيئة او كان المسقط المذكور هو منظور الجسم
اذا كانت هذه النقطة عين الناظر ويلزم مع ذلك لايجاد الظل الساقط ان
يكون الجسم المستضيء موضوعا بين النقطة المضيئة ومستوى المسقط والا فلا
يكون الا مجرد مسقط مخروطي وقد ذكر في نظري المنظوران المستوى الذي
يقع عليه المسقط المخروطي ويسمى بمستوى المنظور يكون في العارة موضوعا
بين الجسم وعين الناظر ولا مانع من وضعه وراء الجسم المسقط اسقاطا
مخروطيا على هذا المستوى

(١٨٤)

وحيث كانت جميع المستقييات المسقطة اسقاطا مخروطيا لجميع نقط جولة مارة
بالقطب و فن الواضح ان جميع المساقط العمودية لهذه المستقييات على
المستوى الهندسي المعتبر هنا افقيا تمر بالنقطة و انظر (بند ١٥٩)
وتمر كل مساقطها على مستوى المنظور بالنقطة و التي هي اثر العمود
النازل من النقطة و على هذا المستوى

والمسقطان الافقي والقطبي للنقطة م يكونان بحيث لو وصل بين م و
بمستقيم و لقابل هذا المستقيم قاعدة مستوى المنظور في موقع العمود النازل
من م على هذه القاعدة

(١٨٥)

المسقط المخروطي لمستقيم يكون مستقيما هو تقاطع مستوى المنظور مع
المستوى المار بالمستقيم والنقطة و وحيث كانت جميع المستويات المسقطة
الماثلة بالنقطة و متقاطعة ينتج حينئذ انه اذا فرض مستقيمان و و

متوازيان تقاطع مستوياهما المسقطان لهما في مستقيم ط يوازي و و
ويقابل مستوى المنظور في نقطة - منها يمر تقاطعا هذين المستويين مع
مستوى المنظور فحينئذ يتقاطع المسقطان المحروطينان او منظورا المستقيمين
المتوازيين ومهما كان عدد المستقيمان المتوازيين مستوياها المسقطه تقاطع
كلها في مستقيم واحد فمر حينئذ مناظر جميع هذه المستقيمان بنقطة واحدة
- تسمى بنقطة التلاقى فاذا فرض عدة جل مستقيمان متوازيين كان لكل
جمله منها نقطة تلاق

فاذا كانت المستقيمان المتوازيين اعمد على مستوى المنظور كان المستقيم ط
عمودا ايضا على مستوى المنظور ولم تكن النقطة - مبيانة للنقطة و ك بل
هي نفسها واذا كانت هذه المستقيمان المفروضة موازية لمستوى المنظور كان
المستقيم ط موازيا ايضا لهذا المستوى وصارت النقطة - منتقلة
فيما لانهاية له فحينئذ مناظر المستقيمان المتوازيين والموازيين لمستوى المنظور
تكون متوازيين واذا كانت المستقيمان المعلومة مائلة بقدر ٤٥° على مستوى
المنظور صنع المستقيم ط ايضا زاوية قدرها ٤٥° مع مستوى المنظور
وقابله في نقطة - بحيث يكون المثلث و - و القائم الزاوية في و
متساوي الساقين فيه و - = و ثم اذا كانت المستقيمان المتوازيين
المذكورة في هذه الحالة افقية كان المستقيم ط اقبيا ايضا وكانت نقطة
التلاقى - والنقطة و ك على مواز واحد لقاعدة مستوى المنظور فتكون
نقطة التلاقى في هذه الحالة مسماة بنقطة البعد ويوجد نقطتا بعد احدهما
في احدى جهتي النقطة و ك والاخرى في الجهة الاخرى المقابلة لهما

يتعين المستوى غير المنتهى باثريه على المستوى الهندسي وعلى مستوى
المنظور كما بينه في حل المسئلة التاسعة عشر

(المسئلة التاسعة عشر) اذا علم المسقط العمودي لنقطة ك كائنة

على مستو معلوم باثر به وكان المطلوب ايجاد مسقطها المخروطي او العكس
يقال

* (اولا) * ليكن $ق$ و $م$ اثنين لمستوى $ر$ و $س$ مسقط
نقطة من هذا المستوى على المستوى الهندسي كما في (الشكل ١٦٤)
فيمر من النقطة $س$ هذه افقي $و$ من المستوى $ر$ فيكون مسقطه $و$
موازيا $ق$ ويقابل مستوى المنظور في نقطة $ا$ من $و$ ويمكن
في ايجاد المسقط الثاني للمستقيم $و$ ايجاد نقطة تلاقي افقيات المستوى $ر$
ومن المعلوم ان احد هذه الافقيات وهو $و$ يوجد مع النقطة $و$ على
مستو افقي ومسقطه $و$ يوازي بالضرورة $خ$ $ض$ ويقابل
مستوى المنظور في النقطة $ا$ المنسقة في $ا$ ومنه ينتج $و$ ثم يتقاطع
المستويان المسقطان للمستقيمين $و$ و $و$ في مستقيم $ط$ مواز لهما ومن
حيث انه يمر بالنقطة $و$ يلزم ان يكون كله في مستوى $(و و)$ فاذا مد
حينئذ $ط$ موازيا $و$ و $ط$ موازيا $خ$ $ض$ كان الاثر $س$ لهذا
المستقيم نقطة التلاق المطلوبة ثم بالوصل بين النقطتين $ا$ و $س$ بمستقيم
ينتج $و$ واذا وصل الآن بين $س$ و $س$ بمستقيم $ب$ ومد هذا
المستقيم الى النقطة $ا$ من $خ$ $ض$ واقم من هذه النقطة عمودا على $خ$ $ض$
الى نقطة تقابله مع $و$ يتحصل المسقط $س$ المطلوب

* (تنبيه) * اذا وصل بين النقطتين $و$ و $س$ بمستقيم $ب$ كان
المستقيمان $ب$ و $ب$ المسقطين العمودين على المستوى الهندسي
وعلى مستوى المنظور للمستقيم $ب$ المسقط اسقاطا مخروطيا للنقطة $س$
* (وثانيا) * اذا علت النقطة $س$ فلاجل ايجاد $س$ بمد من

النقطة س هذه افقى و للمستوى ر فيلزم ان يمر و بنقطة تلاقى
 المساط القطبية لافقيات المستوى وتحصل هذه النقطة كما سبق ثم بالوصل بين
 س و ر ينتج المسقط المخروطى و للافقى المذكور فيقابل م
 فى النقطة ا التى هى اثر المستقيم و على مستوى المنظور وباسقاط هذه
 النقطة على قاعدة مستوى المنظور فى النقطة ا ومد خط يوازى ق منها
 يحصل و فتحصل النقطة المطلوبة س على هذا المستقيم بل وعلى المسقط
 الافقى للمستقيم ب المار من النقطة و الى النقطة س لكن هذا
 المستقيم يقابل مستوى المنظور فى النقطة س المنسقة على خ فى ا
 وبالوصل بين ا و و يحصل مستقيم يقطع و بالضرورة فى النقطة س
 المطلوبة

(المسئلة العشرون) اذا علم المسقطان العموديان لنقطة ومسقطا القطب وكان
 المطلوب ايجاد المسقط المخروطى للنقطة الاولى على مستو معلوم يقال
 ليكن و القطب و م النقطة المعلومة كما فى (الشكل ١٦٥) ويفرض مستوى
 المنظور عمودا على خط الارض ومنطبقا على المستوى الافقى فيلزم ان يكون
 مسقط القطب عمودا دائما على مستوى المنظور ويستعمل لايجاد هذه النقطة و
 تغيير مستوراى انظر (بند ٤٤) وبهذا تؤول المسئلة الى مد المستقيم
 و المبحث عن اثره على مستوى المنظور فيكون المسقط الافقى لهذا الاثر
 المساوى مقدار ارتفاعه الرأسى ا النقطة ا فاذا اقيم حينئذ من
 النقطة ا عمود على خ واخذ $\text{ا م} = \text{ا س}$ تحت النقطة
 المطلوبة م

فاذا كانت النقطتان و م معلومتين بمسقطيهما الافقيين وبمقدارى
 بعدهما يبحث على المستقيم و م عن مقدار بعد النقطة التى تنسقط

في النقطة α انظر (بند ١٦٢) ويؤخذ α مساويا للمقدار المذكور فيحصل المطلوب

(المسئلة الحادية والعشرون) اذا علم مسقطان افقي ومخروطي لنقطة ومسقطا القطب وكان المطلوب ايجاد المسقط الرأسى للنقطة يقال مستوى المنظور هو مستوى رأسى اسقط عليه المستقيم وم انسقاطا عموديا انظر (اولا من بند ١٨٦) وحيث علم المسقطان الافقيان α و β انقطعتين من هذا المستقيم ومقدار الارتفاعهما α و β يقال اذا انزل حيثئذ من α و β عمودان على $\chi\psi$ واخذ $\alpha\alpha' = \beta\beta'$ و $\alpha\alpha' = \beta\beta'$ ووصل بين α' و β' لا يبقى الا انزال عمود من النقطة γ على $\chi\psi$ فيقطع β' في النقطة المطلوبة γ

(المسئلة الثانية والعشرون) اذا كان المطلوب ايجاد منظور كثير سطوح يقال

ليكن المطلوب منظور كثير السطوح المبين في (الشكل ١٦٦) المركب من متوازي السطوح القائم الرأسى والمركب فوقه هرم مربع فيفرض مستوى المنظور عمودا على $\chi\psi$ ثم يطبق على المستوى الرأسى بتدويره حول اثره الرأسى γ وهذا يرجع الى اعتبار المستوى الرأسى مستويا هندسيا ثم يبحث لاجل ايجاد المنظور المطلوب عن مسقط نقطة النظر على مستوى المنظور بان ينزل من النقطة γ على المستوى $\gamma\gamma'$ عمود يقطعه في النقطة γ' ثم تبقى هذه النقطة γ' عند دوران المستوى $\gamma\gamma'$ حول γ بالضرورة على بعد واحد $\gamma\gamma'$ من المستوى الافقى وعلى بعد واحد $\gamma\gamma'$ من المحور $\gamma\gamma'$

فيؤخذ حينئذ على $و$ بعد $و$ = $و$ فينتج لنا النقطة $و$ المطلوبة
ويشاهد ان هذا يرجع الى ان يرسم بجعل النقطة $و$ مركزا واخذ نصف قطر
 $و$ قوس دائرة يقطع $خ$ في النقطة $ا$ وان يقام من هذه النقطة
عمود على $خ$ في النقطة تقابله مع $و$ وتحصل جميع النقط الاخرى
بهذه الكيفية واما النقطة $و$ فيمكن تحصيلها باستعمال مجرد تغيير مستواقي
مع اعتبار $و$ خطا ارضيا جديدا

ثم ان المستقيم $وا$ يقابل مستوى المنظور في نقطة $ا$ تحصل مثل النقطة
 $و$ على مستوى المنظور بان يمد من $ا$ خط يوازي $خ$ فيؤخذ
 $اا' = و$ وتُحصل ايضا جميع النقط الاخرى $ا$ و $ا$... من
المنظور بالكيفية المارة فيصير المستقيم $اا'$ بعد ايجاد المنظورين $ا$ و $ا$
لنقطتين $ا$ و $ا$ منظور المستقيم $اا'$ وكذا يقال في المستقيمات الباقية
فيتحصل حينئذ $اا' اا' اا' اا'$ وهو منظور القاعدة السفلى لتوازي السطوح
 $واا' اا' اا' اا'$ و $اا' اا' اا' اا'$ وهي منظورات
الاجه الاربعة الجانبية الرأسية و $اا' اا' اا' اا'$ وهو منظور القاعدة
العليا و $اا' اا' اا' اا'$ وهو منظور قاعدة الهرم و $اا' اا' اا' اا'$
و $اا' اا' اا' اا'$ وهي منظورات الواجه الاربعة

ومن المعلوم ان الناظر الواقف في النقطة $و$ لا يشاهد الا الوجه $اا' اا'$
من متوازي السطوح وتختفي عنه جميع الاضلاع التي لا تنسب لهذا الوجه
المذكور ولذلك رسمت بخطوط نقطية على الشكل واما الهرم فن المعلوم ان
الضلع $اا'$ منه ظاهر والضلع $اا'$ مخبأ بالكلية لكن الضلعان
 $اا'$ و $اا'$ يشاهدان فوق تقاطعهما مع المستوى $(اا' و)$

اللتين لم يبين الا مسقطيهما الرأسيتين د° و ك° ويوجد منظورا هما
بالضرورة في النقطتين د° و ك° اللتين هما تقاطعا المستقيمين $\text{ك}^{\circ}\text{م}^{\circ}$ و
 $\text{م}^{\circ}\text{ا}^{\circ}$ مع $\text{ه}^{\circ}\text{ف}^{\circ}$

ولنبه ايضا على انه حيث كانت المستقيمان $\text{ا}^{\circ}\text{ب}^{\circ}$ و $\text{د}^{\circ}\text{ه}^{\circ}$ و $\text{ح}^{\circ}\text{ع}^{\circ}$
افقية وموازية لمستوى المنظور تكون منظوراتها $\text{ا}^{\circ}\text{ك}^{\circ}$ و $\text{ج}^{\circ}\text{د}^{\circ}$ و
 $\text{ه}^{\circ}\text{ا}^{\circ}$ و $\text{ع}^{\circ}\text{ب}^{\circ}$ موازية لخط الارض $\text{خ}^{\circ}\text{ض}^{\circ}$ انظر (بند ١٨٥)
وانه حيث كانت المستقيمان $\text{ا}^{\circ}\text{د}^{\circ}$ و $\text{س}^{\circ}\text{ه}^{\circ}$ و $\text{ف}^{\circ}\text{ح}^{\circ}$ اعمدة على
مستوى المنظور يلزم ان تتقابل منظوراتها $\text{ا}^{\circ}\text{د}^{\circ}$ و $\text{س}^{\circ}\text{ه}^{\circ}$ و $\text{ه}^{\circ}\text{ا}^{\circ}$ و
 $\text{ف}^{\circ}\text{ح}^{\circ}$ في النقطة و° فيلزم من ذلك ان تكون النقط ك° و ل° و و°
على مستقيم واحد ومن المعلوم ان الاضلاع $\text{ك}^{\circ}\text{ط}^{\circ}$ و $\text{ط}^{\circ}\text{ل}^{\circ}$ و $\text{ل}^{\circ}\text{م}^{\circ}$
و $\text{م}^{\circ}\text{ك}^{\circ}$ لقاعدة الهرم مائلة بمقدار ٤٥° على مستوى المنظور وان
الاضلاع المقابلة لها متوازية فاذا اخذ حينئذ $\text{و}^{\circ}\text{ر}^{\circ} = \text{و}^{\circ}\text{و}^{\circ}$ بحيث تكون
النقطة ر° نقطة البعد يلزم ان يتقابل المنظوران $\text{ك}^{\circ}\text{م}^{\circ}$ و $\text{ط}^{\circ}\text{ا}^{\circ}$ للضلعين
 $\text{ك}^{\circ}\text{م}^{\circ}$ و $\text{ط}^{\circ}\text{ا}^{\circ}$ في النقطة ر° وان يتقابل المنظوران $\text{ك}^{\circ}\text{ط}^{\circ}$ و $\text{ل}^{\circ}\text{م}^{\circ}$
للضلعين الآخرين في نقطة اخرى ر° كائنة في الجهة الاخرى من النقطة و°
وعلى بعد منها يساوي $\text{و}^{\circ}\text{ر}^{\circ}$

ولتتم ما ذكره هذا التنبيه وذلك انه يمكن ان يتوهم من كل نقطة اريد ايجاد
منظورها افقيان احدهما عمود على مستوى المنظور والاخر مائل عليه
بمقدار ٤٥° ويمد الى تقاطع تقاطعهما بمستوى المنظور ومن المعلوم ان هاتين
النقطتين تنقسمان لمنظوري هذين الافقيين كل واحدة لواحد فاذا وصلت حينئذ
اولى النقطتين بالنقطة و° والاخرى بنقطة البعد المقابلة لها حدث مستقيمان

(١٧٠)

يتقابلان في منظور النقطة المعالومة ومن البين ان هذه الطريقة المستعملة في ايجاد منظور أي نقطة أسرع من غيرها في ايجاد المنظور

(١٩٠)

لاجل وضوح الشك كل عادة لا يرسم المنظور في الموضع الذي وضعناه فيه هنا بل يفرض مستوى المنظور قبل انطباقه منقولا الى بعد ما اختياري او يؤخذ على مستوى المنظور محوران احدهما عمود على الآخر ويؤخذ اثره وينسب بعدا كل نقطة من المنظور الى المحورين المذكورين في أي محل اريد وسيخرج ذلك اتضاها تماما في المسئلة الثالثة والعشرون

(المسئلة الثالثة والعشرون) اذا كان المطلوب ايجاد منظور كثير السطوح ومنظوره ظله الساقط على المستوى الافقي يقال
حيث كان مستقيما كثير السطوح معلومين كافي (الشكل ١٦٧) ومسقطا الشعاع الضوئي كذلك يوجد اول الظل الساقط انظر (بند ١٨١) وانلطف الفارق بين الضوء والظل ومنه تعلم الاوجه المضيئة والاوجه المظلمة اذا تقررهذا يقال ليكن مستوى المنظور م عمودا على خض ويرسل من النقطة البصرية و اشعة بصرية الى جميع رؤس كثير السطوح المفروض فتقابل هذه الاشعة مستوى المنظور م في نقطتين مواضعها بالتساويها الى محورين قائمين احدهما على الآخر وموجودين في المستوى المذكور ويختار للاختصار اثر هذا المستوى بان يرسم بالحرف س للمعور الافقي ق وبالحرف ص للمعور الرأسي ر ويرسم الشكل السكائي في مستوى المنظور م أي منظور كثير السطوح منفردا فاذا مد من النقطة و اقيان و و ما تلان على ق بمقدار ٤٥ ° قطعا هذا الاثر في نقطتين ر و وهما المسقطان الاقيان لنقطتي البعد في رسم المحورين س و ص يؤخذ $\overline{رر} =$

نر^و ويقام من النقطة و عمود على س ويؤخذ و^م = و^و
فتحصل نقطة النظر ثم يمد من النقطة و خط يوازي س ويؤخذ و^م
= و^ر = و^و فتحصل لنا نقطتا البعد

إذا تقرر هذا اعتبر أولا الوجه ا - ب د الذي يعتمد عليه كثير السطوح
موجودا على المستوى الافقي ولاجل ايجاد منظور نقطة يفرض من هذه
النقطة مستقيمان احدهما عمود على مستوى المنظور والاخر مائل عليه بمقدار

٤٥° فير منظور المستقيم الاول بالنقطة و^م ويمر منظور الثاني بالنقطة
ر^م ويقطع المستقيم الاول ايضا مستوى المنظور في نقطة متباعدة

عن النقطة نر^م بمقدار ا ا ويقطعه الثاني في نقطة متباعدة عن نر^م
بمقدار نر^ا ومعلوم ان هذين المستقيمين في مستوى افقي فاذا اخذ

على المحور س طول نر^ا = ا ا وطول نر^ا = نر^ا = نر^ا ومد

المستقيمان ا و ا^م ر^م تقاطعا في النقطة ا^م التي هي منظور النقطة ا
ويقطع المستقيم و - مستوى المنظور في نقطة ن^م متباعدة عن المحور

ص بمقدار نر^م وعن المحور س بمقدار نر^م فاذا اخذ حيث ن^م
نر^م = نر^م واقم على س العمود ن^م = نر^م كانت

النقطة ن^م منظور النقطة ن ولاجل ايجاد النقطة ب يؤخذ نر^م

= ب ج ويوصل بين ب ج و ا فيكون المستقيم الحادث منظور عمودنازل
من النقطة ب ج على مستوى المنظور ثم يقطع المستقيم و ج مستوى

المنظور في نقطة ب ج مرتفعة بمقدار نر^م فاذا اخذ حيث نر^م =

نر^م و مد من النقطة ب ج مستقيما يوازي س قطع ب ج و في النقطة

ج المطلوبة واما النقطة د^ك فحيث كان المستقيم ج د افقيا وموازيا لمستوى المنظور توجد في تقاطع هذا الافق بعينه مع المستقيم د^ك و^ك الذي هو منظور عمودنازل على مستوى المنظور المار من النقطة د وبالاتقال الى الوجه ج د هـ ف ج تحصل الرأس الثلاثة هـ و ف و ج كما حصل منظور النقطة ر

واما الرأس ع من الوجه ر ج ع فقد مددنا لاجل ايجاده افقيين ع ج و ع ج مائتين بمقدار ٤٥° على مستوى المنظور فر منظوراهما على التوالي بنقطتي البعد ر^ك و ر^م وتقابلا في النقطة ع^م المطلوبة ولاجل تحصيل منظور ع ج ينبغي ان يؤخذ على المحور ص بالابتداء من النقطة ن^م طول يساوي ن^ر ويمد من النقطة المتحصلة خط موازي المحور س ويؤخذ على هذا الموازي الى خلف طول يساوي ن^ج ثم توصل هذه النقطة الاخيرة بالنقطة ر^ك لكن اذا فرض ان جملة التركيب تهبط هبوطا رأسيا بمقدار ر^ع يلزم اخذ ن^ج = ن^ج و ر^ر = ن^ر ووصل ج^م و ر^ك ببعضهما فلم يبق حينئذ الا ان يمد من النقطة ر خط موازي ر^ج ويوجد بهذه الكيفية منظور ع ج فهذان المنظوران يتقاطعان في النقطة ع^م

وحيث صارت منظورات رؤس الوجه الثلاث ا د هـ معلومة وكانت جميع الالوجه الاخر متقابله في الرأس س لم يبق علينا الا ايجاد منظور هذا الرأس من كثير السطوح واننبه لذلك على ان المستقيم وسه يقطع مستوى المنظور في نقطة س^ه يساوي مقدار ارتفاعها الرأسى ن^ر س^ه فاذا اخذ ن^ر س^ه = ن^ر س^ه ومد من النقطة س^ه خط موازي س اشتمل هذا الموازي

للمرسم ليستعمل الانسب منها بحسب ما يقتضيه رأيه في كل حالة
مخصوصة

* (١٩١) *

وقد بقيت تنبيهات لازمة في كيفية تنقيط الشكل نذكرها فنقول
ليتنبه أولا الى ان مسقطى اى جسم عند الناظر الواقف في نقطة غير نهائية هما
منظورا هذا الجسم بعينه وان شئت قلت ان كل مسقط هو الظل الساقط حين
تكون الاشعة الضوئية اعمدة على مستوى المسقط اذا تقرر هذا تكون اوجه
كثير السطوح المتلاقية في النقطة $س$ مرئية دون غيرها لاناظر الواقف على
بعد غير محدود على خط عمود على المستوى الافقى فيلزم حينئذ ان $ت$ $س$ $و$
المستقييات المحصلة لمحيط هذه الواجهة على المسقط الافقى ممثلة وان يكون
ماعداهما من المستقييات نقطيا وان يكون الخط المنكسر $ا س ع ف ه ا$
عند هذا الناظر هو المحيط الظاهري لكثير السطوح
وبشاهد بالسهولة ان المحيط الظاهري بالنسبة للناظر الواقف على بعد غير
محدود على عمود المستوى الرأسى هو الخط المنكسر $ا س ه ف د ا$
حينئذ يكون هذا المحيط والمستقييات $س ا$ $و س ه$ $و ا ه$
ممثلة

وتنقيط هذين المسقطين يكون بلا شك للاجزاء الخبأة بمستويي المسقط وهذا
يجبرنا على ان نرسم بخطوط تقطعية بعض الاجزاء التى تكامنا قريبا على وجوب
رسمها ممثلة ثم ان الاصول المتقدمة المطبقة على جميع الاجسام التى نعتبرها
في اثناء هذا الكتاب تنقسم جميع ما يخص تنقيط مساقط الاشكال الفراغية التى
يراد بيانها وقد اسلفنا الكلام على الجزء السهل منها انظر (بند ١٦٦)

واما من جهة الظلال $ف$ كثير السطوح يسقط ظلال على الجزء
ظظظ

ادج ع ف $س$ من المستوى الافقى بحيث لو ازيل الجسم وبقي الظل كانت
صورته كما في (الشكل ١٦٨) لكن قد يخفى الجسم عن الناظر المشاهد للمسقط

الافقي جزاء من هذا الظل فيظهر له في صورة اه ف ط ح ف س ا واذن لم يظلل
الا هذا الجزء من المستوى ويسهل في الاوجه المظلمة معرفة ككون
الخط المنكسر ا - ج ح ف س ا هو الخط الفارق بين الظل والضوء
وينتج حينئذ ان الاوجه ا - ج د و ج د ه ف ح و ه ف س و ا د ه
و ا ه س كائنة في الظل الان الناظر المشاهد للمسقط الافقي لا يرى
الا الوجهين س ه ف و س ا ه ولذلك لم يظلل الا هما على المسقط
الافقي ولذا اهتمينا بتوجيه الخطوط الظلية الى جهتين مختلفتين ومن
المعلوم ان الناظر لا يرى من المسقط الرأسى الا الاوجه س ه ف و
ا د ه و س ا ه التي يلزم حينئذ تظليلها دون غيرها على المسقط
الرأسى

واتمام من جهة المنظور فيقال من البين عند الناظر الواقف في النقطة و
ان المحيط الظاهري لكثير السطوح هو ا - س ه د ا فلا يرى هذا الناظر
حينئذ الا الاوجه س ا - و س ه - و س ا ه و ا د ه التي منها
الاولان مستديران والاخران مظللان والمستقيمتان المكونة لمحيط هذه الاوجه
الاربعة ممتلئة دون غيرها ثم انه يلزم تظليل جزء منظور الظل الساقط الكائن
خارج منظور كثير السطوح

منتصفا الضلعين المتوازيين ونقطة تقابل القطرين ونقطة تقابل الضلعين الغير
المتوازيين في شبه المنحرف تكون على خط مستقيم انظر (شكل ١٦٩)
ويتضح ذلك في شبه المنحرف المتساوي الساقين ا - ج د لان المثلثين ا س ج
و د س ه متساويان فيكون ا س ه و و س ه متساويين ايضا
فحينئذ يقسم س ه و الزاوية س ا الى قسمين متساويين ويعبر بالضرورة
بمنتصفي ا - و د ج لكن يمكن اعتبار شبه منحرف ما ا - ج د مسقطا
عموديا او مائلا لشبه منحرف متساوي الساقين منطبق على ا - ج د فيكون

القطران ا ج و ر د مسقطي القطرين ا ج و ر د ويكون المستقيم
س د و مسقط س د و وتكون النقطتان ه و ح مسقطين للنقطتين
ه و ح و حيث كان هاتان النقطتان منتصفين ا ب و د ج وكان مسقط
نقطة منتصف مستقيم في كل نوع من المساقط الاسطوانية هو نقطة منتصف
مسقط هذا المستقيم نفسه تكون النقطتان ه و ح حيث ان منتصفين
المستقيمين ا ب و ر د
ويستخرج من هنا طريقة قسمة مستقيم وزاوية او قوس الى قسمين متساويين
واقامة خط عمود على منتصف مستقيم ما

تم الجزء الاول من هذا الكتاب المستطاب بعون الله الملك الوهاب

وكان الفراغ من تمام طبعه بدار الطباعة العامرة

المنشأة ببولاق مصر القاهرة ادام الله عز منسيتها

ومشيدها بها صاحب السعادة الابدية

والهمة العمرية والفخر العلي الحاج محمد

علي وذلك في عتبي جمادى الاولى


سنة ١٢٦١ من الهجرة النبوية

على صاحبها افضل

الصلاة وازكى

التمية

تم



شکلا

شکلا

شکلا

شکلا

شکلا

شکلا






شکلا


شکلا


شکلا





شکلا





شکلا





















شماره ۷۱






شماره ۷۲















شماره ۹۰

شماره ۹۱


شماره ۹۲

شماره ۹۳


شماره ۹۴



99




— ۱۲۸ —




شماره ۱۰۳


شماره ۱۰۴




شماره ۱۰۵

شماره ۱۰۶







شکل ۱۰




شکل ۱۱






شکل ۱۲





شکل ۱۳














شماره ۱۱۹










شکل ۱۲۸




شکل ۱۲۹








شماره ۱۳۸




شماره ۱۴۰




ض

خ


شماره ۱۴۱




شکل ۱۴۱




شکل ۱۴۲




شکل ۱۴۳




شماره ١٤٤




شماره ١٤٥




شماره ١٤٦








شماره ١٤٥




شماره ١٤٦








شکل ١٦١



شکل ١٦٢



شکل ١٦٣

